

1576/\$

ALBERTI
HALLERI

*Domini in Goumoëns le Jux & Eclagnens.
Præsid. Societ. Reg. Gætting. Præsid. Societ. Oeconom. Bernensis;
Sodal. Acad. Reg. Scient. Paris. Acad. Imp. Nat. Cur. Boruss. Suec. Bonon. Arcad. Acad. Reg. Chirurg. Paris.
Soc. Reg. Brit. Bot. Flor. Bavar. Helvet. Carniolic. Hafniens.
Coll. Med. Edinburg. In Supremo Senatu Reip. Bernensis ducentum Viri.*

DE
PARTIUM
CORPORIS HUMANI
PRÆCIPUARUM
FABRICA ET FUNCTIONIBUS
OPUS QUINQUAGINTA ANNORUM.
TOM. VII.
RESPIRATIO. VOX.



BERNÆ & LAUSANNÆ,
EX PRELIS SOCIETATUM TYPOGRAPHICARUM.

M. DCC. LXX. VIII.






LIBER OCTAVUS.

SECTIO IV.

RESPIRATIO.

§. I.

RGANA descripsimus, quibus respiratio exercetur, & aerem, qui pulmone recipitur. Sequitur ut hæc organa agentia contemplemur, & eam, quam singulum propriam habet vim cum sodalibus unam in actionem conjunctam proponamus. Tota vero respiratio duabus periodis continetur, inspiratione, qua aer in pectus adlicitur, & expiratione, qua idem expellitur. Vitæ effectus est & signum inspiratio, exspiratio mortis, priorem ergo præmisisse liceat.

§. II. *Inspirationis initia.*

In cadavere aut hominis, aut animalis, inque vivente quidem homine, sed debili, neque fere vires ad ducendum spiritum adhibente, quiescit thorax, neque aer subit. Nam & costarum

nativus situs est ejusmodi, ut pulmonem comprimant *a*, & ipse pulmo sibi permissus, aliqua certe vi suæ distensionis renititur *b*, & æqua vi resistit aer, quem ostendimus pulmone perpetim contineri, &, si de fetu sermo fuerit, mucus, quo pulmo turget, collapsa bronchia anulis asperæ arteriæ sibi impositis, lingua ad palatum adjuncta *c*, aerem illapsurum excludunt. Demum ipsa curva fetus figura, plicaque colli super pectus adducti, inspirationem reddit difficilior *c**.

Sæpe vidi cæsareos catellos *d*, quos ipse de matris utero rescueram, diu, multisque horæ minutis vivere, repere, varie moveri, uti etiam mediis sub aquis moventur, neque tamen respirare. Sed etiam infantes, qui nuper ex utero exclusi, inque aerem sunt recepti, tamen sæpe, præ debilitate *e*, mucove, quo pulmonem plenum habent *f*, diutiuscule a respirando *g* sibi temperant, donec sensim refocillati, aut inflato

a Hæc conf. n. 25.

b n. 22.

c Roederer de submers. satur. passim. Non ab elatere suo aer subit p. 29.

*c** Cum puer ex utero nuper exclusus respirare non posset, extensus potuit *P.* Idema annmerkungen p. 21.

d Senac p. 413.

e Watts, Smellie &c.

f Kaauw n. 165. Petit Mem. de l'Acad. des Sciences 1733. p. 5. 7. Geelhaufen de neonat. pulm. p. 93.

g Senac, Smellie cases of mid-

wifry p. 363. 383. 384. Storch Kinderkrankh. p. 79. 80. Pugh midwifry p. 50. Roederer l. c. p. 14. 25. 28. 31. Watts on painful labours p. 29. 30. Heister de partu in somno matris. J. Horn forsta bres om drifwande och sjunkande lungan T. I. p. 11. 12. 13. Bohn offic. med. dupl. p. 666. Alberti in constit. Crimin. Carolin. p. 118. Thebes. Hebammenkunst p. 390. Titsing Diana p. 626. Idema Anmerkungen p. 21. Totis 15 minutis Storch Hebammenkunst p. 417.

in os aere *h*, & depressa lingua *i*, aut compresso ad *Albini* morem *k* abdomine aut pectore, aut sponte ex quocunque demum incommodi sensu *l*, aut a sollicitatione nobis non satis cognita, pectus agitare *m* incipiant, spiritumque adeo ducere. Sed etiam evulso corde potest respiratio superesse *n*. Certa tamen ad respirationem moliendam maturitas in fetu requiritur. Qui sexto mense editus fuerat, respiravit, neutiquam qui 130 die.

Prima initia respirationis nuper Cl. *Portal* ostendit in broncho dextro fieri; is enim elevatur facilius, quia liberior est, dum sinistrum aorta amplectitur & comprimit. Exempla addit sibi visa, in quibus pulmo dexter nataverat, cum sinister nondum ab aere dilatatus in aqua subsideret.

§. III. Causæ inspirationis non veræ.

Non ergo ab arteria pulmonali o per vires

h Pugh l.c. Heister l.c. Smellie p. 384. Waats p. 29. Pia IV. p. 77. Ib. 2. Journ. Med. 1765. Maj. Memoire sur les noyés.

i Thebes l. c. Pugh l. c.

k Storch l. c. Roederer p. 25.

l Watts p. 23. Hartley of man propos. 35. Schreiber n. 133. Whytt p. 212. Hamberger physiol. n. 786. Thruston p. 96. 97. Herissant.

m Roederer p. 29. 31. Herissant p. 74.

n Pechlin de apoplex. n. 28.

o Inter antiquos Aristoteles part. anim. L. III. c. 6. Deinde J. Berengarius ad Mandinum p. CCCXXVIII. Cæsalp.

Perip. quæst. 5. L. 5. C. Hofmannus ad Galenum de usu part. Johannes van Horne microcosm. p. 97. edit. Pauli, & Dionysius vander Sterre van de teeling. p. 149. dilatationem pulmonis impulso sanguini a corde tribuerunt. Partem certe respirationis, & eam, quæ absque voluntate superest, huic acceptam referunt nuperi Cl. viri Diemerbroeck p. 318. Bertier p. 181. seqq. Hales hæmast. p. 77. Schreiber Almag. p. 376. Herissant histoire de l'Académie des Sciences 1743. p. 75. & in thesi ergo ab impulsu sanguinis in arteriam pulmonalem inspiratio.

cordis dilatata vitalis aliqua, aut a voluntate libera, respiratio nascitur. Id si fieret, & fetui in utero hærenti, & pullo in ovo latenti, pectus alterne dilataretur, alternisque vicibus subsideret, eædemque vices forent in animale modo nato, cui in aere cor salit, prius quam respirat *p*, aut in amnio pulsu exercetur *q*. Omitto, quod penitus alia respirationis tempora sint & pulsus, inque eadem inspiratione cordis motus ter aut quater cesset, neque ideo pectus non continuata dilatatione pergat expandi.

Sic neque in pectore pleuram inter & pulmonem vacuum spatium nascitur, in quod aer subeat.

Qui pulmonis innatam *r* aliquam vim adgnoverunt, qua dilatari possit & constringi, numerosi certe auctores, maxime nisi sunt experimento, non satis vero, quo nonnulli minime contemnendi viri *s* stabilitum iverunt, aperto etiam pectore, destructis costis, lacero diaphragmate, tamen pulmonem moveri *t*, dilatari, &

nempe quæ superest ab aperto pectore. Addit, injecta in arteriam pulmonalem tepida viscus expandi, & plumulam adtrahere.

p Roederer p. 14. Watts p. 29.

q Birch T. III. p. 404. Vesal. p. 824. Plater quæst. phys. p. 259. Moebius obs. 13. Nynmann de vit. fet. p. 31.

r Riolan p. 231. Lister de humor. p. 30. 31. de Bremond. Esteve de l'ouie p. 58. &c. Aliquam partem tribuit pulmoni Willis de cerebro p. 176. C. Bartholinus Thomæ f. specim. anat. p. 80.

s Guilielmus Houstoun, Cl. de Bremond, & D. Herissant.

t Swammerdam p. 32. 33. De Bremond Memoire de l'Académie 1739. p. 344. 355. &c. Herissant histoire l. c. p. 73. 74. Bertier p. 136. 142. 143. Hoadley p. 17. Riolanus p. 415. Antiqui pulmonis motum post incisum pectus superesse scripserant, apud Galenum admin. VII. c. 12. Piccolhomineus p. 242. Jessen anat. pragens. p. 73. Rudbek apud Hemsterhuys iness. aur. p. 307. Bartholin Anat. 4. renov. p. 428. Charleton acon. anim. p. 154. Sed olim contra pulmonum proprium motum Galenus de admin. anat. L. VIII. egregie, & per experimenta scripsit, tum loc. adf. L. V.

comprimi, etiam longo tempore, perque totas horas *v*, & aere eundem plenum esse *x*. Cum ab empyemate pectus perforatum fuisset, non ideo collabi pulmonem, neque pulmonem de motu cessasse.

Id experimentum ipse feci, aut potius absque meo artificio natum eventum vidi, ut omnino, utroque pectoris latere aperto, aliquoties animal respiraret *y*, semel etiam vocem edcret.

Verum facillime potuit in ejusmodi experimento tortum animal & agitatum, aut cutem *z*, ut factum vidi, aut muscutorum intercostalium oblique adtractum lacertum, aut lobum pulmonis impactum *a* vulnere pleuræ obducere, maxime quando vulnus exiguum fuit *b*. Potest etiam vulnus contra nos citatum coaluisse *c*. Potuit etiam pulmo non collabi, qui pleuræ adhæsisset. In plerisque certe experimentis, uno latere

v Blas miscell. p. 229. *Hou-
stoun Phil. Transf.* p. 441. Exp.
1. 4. quorum experimentorum
ultimum testem habet Ill. *Ge-
rardum v. Swieten*, qui even-
tum fatetur *Comment. in Boerb.*
p. 270. 271.

x Floyer pulsewatch T. II. p. 346.

y Memoire sur la respiration
exp. 65. 105. 108. 12. 16. 18.
25. 40.

z Birch T. II. p. 49. Cl. *Hou-
stoun* Exp. 3. & *Steph. Hales*
exp. 12. p. 77. *Schlichting Eph.*
Nat. Cur. vol. 6. obs. 23. conf.
Schreiber p. 271. Cum turunda
in pectore foret, non poterat vi-
vere homo, nisi eam in vulnere
retineret: tunc ambulabat in-
teger *Schwartz dodec. cas.* II.

obs. 10. Utrunque perforato tho-
race animal ægre spiravit, nisi
vulnus digito clauderetur, &
eo remoto periit *Birch* T. II.
p. 54. conf. T. I. p. 509.

a Oeder de irritab. p. 64.

b Ut in vulnere Guilielmi
Lamotte Chir. Compl. T. III.
obs. 223. Olim ita monuit *Boyle*
apud *Birch* T. II. p. 48. & *Com-
mentator Coac.* L. III. n. 2.
Majori vulnere inflicto peri-
bant animalia *Swieten* p. 271.
Hinc paracentesin integri la-
teris admittit ipse Cl. *Hoadley*,
dum parvum vulnus sit append.
p. 15. Parvo cum vulnere pul-
mo dilatabatur, cum magno
quiescebat *Senguerd* exp. 3.

c Histoire de l'Académie 1743.
p. 72.

pectoris aperto, animali multum de trahendi spiritus facilitate decedit, & pulmo subsidet *d*, etsi vita superesse potest: tum in vulnere alterius lateris thoracis. Eadem in ulcere *e* & hydropè pectoris fiunt.

Utroque latere pectoris aperto pulmo uterque concidit *f*, & immobilis in dorso hæret, in *Galen*i experimento toties a nobis aliisque repetito: & animal obmutescit *g* & perit *h*, neque agitati thoracis conatus pulmonem porro dilatant *i*, & tantum de respiratione destruitur, quantum aeris in pectus per vulnus recipitur *k*.

Estque ea princeps mediastini utilitas, ut alteram pectoris cellulam liberam fervet, quando effusa aqua, aut pus, aut sanguis, aut admixtus aer, alteram pectoris caveam inutilem reddidit *l*. Perit canis, quamprimum mediastino perforato etiam alterum pectoris latus aerem admisit *m*.

Deinde video, aliqua pro hac sua opinione *Cl.* viros experimenta producere, in quibus non vere animal respiravit, sed a compressis unice

d Oribas p. 72. Swammerdam, fondam. p. 120. Houstoun Exp. Verheyen L. II. p. 167. le Drax 3. 4. 6. Duverney in obs. Jesuit. obs. 37. 38. Houstoun exp. 6. Siamens. p. 34.
g Exp. sur la respiration n. 39. 76. 77. 78. conf. exp. 12.
b Dunus l. c. Boyle l. c. Verheyen p. 159. Birch T. II. p. 54. Galen. admin. L. VIII. c. 3.
i Exp. 70. 71.
k Galen. l. c.
l Vesalius p. 713.
m Verheyen l. c.
f Thaddæus Dunus de respir. p. 93. b. Oribas p. 72. Plemp.

Seçt. IV. AER IN PECT. PULMON. ELIDIT. 7

costis pulmo expulsus de pectore profiluit *n* , ut etiam Cl. *Houstouni* verbis confirmatur , qui pulmonem propulsum contracto thorace dilatari sincerus observavit , & vicissim *n** ; etsi negare videtur Cl. de *Bremond* o. Perinde ut ab eadem compressione diaphragma vidi de pectoris vulnere expelli , & cor , & aerem qui pectore continebatur. In pulmone certe nulla vis est , qua aut sponte dilatetur , aut subsideat , qui irritabili natura destitutus *p* , musculorum conspicuorum expers , totus mollissima cellulosa tela sit , denique in avibus perpetuo *q* , in homine sæpe , plurima ejusmodi rudiori tela ad pleuram revinciatur *r*.

Vidi etiam , cum pulmo in vivo animale plenissimus aerem captare nequiret , & aspera arteria vinculo clausa , ab aeris commercio id viscus secluderet *s* , animal suis usum viribus pectus agitaſſe musculosum , ut respirationis

n Sylv. diff. 7. n. 24. Bohn p. 28. 37. Daoustenc de respir. (bene) Pecquet diff. anat. p. 79. Mayow oper. ed. bat. p. 240. Swammerdam p. 35. Houstoun Exp. 2.5.6. Bremond p. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 351. 356. 357. Herissant p. 73. Pechlin Ephem. vuln. thor. Hales hæmast. p. 77. exp. 12. Hoadley p. 15. 18. 19. in vivo homine Heuermann Chir. operat. T. II. p. 267. Exp. sur la respiration n. 76. 77. 78. Eadem vis est , quæ Cl. viri B. Hoadley acum triquetram de pectore expulit p. 16. In emphy-

femate , dum homo canebat , prominebat tumor , & redibat cum remitteret *Helmont* p. 356. Pus in expiratione prodit *Ferein* l. c.

*n** Exp. 5. 6. Bremond l. c.

o p. 351. 352.

p L. VIII. p. 176. ed. 1761.

q *Helmont* de catarrh. delirant. p. 44. 45. Swammerdam p. 83.

r p. 121. 122. ed. 1761.

s Exp. 24. & p. 270. Idem vidit *Simpson* de respir. p. 150. Bremond l. c. p. 339. 342. *Chefelden* p. 105.

fieret compos ; eoque in statu pulmonem neque dilatari , neque constringi *t*.

Sed neque ejusmodi aeris est actio , ut absque pectoris dilatatione *v* pulmonem subeat. Pulmonem sponte dilatari non posse ostendimus , neque in fetu adeo debili & molli , aer ab atmosphæra sponte irrumpit *x*. In pectus vero non dilatatum aer cur subeat , nulla exstat ratio , & ampliter perforato pectore , etsi pergat respiratio , pulmo tamen quiescit. Et manifesto contra anatomica experimenta peccarunt Cl. viri , qui aut diaphragma *y* , aut universum pectus *z* inutile esse , inque inspiratione quiescere , & destructis his organis tamen respirationem fieri dixerunt *a*.

§. IV. *Circulus Cartesii.*

Sed neque necesse est , ut pectus dilatatum aerem proximum , is autem remotiorem impellat , donec , quasi absoluto circulo , aer pectori vicinior in thoracis laxatum spatium descendat. Ita *Cartesius* olim *b* , quem plurima schola *c*

t Swammerdam p. 83. *Neukranz* c. 6.

v Stetter de muscul. act. Schelhammer diff. IX. n. 54. 55. & de cord. & pulm. offic. Holmann prim. lin. p. 185. Bertier p. 136. Bagliivi p. 445. 454. Gouraigne physiol. & in disp. de respir. 1729. 4. Ignem vitalem nominat Shebbeare p. 119.

x Roederer de suffocat. p. 20. per experimenta.

y Stetter p. 27. Schelhammer l. c. Lamzweerde p. 33. *Novæ hypotheseos de pulmonum motus & respirationis usu Specimen*

Londin. 1671. 8. Shebbeare p. 132.

Bertier p. 142. 143.

z Shebbeare , Lamzweerde de respir. Swammerdam respir. n. 49.

a Bertier p. 136 Blas misc. l. c. conf. contra hanc opinionem Boissier physiol. p. 104.

b De homine p. 54.

c Regius Thes. IV. apud Rogerium Drake. Corn. v. Hoo ghelande , Gualtherus Charleton Econ. anim. p. 154. Philippus Verheyen L. II. p. 164. P. Dionis cours d'anat. p. 463. Daniel Taubry anat. raison. p. 92.

secuta est, & ipse, meliori opinione dignior, *Johannes Swammerdam*, qui etiam experimenta protulit, analogi eventus, ut aere siphonis opera de ampulla extracto *d*, aqua ex tubulo communicante sequatur, & in ampullam fonticuli specie profiliat: impulso autem in ampullam aere idem fonticulus de altero nunc tubuli sine erumpat, idemque sit eventus, quando loco siphonis aerem aut extrahentis, aut impellentis, canis respirationem adhibes *e*. Credebat autem vir egregius, a pectoris impulsione aerem, etiam aliquanto remotiorem, urgeri, ut aversum tubi in ampullam patentis finem subiret. Deinde, cum & *V. F. Plempius* & ipse *Sylvius* objicerent, posse ex alia camera per tubum communicantem aeris adtrahi *f* tantum, quantum ad respirandum sit necesse, ad materiem subtilem per parietes penetrantem optimus *Swammerdamius* confugit *g*. Nuper *Cl. Gouraigne* aerem suo elatere in pulmonem aere debiliori plenum descendere docuit *g**, & pectus dilatari, quia aer subit; non subire aerem, nisi pectus dilatatum fuerit. Sed repugnat vita hominum superstitum in aere calidiori, quam est hominis sanguis; hic vero aer pulmonalis densior, atmosphæricus rarior est *g***.

Sed in experimento *Swammerdamii* unice, detracta parte aeris, rarius factum est in ampulla

d l. c. S. I. c. 6. p. 40. seqq.

e p. 58.

f Diff. VII. fin.

g p. 28.

*g** De respiratione. Addit in-

flato aere in animale mortuo omnia phænomena inspirationis produci.

*g*** FUSE L. V.

elementum , inque id femiinanane spatium , aer gravior successit. Deinde ipse jam *Galenus h* , & inter nuperos *Robertus Hooke i* , & *J. Mayow* viderunt , aut ex phiala longi colli respirari posse , aut ex vesica *k* , cum nullus ab ambeunte aere in ampullæ caveam meatus pateat. Tunc enim , si aer in phiala fuerit , suctione adhibita , aer de phiala in pectus , tamquam in locum minus pressum succedit *l*. Ægritudinem , quam perceptam *Verheyenius m* pro *Swammerdamia* protulit , facile ad aeris non renovati vitium referimus *n*. Nunc quidem non alia causa subeuntis in pectus aeris desideratur , postquam aeris in sedem quamcunque successio ostensa est , quæcunque minus aut elateri aeris , aut atmosphæræ incumbenti resistit *o*.

§. V. *Verior causa quæ aerem in pectus invitat.*

Ostendimus *p* , eam aeris naturam esse , ut in quodcumque spatium expeditus succedat , in quo fluidum quodcumque rarius , minusve elasticum fuerit , quam est aer circumfusæ atmosphæræ ; ventumque continuo excitari , aerisve torrentem , qui in sedem minus resistantem sequatur *q*. Ergo ,

h Birch T. II. p. 292.
i De util. respir.
k In cane Birch T. II. p. 282.
l Oper. p. 237. ed. Belg. conf.
Duncan Act. anim. p. 156. *Neukranz c. 7. Purcell of vapours* p. 140. & passim contra hinc circulum *Lamzveerde de respir.*

Swammerdam exspir.
m p. 166. ed. 1757.
n p. 207.
o p. 201. seqq.
p Ibid.
q Bernoulli de respirat. C. I. n. 4.

Sect. IV. AER SUCCEDIT IN LOCUM LAX. II

si pulmonem , & una pectus , dilataveris , ut aer pulmonalium vesicularum in amplius spatium diffusus rarefcat , pro portione , qua is aer atmosphæra incumbente rarior fit , pro ea columna aerea in eum pulmonem descendet , eo celerius , quo differentia densitatum major erit. Hanc veram causam inspirationis primum *Josephum Pecquet* *q** adtigisse , *Robertum* vero *Boyle* *r* proposuisse invenio , quem protinus *Thomas Willis* *s* , totaque series nuperiorum auctorum secuta est *t* : nisi quod nuperi *v* aliqui clari viri debilitatem aeris pulmone contenti , etiam ad calorem retulerint ; id vero num recte fecerint , locus erit inquisituro.

Continuo autem adparet , quare aperto pectore & respiratio destruat , & demum vita ∞ . Frustra enim tunc pectus dilatatur , cum per id vulnus atmosphærae nunc locus fiat , ut pulmonem admissa comprimat , & æquilibrium renascatur inter columnam , per asperam arteriam subeuntem , atque inter columnam , quæ per vulnus pulmonem comprimit. Hinc illæ nuperorum auctorum mensuræ *y* , qui pulmonem , post

*q** 1. c. p. 81.
r De causa suctionis &c.
s Pharmac. ration. P. II. p. 22.
t *Franciscus Sylvius* de le Boe
 1. c. *Highmor* , *Borellus* 1. c.
 prop. 83. *Bellinus Lemm.* 16. 17.
Berger de natur. hum. p. 19. de
 respirat. p. 18. *Johannes Bohn*
 circul. p. 81. *Sturinius Physic.*
 elect. T. II. p. 169. *Nicolaus*
Hartsoeker suite des conjectures

physiques p. 55. *Cheyne princ. of*
natur. relig. p. 136, 137. *Mor-*
gan principl. p. 147. *Boerhaave*
J. R. M. Schreiber almagest.
 p. 318. *Emmerich de inspira-*
tione &c.
v *Bagliivi* p. 454. *Hoadley*
 p. 48.
x p. 5. 6. seqq.
y *Houstoun* , *v.* *Swieten.*

vulnus pectori inflictum, dilatari monent, quamdiu id vulnus glottide angustius est, immotum vero quiescere, quam primum id vulnus glottidem superat, atque adeo columnam aeris æque magnam admittit, ac quidem illa est, quæ per asperam arteriam imminet.

Hinc pulmo in phialam dimissus nulla vi inflatur, quando circumfusus aer viam, qua fugiat non habet z: tunc enim elatere suo in atmosphæram æqua vi librari. Hinc, cum pectus aere elastico repleretur, nulla respiratio fuit, etiam clauso vulnere a, ut per nupera *Britannorum* inventa eo in casu necesse sit pectus perforari, qua aer exeat.

Iterum hic intelligitur, quare nulla dilatatione pectoris facta, tamen pulmo infletur, quando ipsum quidem viscus in ejusmodi spatio est, de quo atmosphæræ portio subtrahitur, dum aspera arteria in liberum, & naturalem aerem patet b.

§, VI. *Quanam vires pectus dilatent.*

I. *Diaphragma.*

In homine, & in viro c magis, deinde in animalibus quadrupedibus d plerisque, quoties

z *Swammerdam* p. 37.

a p. 36.

b *Boon de respirat.* n. 12. *Birch* T. II. p. 255. *Pauli* apud *Luther.* de anomal. pericard. *Croeser* *Omvverp.* p. 9.

c *Boerhaave* J. R. M. n. 623.

d *Swammerdam* p. 85. *Monro*

comparat. anat. p. 37. 39. *Schwarz* diff. sæpe cit. n. 7. de cuniculis. *Exp. sur la respir.* 7. 8. & de respir. P. II. not. 42.

quam blandissime & absque vitiosa vehementia respiratio peragitur, costæ omnino leniter moventur *e*, ut nequaquam moveri sentiantur. Eo in statu solum transversum septum *f* thoracem dilatat *Galeno* teste: & ut costæ agant, necesse est, septum transversum vulnere inutile reddere *g*, aut pleura pertusa aerem in pectus admittere, quo animal ægrius respiret. Solebam fere pectus perforare *h*.

Posse vero septum transversum etiam absque costis in homine officio sufficere, etiam morbi confirmant. *Galenus* ostendit, destructis omnibus musculis, & aperto pectore, solum diaphragma laborare, imasque pectoris partes moveri. Nam & in pleuritide *i*, propter doloris in costarum adscensu sensum pectus non mutamus: & qui thoracem alteri lateri incumbentem habent, eo latere minime utuntur *k*, & costas elevare nequeunt, quibus tota costarum natura ossea est *l*, aut trunci corporis ossa ancylosi conferbuerunt *m*,

e Borell l. c. prop. 81. *Bellin Lemm.* 14. *Pitcarne* diff. cit. n. 21.

f Et ante *Galenum* fuerunt, qui totam respirationem soli diaphragmati tribuerent *Administr. anat.* L. VIII. in eo nimii; & naturalis certe respirationis officium notissimo huic musculo ipse demandavit vir Cl. l. c. c. 5. & de causis respirat. Præcipuum etiam & unicum, aut certe princeps, in respiratione instrumentum fecerunt *Vidus* p. 201. *Laurentius hist. anat.* L. V. c. 30. *J. B. v. Helmont de catarrh. delirament.* p. 356.

T. Craanen de hom. c. 75. *Fabricius* p. 40. 46. *Riolanus* p. 214. *Verdier abrégé d'anat.* p. 253. *Winslowv Mémoire de l'Académie des Sciences* 1738. p. 71. 94. *Boyle Exp. phys. mech. de aere* n. 40. *Gorter de perspir.* p. 327. & plerique alii.

g Exp. 8.

h Exp. 23. 25.

i *Winslowv Mémoire de l'Académie des Sciences* 1738. p. 68.

k *Winslowv* l. c. p. 67.

l p. 22. Absque dyspnoea, tamen etiam ossescunt *Riolan.* p. 207.

m *Connor de off. coalit.* p. 25.

aut sternum *n*, fractum, aut denique pectoris compages vehementer læsa fuit *o*. Sed ex voluntatis etiam imperio sæpe costarum motu abstinemus *p*. Etiam in nixu denique, vehementiori nempe inspiratione, solo sæpe utimur diaphragmate, costis inmotis *q*. Quare in summo nixu idem nonnunquam rumpitur *r*.

Quare ex vitiis diaphragmatis solius respiratio vehementer læditur, etsi pectus integrum superest. Cum turunda diaphragma comprimeret, æger expiranti proximus fuit, convaluit idem; cum eadem extraheretur *s*. Animi deliquium funestum ingruit, cum septum transversum abscessu & aquosis vesiculis infestaretur *t*. A folliculo aquæ uncias 40. continente, qui diaphragmatis appendices comprimebat, respiratio difficilis *v*. Difficilis spiritus ab omento pingui *x*, mesenterii glandulis schirrhosis *y*, adnato jecore *z*, & tumoribus hepatis & lienis *z**. In equis frequens asthma a tenuitate nimia diaphragmatis nascitur, cujus fibræ eo in statu pene in membranaceam naturam degenerant *a*. Septo demum transverso deleta respiratio destruitur *a**. A lacerato

n Hannes fetum per os nutrirî obs. ult. Dilucid. T. III.
&c.

o Exp. 58. conf. 50. 51. 52.
Solum respirationem urget,
aliis musculis & costis ipsis de-
structis Galen. admin. anat.
L. VIII. c. 9.

p Winslow l. c. p. 67.

q Idem p. 68.

r Memoire de l'Académie des
Sciences 1733. p. 513.

s Ciucci apud Sancassanum

t Willis anim. brutor. p. 313.

v Kerkring obs. 89

x Rhod. Cent. II, obs. 24.

y Ibid. obs. 25.

z Tabarrani obs. II, p. 25.

*z** Galen. de util. respir. L. I.

II. Hoadley p. 72. Senac Me-
moire de l'Académie 1729. p. 130.

a Gibson anat. of the horse
p. 48. 249.

*a** Thruston p. 43.

diaphragmate subita mors in equis succedit *b*, & a lacerato nervo phrenico *c*. Etiam solus situs diaphragmati non favens respirationem difficilem reddit, quando viscera abdominis pondere suo in id septum nituntur, ut in homine supino, cui pedes propendent *d*.

Plus, quam costas, diaphragma ad inspirationem facere, nuper adgnovit *Franciscus Boissier e*, eademque est mea adnotatio *f*. Cum enim pectus vix supra duas lineas dilatetur *f**, & totius pectoris diameter in iisdem corporibus sit omnino $8\frac{1}{2}$ pollicum, dilatatio pectoris universa erit $\frac{1}{52}$. Cum præterea distantia media ossis pectoris a vertebribus sit 31 linearum *g*, & incrementum distantiae pariter duarum linearum *h*, qualibet sectio thoracis non inspirantis pro ellipsi haberi poterit, cujus altera diameter est lin. 102. altera 31. atque adeo pro circulo, cujus diameter esset linearum 56, & cujus adeo ambitus est 176 lin. & area lin. 2464. Thoracis vero, cujus costae elewantur, & pectus latefcit, segmenta erunt ellipses, quarum diameter major est 104. lin. minor 33 lin. atque adeo æquales circulis, quorum diameter est pene 58. ambitus 182 proxime, area vero 2593. major priori lineis 129. Differentia ergo inspirantis thoracis, quod ad costas pertinet, ad quiescentem, in

b Gibson p. 391. *Memoir. de l'Académie des Sciences* 1733. l. c.

c Birch T. I. p. 509.

d Gunz de situ parient. p. 32.

e De respir. difficil. p. 24.

f Exp. 11.

*f** Exp. 2. p. 217.

g Ibid. p. 214.

h p. 217.

quavis sectione 10 fere lin. quadratarum erit. Porro sumpta longitudine thoracis media poll. 8. sive linearum 96 erunt, si taleas sumferis altas unam lineam, lineæ pectoris cubicæ in pectore quieto 238544. & in eo, quod inspiravit 248483. & differentia, qua superat pectus a costis dilatatum, linearum 10374. lin. sive pollicum cubicorum supra 6.

Contra in cane mediocri, cujus pectoris longitudinem male neglexi sumere, diaphragma omnino in vehementiori inspiratione per tres uncias *i* descendit. Nunc pectus hominis facile ejus canis duplam habuerit longitudinem. Si porro diaphragmatis diametrum majorem feceris iterum unciarum octo cum femisse, minorem iterum 43 lin., longitudinem anteriorem decem unciarum, posteriorem sex unciarum, medium adeo 8. unc. erit ellipsis, pro qua diaphragma nunc habemus, in circulum commutata æqualem 3415. l. & solidum in altitudinem ductum absque inspiratione 327840 l. cum inspiratione vero 36 lineis auctum, valebit lin. 450780. quorum numerorum diversitas est linearum 122940. sive pollicum cubicorum pene 71. decupla adeo prioris differentię. Si vero in homine diaphragma plus 3 unciis descendere sumferis, ut quidem æquum est fumi *k*, etiam major erit ea, quæ a diaphragmate pendet, dilatatio.

Paulo

i Exp. 50. 51. 52.

k Toti pectoris cavitati æquiparat Cl. Boissier *physiol.* p. 96.

Paulo aliter eadem dimetitus Cl. *Boissier* l aliam rationem invenit. Pectoris mediocrem capacitatem inspirando adquisitam æstimavit ad pollices cubicos 40. *m*, maximam ad 220. sumto pro mensura aere, qui inspiratur, & augmento transversæ diametri pectoris facto a 124. ad 128. Ita reperit, ad costas pertinere posse partem augmenti $\frac{1}{15}$, sumtis utriusque diametri quadratis. Cum vero 220 sit ad 40 uti 11 ad 2. & ex diametro aucta mediocris capacitas pectoris ad maximam sit ut 11. 15. ad 16. 2. quintuplo plus augmenti diaphragmati debebitur, quam costarum quidem mutationi.

Variis aliis modis tentata est dilatatio pectoris; quæ sit in spiritu ducendo. *Johannes Swammerdam* canem sub aquam mersit, ut per tubulum aerem duceret; vidit aquam adsurgere, dum inspirabat animal, subsidere quando expirabat *n*. Deinde *Thomas Bartholinus* funiculum circa proprium pectus duxit, tunc inspiravit, ita metitus est funiculi in longitudine differentiam, qua oportebat inter inspirandum longiorem esse *o*: invenit pollicis diversitatem esse: sed id quidem nimium videtur ex nostris experimentis, ut etiam magis vitiosa sit *Elsholzii* mensura, qui duas fecit uncias *p*; nimis vero parcam fecerit *Neukranzius*, qui abdomen ultra unciam dilatari inter inspirandum negavit *q*,

l De respir. difficil. p. 24. 25.

m Ex iis quæ statim sequen-

tur.
n l. c. p. 20. *Bloemesteyn*
admin. anat. p. 18. Etiam testu-
do aquæ inmersa, dum inspirat,

Tom. VII.

aquam elevât *Parisini*.

o De pulmon. Sect. III. p. 57.
Helmont p. 356.

p *Anthropometr.* p. 230. tum
Floyer pulsewatch. p. 382.

q Diff. cit.

& adhuc parcior *Borelli*, qui non ultra unam trigesimam partem digiti ambitui pectoris dixit accedere *r*: Idem in mediocri inspiratione aeris cubicos digitos 15 adtrahi æstimavit, in violenta ad quadraginta *s*. Non valde differt *Jacobi Jurin* æstimatio; aerem nempe de vesica fuxit vir Cl. inque unica respiratione eduxit uncias quadratas 35 & 38 *t*, qui ipsi numeri, cum modica mutatione, ad quadraginta aucti *v*, ab aliis Cl. viris vulgo recipiuntur. Cl. *Pitcarne* ipsum pectus metiri adgressus, diametrum pectoris majorem fecit 20 digitorum, minorem digitorum 15. in utraque nimius: sterni erectionem æstimavit ad $\frac{1}{10}$ digiti, inde pectoris augmentum 31 digitorum obtinuit, & sapienter vidit, magnam molem aeris recipi posse, si præterea longitudo thoracis increverit *x*. *Jacobus Keil* septi transversi descensum ad 2 uncias æstimavit *y*, inde augmentum deduxit pollicum 22. non longe a nobis diversus, ut tamen continuo ad 52 uncias pectori accedere adderet, si id septum paulo magis descenderet. Sterno augmentum deberi putavit 20 unciarum. Ita aeris adtrahi uncias 42. & majori conatu ad 70 & 100. existimavit. Denique Ill. Archiattrorum Gallicorum comes *Senacus* ab aliis 10. & ab aliis 16. aut 17. uncias in una respiratione adtrahi modestior docuit *z*.
 Qui nuper huic labori successit Cl. *Franciscus*

r Prop. 81.

s Prop. 94.

t Diff. p. 41. 42.

v *Hales veget. stat.* p. 239.

Bertier physique des corps anim. ed. 1735.

p. 125. *Boissier disp. cit.* p. 24.

x l. c. n. 21.

y *Abridgm.* p. 256.

z *Essais de physique* p. 377.

Boissier pectoris diametrum in minima inspiratione fecit linearum 120 in mediocri 124. in maxima 128. *a*, & ideo procul dubio nostra majores menfuras recepit, quod ego fceleti costas latitudinem fim metitus, quæ vera thoracis aerem recipientis latitudo est, vir Cl. vero costas & musculos & cutem huic latitudini connumeraverit. Cum sectiones thoracis habeat pro circularibus, erunt eæ ut quadrata diametrorum, adeo maxima, media & minima area ejusmodi talearum erunt uti 16. 15. 14. Cæterum in spatio, quod aer inspiratus occupat, nihil mutavit.

Ad verum hætenus accedi potest, ut magna sit pectoris dilatatio, quæ a diaphragmate deorsum ducto fit. Cæterum cum pectus circularem sectionem minime nactum sit, & ne quidem ellipticam, neque diaphragma planum sit, minime etiam sperare oportet, veros numeros obtineri posse.

§. VII. *Aer detracto diaphragmate in pectus subit.*

Sufficit memorabili portione pectus ampliari, quando diaphragma deorsum ducitur. Sed in eo pectore pulmo est, isque aere plenus. Eum aerem ponimus nihil hætenus mutatum esse; etsi omnino partem sui elateris amisit *b*. Quare diffundet se in spatium, quod in pectore dilatato nascitur, atque tanto fiet rarior, quanto amplius

^a Diff. cit. p. 16.

^b Sect. IV. n. 16.

id spatium est : Ex ea ergo ratione , qua aer pulmone contentus rarior fit , ea succedit in pectus aer circumfusus , donec eadem in pulmone aeris densitas sit , quæ est aeris ambeuntis. Neque adtinet , quomodo hæc dilatatio obtineatur.

Dudum Cl. viri machinam excogitarunt , quæ diaphragmatis officium imitatur. Pulmo dimittitur in vas quodcumque , tantum ut fundo sit mobili *c* : aut in follem datur : diducuntur folles *d* latera , aut fundus mobilis vasis detrahitur , ita minuitur in vase aeris densitas , & aer circumpositus protinus irrumpit. Id vocabant veteres *e fugam vacui* , eaque phrasi veram utique naturæ legem circumscribebant , etsi ponderis aeris ignari , hujus fugæ rationem nullam dederunt. Alio paulum modo cylindro cavæ fundum superiorem mobilem ex vesica addebat *J. Guilielmus Croeser f* , deinde infra vesicam embolo agitato aerem subtrahebat. Ita vesica intra cylindrum descendit , & cava redditur.

§. VIII. *Pulmonis a diaphragmate mutatio.*

Una vero , & necesse est repetere , cum

- c* *Wolferd Senguerd Inquis. experim. Exp. 3. & fere 14. Loescher anthropol. exper. spec. p. 26. Berger de respir. p. 20. Vater physiol. p. 714. Senac in Heisterum p. 350. ed. 1724. Perfecit machinam , & magis compositam ad suos usus reformavit Benjamin Hoadley append. p. 11. tab. I. f 2.*
- d* Ea comparatione usus est
- Aristoteles de vita & morte c. 21. & experimentum fecit Johannes Mayow l. c. quem alii Cl. viri imitati sunt , ut V. F. Plempius fundam. med. p. 120. Phil. Verbeyen L. II. tract. c. 6. Loescher p. 28. Senac l. c. p. 357.*
- e* *De vocalib. instrum. c. 8.*
- Rhazes ad Manzor L. I. c. 13.*
- f* *Ontwerp. p. 2.*

diaphragmate , viscera etiam descendunt. Pulmonis motus per pleuram in vivo animale pellucet , ut non quidem pleuram relinquat *g* , sed albore tamen suo conspicuus , rubrum diaphragma deorsum sequatur.

Hic utilitas intelligitur vaporis , qui pulmonem circumfusus adluit. Facit enim , ut pulmo secundum pleuram absque frictione descendat , & vicissim molliter atque libere *h* adscendat in expiratione , quando idem perinde magna vi sursum repellitur. Hic vapor vanum facit eorum metum , qui verentur , ne pulmo ad pleuram adnascatur , nisi aer intercesserit *i*.

Cum pulmone etiam cor descendit *k* , & mediastinum tenditur *l*. In vivorum animalium incisionibus cor mira vi introrsum rapi , & deorsum , videas & retrorsum.

Ante pulmonem & diaphragma detrusa fugiunt viscera abdominis , & abdomen intumescit.

§. IX. II. Musculi intercostales.

Et si horum musculorum labor in homine sanissimo , & liberrime aerem ducente , vix percipitur *m* , etiam eo tamen in statu hi musculi non penitus inutiles sunt , uti quidem olim *n* , & nuper *o* pro inutilibus sunt habiti.

g Exp. 86. 87. 88. & p. 130. *ter* contrahitur *Bond of the*
h Houstoun exp. 6. *night mare* p. 18.
i Hoadley p. 80. 87. *m* p. 13.
k Ferrein l. c. *n* Antiquis , quos *Galenus* re-
l Inde cor debilius pulsatur *admin. anat. L. VIII. c.2.*
quando diaphragma vehemen- *o* *Helmont* l. c. p. 356.

Pectus certe retinent, ne a musculis abdominis nimis deorsum ducatur *p*. Ipsi ita septo transverso fundamentum præstant stabile *q*, ut ad costas confirmatas suarum alarum partem altissimam & tendinem deprimat, neque, oppositis suis dextris & sinistris carnibus, ad medium tendinem contractis, costas inferiores adducat, eamque pectoris sedem arctet, uti quidem musculis inprimis intercostalibus deletis, vere constringitur *r*.

Præterea omnino iidem muscoli costas non unice retinent, sed vere levant, in multis vitæ humanæ conditionibus *s* & perpetuo forte, etsi obscurius. Feminis *t* in universum providens natura pectus fecit mobilius, ut olim, quando abdomen, a grato fetus pondere occupatum, septi transversi motum morabitur, machinam habeant, quæ respirationem continuet. Videas ergo in sexu amabili, summum pectus alterno motu manifesto, & elevari *v*, & subsidere. Ita in variis morbis, quoties aqua *x* abdomen replevit, & descensuro diaphragmati obstitit *y*, costarum ope pectus elevari. Ita in bestiis incisis, læso diaphragmate, aut aperto pectore, conspicua musculorum intercostalium opera est. Ita in contusione abdominis *z*, &

p p. 62. seqq.

q Winslow *Memoire de l'Académie* 1738. *Expos. Anat.* T. II. n. 1066. 1067.

r Ibid.

s Boerhaave l. c.

t Costas superiores nonnullas

mobiliores esse Winslowus *Mem.* l. c. p. 96. nos omnes.

v Berdot de *suspir.* p. 6.

x Hoadley p. 73.

y Senac *Memoire de l'Académie* 1729. p. 130.

z Ægre tamen Hoadley p. 69.

inflammatione *a* : in nixu, in quo muscoli abdominis rigidi *b* tenentur & immoti, solæ fere costæ moventur. Solæ etiam costæ spiritum adducunt, quoties in revolutio homine, aut manibus innixio, pondus viscerum abdominis diaphragma in pectus reprimat.

Porro etiam in sano homine frequentissime muscoli intercostales laborant, quoties aut ambulat, aut labore se exercet, aut quancumque ob causam celerius respirare *c* cogitur, aut pondus levat, & in vincenda resistantia enititur.

Hanc ob causam intercostales musculos organum respirationis violentæ veteres fecerunt *d*. Etsi enim diaphragma validius eo in statu operatur, & magis descendit, manifesto tamen, etiam in viris, costas elevari videas. Aves, alioquin vero diaphragmate destitutæ, solis costis respirant, quas videas validissime sustolli *e*, sternumque a vertebra recedere *f*. Membranæ enim, quæ eorum animalium viscera dissepunt, veræ membranæ sunt, musculosæ naturæ expertes.

Hinc diaphragmate resecto tamen costæ elevantur *g* : Hinc phrenico nervo reciso, neque

a Galen. diff. respir. L. II. motu Monro bones p. 243.
Houdley p. 72.
b Winslow 1738. p. 68.
c Borellus prop. 84.
d Galenus de caus. respir. p. 260.
Fabricius l. c. c. 10. 11. Vide *g* Exp. 7. 8. &c. Lamzveerde
Kuhnbaum l. c. p. 9. In leni re-
 spiratione parvus costarum mo-
 tus est, magnus in morbo & ablato *Wepfer* etc. p. 303.

superiora thoracis a motu cessant *b*, neque in nostris experimentis ima, & soli muscoli intercostales demum, a magnis viris, inspirationi perficiendæ pares æstimantur *k*. Hinc costis in cadavere elevatis flamma intra os forbetur *l*. Hinc, cum respiratio langueret, eadem, musculis intercostalibus oleo vitrioli tactis, suscitari potuit *m*.

Minime oportet hic *Galen*i experimenta prætermittere, qui musculorum inter costas positorum efficaciam ejusmodi experimentis confirmavit, quibus eos musculos destruxit, & vitia adnotavit, quæ ab ea violentia in respiratione nascuntur. Ergo resectis iis musculis animal obmutescit, & respiratio perit *n*, & parte musculorum destructa tanta pars respirationis læditur, quanta musculorum *o*; & si quid superest raucæ vocis *p*, id ad musculos exteriores thoracis pertinet. Vox itidem & respiratio aboletur, nervis *q* inter costas decurrentibus ligatis *r*, & redit solutis *s*.

Magis autem nocet nervorum intercostalium interceptio, a prima costa ad septimam; minus ea, quæ infra hanc costam administratur *t*.

Porro intercostalibus nervis, & phrenicis, recisis pectus immobile fit *v*, præter eum

b *Galen. admin. anat. L. VIII.*

c. 5.

k *Senac Memoir. de l'Académie des Sciences 1729. p. 130.*

l *Verryst de respir. p. 26.*

m *Kuhnbaum de respir. p. 15.*

n *Administ. anat. L. VIII.*

c. 3. 4. 5.

o. c. 7.

p *Ibid.*

q *c. 3. 4. 5.*

r *c. 4.*

s *Ibid.*

t *Ibid.*

v *c. 5.*

Sect. IV. M. INTERCOSTALIUM ACTIO. 25

motum, quem externi pectoris, & quasi adventitii musculi præstant.

Ita etiam medulla spinalis, ad primam vel secundam colli vertebram recisa, subito necat *x*, Si sub quinta eadem passa fuerit, & pectus & universum animalis corpus motu privatur; si infra sextam, pectoris motus tollitur, non perinde septi transversi *y*. Denique si iterum inferius eadem injuria animali illata fuerit, vix inde thoracis motus quidquam patietur *z*. Dimidia pars dissecta alterum suumque latus resolvit *a*, & animal reddit semivocale. Denique omnis in thorace motus excisis costis funditus disperit *b*.

Eodem redeunt obiter equidem factæ adnotationes. Infantum fasciatio *c* nocet, non adeo diaphragmatis inhibito motu, ac quidem thoracis, & ablato musculorum intercostalium munere; idemque est vitium thoracum balænariorum, quibus virgines se reddunt juncæas *d*.

Quare his omnibus computatis, utique musculi intercostales cum diaphragmate, etiam absque abdomine & reliquis pectoris musculis, soli respirationis officio defunguntur *e*.

Quam vero partem novi in pectore nati spatii sibi costæ sumant, non repetimus *f*. Duplicem in modum dilatare ostendimus, cum extroverfæ

x c. 9.

y Ibid. & c. 5.

z c. 9.

a c. 6.

b c. 7.

c *Hales du ventilateur*,

d Conf. *Winslow Mem.* 1738. p. 69. 96.

e *Berger de natur. hum.* p. 34.

Senac l. c.

f n. 6.

quidem costæ diametrum a dextris ad sinistra dilatent *g*. Tota adeo pectoris cylindrica cavea potest in taleolas dividi. Ex taleolæ ante muscutorum intercostalium actionem obliquum cum columna vertebrali angulum intercipiunt *b*, per eorum vero muscutorum potentiam emotæ angulum nunc rectum describunt *i*. Sed ejusmodi taleola, ad angulum rectum de cylindro resecta, amplior est omni taleola æque lata, quæ de eadem cylindro ad alium angulum secatur *k*.

Ita nascitur triplex illa pectoris & pulmonis a respiratione dilatatio, cum & altitudo per diaphragma prolongetur, & utraque diameter transversa a costis elevatis incrementum capiat *l*.

§. X. Vires accessoriæ quæ thoracem dilatant.

Est tamen non una occasio, ubi ne hæ quidem vires sufficiunt. Intensior nempe inspiratio necessaria est, quoties majorem copiam sanguinis per pulmonem intra idem tempus transmittere est necesse *m*: aut quoties idem pulmo magis transeunti sanguini resistit *n*: aut quando vitæ officia poscunt, ut quam plurimus sanguis ad cor confluat *o*. Quoties aliqua harum condi-

g p. 41.

b p. 42.

i Ibid.

k Dan. Bernoulli de respir.

c. 4. n. 3.

l Borellus propos. 85. ad 90.

Bellinus ante l. de urin. & puls.

Lemma I. Havers of the bones

discurs. Winslow in utroque commentario 1720 & 1738. equidem brevior, quam tantum virum esse malles.

m n. II.

n Ibid.

o Ibid.

tionum nata est, ex ipso voluntatis imperio conjungitur efficacia musculorum, qui superiores costas *p*, qui claviculas demum *q*, & scapulas levant *r*. Ii enim muscoli punctum stabile septo præstant, ut totis viribus deorsum duci, & pectoris longitudinem quam maxime augere possit, neque costas tamen contrahat *s*. Iidem costas elevant, hæcenus intercostalium musculorum auxiliares: & demum, dum supremas costarum firmant, efficiunt, ut eæ ad inferiores costas, tamquam puncta immotæ firmitatis, se habeant, totaque vis intercostalium musculorum in elevationem convertatur, sublata ea omni, qua possent alioquin deprimere *t*.

Dudum has copias a natura futuræ necessitati, & violentissimæ respirationi, paratas *Galenus* vidit *v*, & exteriores musculos thoracis instrumento ducendi spiritus addidit *Hieronymus Fabricius* *x*; recte etiam omnes musculos a parte aliqua firma in thoracem redeunt *Anonymus* auctor pro inspiratoriis habet *y*, etsi non in omni inspiratione laborant.

Huc ergo referimus scalenos *z*, mastoideos *a*, ferratos posteriores superiores *b*, anteriores utrosque *c*, pectorales *d*.

Deinde nuperi scriptores eorum auxiliarium

p T. VI. L. VIII. n. 19. 20.

22. 23. 25.

q n. 21.

r p. 97.

t T. VI. n. 15.

v Musculis in summis humerorum positis de causis resp.

x l. 2. c. 7. p. 45. c. 11.

p. 84. &c.

y *Elemens de physiol.* p. 277.

z p. 79. seqq.

a p. 82.

b p. 87.

c p. 89. seqq.

d p. 91.

musculorum numerum fere minuerunt *e*, non satis forte considerata conspicua illa elevatione humerorum *f* & scapularum elevatione, & colli demum tensione *g*, atque reflexione capitis, quam in me ipso & in ægrius respirante, & sternuturo homine percipio, & in moribundis nemo non vidit. Ea est respiratio sublimis sive *anel-komena*, & *procheira pneumata h*: & *meteoron pneuma i*.

Merito vero malam in morbis significationem hujus sublimis respirationis esse medici consentiunt, cum vel magnam in pulmone obstructionem designet, vel celerrimum sanguinis circuitum, qui amplissimam pulmonis dilatationem requirat.

Cæterum cum tot a musculis inspiratio cieatur, merito quam exspiratio laboriosior est, & longiori tempore fit. Qui celerius absolvi crediderunt se vidisse *k*, eos putaverim in phænomenon incidisse, quod etiam nobis sæpe se obtulit. Tortum nempe animal, & cum dolore inspiraturum, detectis imprimis costarum musculis, subito brevem inspirationem, & imperfectam abrumpit *l*. Sed etiam tunc brevis exspiratio, longa autem post eam quies est.

e Swammerdam c.2. Borellus prop. 84. Senac l. c. Winslow Mem. 1738. Ravius in amphitheatr. 2007.

f In vulnere pectoris claviculae etiam sursum ductae Guarinoni cons. 140.

g Non diffitente Benjamin Hoadley p. 2.

h Coac. L. II. c.10. n.6.edit. Duret.

i Epidemior. L.VII.in uxore Olympiadæ & in L. III.

k Sauvages de respir.diff.p.3. Hahn de aeris in pulm. effect. p. 104.

l Exp. 10. 33. In peripneumonia similis respiratio Journal Encycloped. T. I. p. 83.

§. XI. *Mutatio pulmonis ab inspiratione.*

Pulmo, cum nunquam pleuram deferat *m*, per eosdem passus, quibus pectus dilatatur, & ipse a succedente aere diducitur, unaque & longior, & in utraque diametro latior nunc fit, & in spatium majus; sed sui simile augetur *n*. Id augmentum varie æstimatum est. Quintuplo per inspirationem pulmonem ampliorem fieri, Cl. *Sauvages* conjecit *o*; inde decuplo *p*. Deinde in nuperis scriptis pulmonem coctum, aereque purgatum, duodecies minorem fecit, quam pulmo inflatus est *r*. Sed pulmo ejusmodi multo thorace minor est, vivi autem animalis pulmo non potest suo thorace minor reddi. Siquidem pleuram non deferit. Thoracem vero multo minus quam duodecuplo augeri certum est *s*. Neque bis se ipso longiorem thoracem fieri crediderim *t*, neque adeo pulmonem duplam ad longitudinem crescere. In pulmone fetus tantam reperit *Idem* vir Cl. dilatationem, quando primum aerem duxit, ut 17 sit in fetu drachmarum, qui in adulto homine 528 dr. pendeat, atque adeo trigesies minori in fetu pondere sit, quam in perfecto homine, dum interim corporis moles a 1152 ad 9120. drachmas aucta est, nempe nondum ad octuplum: sed is pulmo scirrhusus erat.

m p. 21.*n* *Bellin Lemm.* II.*o* *De pulsu* p. 5.*p* *De respir. diffic.* p. 25.*r* *Physiol. elem.* p. 113. *des effets de l'air* p. 42.*s* *n.**t* *Effets de l'air* p. 44.

Nunc pulmo cellulis aere plenis constat, & vasis eo ducentibus cartilaginosis, & arteriis venisque. Cellulas illas, ut simplicior fiat oratio, primum inanes pono, collapsas adeo & sibi impositas contiguasque, bronchia retracta, cartilagineos anulos sibi vicinos *v* & aliquando incumbentes, sanguinea vasa serpentina, flexuosa *x*. Nunc in aereas cellulas aer se diffundit, easque undique expandit, sphaericasque redderet omnino *y*, nisi sibi æqua vi resisterent. Ipsos videas, dum inflas, lobulos pulmonum a se invicem discedere, angulos in eorum divisione nasci & incrementum *y*^{*}, eosque lobulos undique nunc in ambitum recedentes quasi rigere *z*. Totus ergo pulmo inflatus ex rubente albus, spumæque simillimus, & una levior fit, & etiam unica inspiratione, quod alibi confirmabimus *a*, densam rubramque naturam *b* & aqua graviolem *c*, pulmone fetus propriam deponit, raramque illam levitatem induit, quæ facit, ut in aquis natet. Ex solo colore, & farta densitate, fetum & mortuum esse, & pulmonem aquæ ima petiturum aliquando prædixi *d*.

v Anulos etiam sibi impositos *Parisini* in ave Numidica viderunt, & olim *Rondelet de piscib.* p. 63. in fetu vero *Petit Mem.* 1733. p. 7.

x Conf. *Malpigh.* p. 15. *VVinslow Expos.* T. IV. p. 139. *Helvetius Memoir. de l'Acad.* 1738. p. 32. 33.

y Sphaericos reddere ex collapsis *Bremond Mem.* de 1739. p. 345. *Kaauw* n. 166.

y^{*} *Barry of consumption* p. 118. 119.

z *Kaauw* l. c. *Pitcarne* l. c. n. 15.

a Vide interim *Exp.* 119. 120. 121. 122. 123. 125. 132. 134.

b *Petit Memoir.* 1733. *Ridley observ.* p. 203. 204. qui glandulæ conglomeratæ non male comparat *Exp. nostr.* p. 357.

c Ut 30. 29. *Sauvages embryolog.*

d *Exp.* 131.

Porro bronchiorum extensorum circelli, particulæque elasticæ, longiori nunc intervallo distant *e*, seque cum superinducti comprehendissent, relinquunt nunc bronchia, ut undique recta sint *f*, plurimaque membrana nunc cartilagineam partem separet.

Sed etiam vasa sanguinea omnis generis undique cum ad tensis bronchis necessario extenduntur, quod etiam in cadavere locum habet: & flexiones alternæ, in quas ea vasa in seipsa retracta & tortuosa in statu pulmonis minimo se receperant, eæ nunc in rectitudinem exporriguntur *g*. Porro, quæ sibi incumbabant proxima, ea a mutuo contactu discedunt, & anguli *h* inter divisiones vasorum majores fiunt, spatiaque adeo vicinis vasis interponuntur *i*.

Præterea in vivo animale, cujus cor contrahitur, & in arterias pulmonales sanguinem data vi emittit, omnino nunc sanguis in eas arterias facilius, atque adeo celerius irrumpit, postquam deletis retardatricibus plicis, recta nunc sunt: Sed inprimis, postquam totus pulmo undique dilatatus est, & plurimus nunc aer vasculoso

e Rondelet l. c.

f Galen. de usu part. L. VII.

c. 4. Stuart de motu musc. p. 113.

g Drake Phil. Trans. n. 281.

Helvetius l. c. Malpighi l. c.

Kaauw l. c. Hales p. 78. Sauvages effets de l'air p. 44.

h Conf. Jacobi Drake T. 13. cum Tabula 14.

i Pulmone, ex prioribus, duodecies seipsis majores &

minores fieri, æstimat Sauvages effets de l'air p. 43. recte hætenus, si pulmonem inspirantem non cum expirante, sed cum cocto & aere inanito comparaveris. Pulmonem enim ita se contrahere, ut decies & duodecies seipso minor fiat, non potest post ea admitti, quæ de pectore semper pleno diximus.

undique reti circumfunditur *k* , maxima vis pressiois de arteriis aufertur , qua ante inspirationem urgebantur. Cum enim in angusto pectore pulmo a parietibus suæ cavæ undique premeretur , inque compactam viciniam vasa ad vasa , membranæque ad membranas pellerentur , nunc contra , nata inter vicina vasa , & circa vasorum peripheriam , levissimi elementi copia , parietum pectoris pressio , vasorumque vicinorum sibi incumbentium pondus aufertur , & nihil est porro , præter aerem , quod in eadem vasa gravitet.

Levissimus aer , lenissima pressio est , non major , quam 40 unciarum cubicarum aeris in totum pulmonem , sive 15 granorum *l* , motorum celeritate ea , ad summum , ut intra minutum primum 9 pedes percurrant , si a summo broncho ad imum pulmonem pedis distantiam posueris , & aerem in una respiratione ab imo broncho ad extremas vesiculas venire tibi sumus.

Sed ejusmodi compressio pene nulla est , si cum cordis vi comparaveris. Is enim musculus non 15 grana , sed fere 960 *n* & ultra , atque adeo sexagesies quater plus materiei ejicit , celeritate , si triplo cor dextrum ponas debilius , quam sinistrum , fere ea , qua 500 pedes intra minutum primum percurrat. Momentum ergo aeris in sanguinem prementis erit ut 135. sanguinis vero in pulmonem impulsus ut 48000 ,
atque

k n. 5.
l Sect. III. p. 198. ed. 1761. n. 8.

n Duas uncias L. IV. p. 132. sq.
o L. IV. p. 362. &c.

Sect. IV. AER IN PULMONEM IRRUMPIT. 33

atque adeo 355 majus, ut pressio aeris pro nulla possit haberi. Multo magis cordis vis superabit, si eandem cum *Jurino* aeris pressionem feceris, quando minima est, $\frac{1}{1230}$ grani, moti intra secundum minutum per digitum, quando vero maxima, ad $\frac{1}{130}$ grani percurrentis eandem unciam *p*.

Ergo sanguis, per leges de aere descriptas, in spatium aereum irruit, tamquam pene nullam resistantiam inveniret, facilitate summa, & celeritate *q*. Minora tamen hæc fient, quia aliqua portio aeris in pulmone semper superest, etiam ante inspirationem, & vasa, & vesiculæ unice mutantur pro ratione novi augmenti, quod pulmoni contigit, & quod non maximum in mediocri inspiratione est, si 40 unciaë aeris adtrahuntur, capacitas vero pulmonis aeri $\frac{225}{3}$ unciis æstimari potest. Erit adeo augmentum fere dimidiæ partis. *Cl. Bernard* putat, extra inspirationem sanguinis partes quadraginta octo in arteriam pulmonalem penetrare, in inspiratione 54; tamen ut primis in initiis major sit facilitas, qua sanguis subit, ea vero perpetuo minuatur. Hinc ab inspiratione summa facilitas nascitur sanguini de corde dextro exeunti, adeoque ex ordine sanguini inde ad cor redituro *r*, adeoque vena cava utraque se celeriter deplet, & sanguis de cerebro, deque totius corporis venis ad cor rapitur, & cerebrum & omnes ex venæ subsident *s*.

p *Jurin* p. 45.
q *Maurocordat* p. 38. &c.
Kaauw n. 166. 167. 617. *Pit-*
carne l.c.n.16. *Morgan*.propos.

VI. *Strack* de reliq. circul. auxil.
r *Swammerdam* p. 77.
s p. 31. 32. &c.

Hinc immeabilis pulmo , quando collapsus , & non inspiranti similis , meabilis redditur , quoties aere inflatur. Facilius ergo per inflatum pulmonem transit injectus quicunque liquor *t* : facilius transit sanguis ipse *v* de corde expulsus. Hinc de inciso pulmone sanguis per inspirationem celerius projicitur *x* , ut in vivis animalibus manifesto visum est. Hinc inspiranti homini pulsus celerior *y* : & suspirium pulsus accelerat *z*. Hinc aere in pulmones impulso , in animale languido , saltus de apertis vasis augetur *b* , celeriorque fit , aut vicissim tardior , uti fortius aer impellitur , aut remissius *c*. Hinc sanguinis majori copia de corde expulsa respirationes majores fiunt , & frequentiores , & contrariorum & minores , si sanguinis copia minor fuerit *d*. Hinc sanguinis quantitas major ex corde pulsa adgnoskitur ex respiratione aucta , estque fere in ratione pulsuum. Hinc altero latere pectoris aperto *f* , aut respiratione a vapore suffocante *g* , aut alio modo læsa , pulsus parvus fit & celer *h*. Hinc suppressa respiratione sanguinis per pulmonem circuitus suffla-

t *Swammerdam* p.82. *Kaant* perspir. n. 160. 161.

v *Swammerdam* p.98. *Thruston* p. 68. *Senac* T. II. p. 234.

z *Mutrocordatus* de pulm. p. 38. 41. 42.

y *Floyer* pulsevat ch p. 382. *Neuckranz*.

x *Henshaw* aerochalin. p.79. ut ad ultimos unguis pullus percipiat ur. Sanguinis saltus

inde a tribus fere pedibus ad quatuor & dimidium auctus est *Hales* p. 16.

b *Bremond* l. c. p. 344.

c *Hales* veget. p. 253. 254.

d *Stiebelin* de pulsu p. 25.

f *Birch* T. I. p. 509. T. II. p. 282.

g *Sauvages* effets de l'air p.47.

h *Robinson* ess. p. 197.

minatur *i*, & animo linquimur *k*, & reddito aere vicissim anima redit *l*. Hinc sanguine effuso; & pulmonem premente, æger animam agit *m*; idemque refocillatur, eo sanguine educto.

§. XII. Experimentum Hookii.

Hinc illud celebre experimentum, quod *Hookio* tribuitur, cum dudum ante Cl. Virum factum sit. Nempe deleta pectore, pulmone aeri exposito, & collapsa, hinc impervio, quando bestia nunc animam agit, & morti proxima videtur, inflato pulmone vita fugitiva revocatur.

Id experimentum, cum ad excitandos homines aquis merfos nuper utiliter adhibitum sit, paulo accuratius liceat exposuisse. Primus *Vesalius* moribundum animal inflato æere revocavit, cordisque motum restituit *n*. Idem refert *Nathanael Highmor* *o*, & pullos avium suffocatos aere inflato reviviscentes *Bogdanus* memorat *p*. Inde *Guilielmus Croone*, ante *Hookium*, pullum strangulavit, & cum nullum nunc vitæ signum ederet, aere in pulmone inflato fecit ut revivisceret *q*. Promiserat experimentum 25 Maii 1664 *r*; exhibuit primo Junii *s*. Ali-

i *Phil. Transf.* n. 240. ligata aspera arteria *Birch* T. II. p. 282.

k *De Bremond* l. c. p. 343.

l *Bremond* ibid.

m *Salzmann de sang. ex peric. effuso*.

n *L. VII.* p. 124.

o *Disquit. anat.* p. 190.

p *In apologia pro lymphaticis Bartholini*.

q *Birch* T. I. p. 433. conf. *Thruston diatrib.* p. 63. *Collins* p. 536.

r *Birch* T. I. p. 431.

s p. 433.

quanto serius 22 Oct. & 2 Nov. 1664. *t.* *Robertus Hooke* thoracem canis, & abdomen, late aperuit; organa respirationis legitima destruxit; deinde aerem in pulmones inflavit, cordisque motum restituit, & per integram horam conservavit *v.* Id experimentum aliquoties repetiit *x.* Moriebatur animal, & stagnabat sanguis, quam primum a flando cessabat *y.* Idem experimentum socio *Lowero* coram societate Regia instituit *z.* Iterum alio modo, cum canem coegisset de vesica respirare, & pulsus nunc celerissimus fieret, & debilissimus, atque animal convelleretur, inflato pulmone, & recente aere reddito, suscitavit animal *a.* Neque necesse est fodicare pulmonem *b.*, neque alternas vices expirationis & inspirationis imitari, nam etiam immoto & integro pulmone, cordis tamen pulsus sustinetur *c.*

Inde celebre *Hookii* nomine experimentum passim a variis repetitum est. In ranis, per aeris a vacuo spatio absentiam pene enectis *Cimentini* Academici *d* imitati sunt, in aliis animalibus *Parisini e*, & *Malpighius f*, & *Johannes Muraltus g* & alii *h*, inque fetu *Claudius Nicolaus*

t. p. 482.

v. p. 485. 486. Conf. *Phil. Trans.* n. 28. *Sprat history of the R. Soc.* p. 232.

x. *Birch* T. II. p. 181. 187.

y. T. I. p. 486. T. II. p. 198. *Bagliv.* p. 294. *Ridley obs.* p. 141.

z. p. 198.

a. p. 281. 282. 283. 292.

b. p. 242. 262. & *Neukranz.*

c. In *Hookii* experimentis *Birch* T. III. p. 407. & plero-

rumque, qui repetierunt.

d. p. 107.

e. In *anat. testudinis.*

f. In epistola ad *Borellum.*

g. *Vademec. anat.* p. 143. 144.

h. *Baglivius* p. 294. *Ridley* p. 141. de *Bremond* l. c. p. 342.

344. 356. *Kaauw impet.* n. 459.

Lanzweerde l. c. p. 148. *Perrault*

Essais de physique T. IV. p. 148.

Crassous de generat. p. 39. *Ra-*

venstein Geheimnisse p. 149.

le Cat i, pari omnino successu. Non folle, sed aere in vacuum spatium dimisso usus est *J. Guilielmus Pauli k*. Presso aere ex vesica in canem, *Stephanus Hales l* animal refocillavit, ex aere non renovato periturum. Idem experimentum sæpe institui, & facillimum *m* reperi: fecit nuper *Cl. Portal*.

Nunc id periculum captum est in animale fere strangulato *n*, aut ex admissio in thoracem aere suffocato & moribundo. In ejusmodi animale & in homine, cui laqueo gula fracta est, sanguis colligitur o in vasa pulmonis, & cordis, & cerebri; eumque replet, cum transitum non inveniat. Per experimenta enim numerosa nuper capta constitit, strangulatos equidem sæpe cum signis apoplexiæ perire, sanguine in cerebrum ejusque sinus congesto o*, vasis encephali cruore plenis, suborto delirio, & sopore.

Vera tamen causa mortis utique in *Stoltii* aliisque periculis est, quod aspera arteria a laqueo intercepta, pulmo respirationis usu privatur

i *Memoire sur le mouvement des muscles* p. 24.

k Apud *Lutherum de anomal. pericard.*

l *Veget Statiks* exp. 114.

m Exp. 476. & de respirat. exp. 40.

n In experimento *Croonii*, *Ravensteinii*, *Kaam imp.* n. 459. *Muralti*, *Peralti*.

o *Rodder* post *Alberti med. leg. cas.* p. 802. *Cheselden* p. 191. *Hafenest medic. Richter* T. II. p. 41. *G. D. P. della morte apparente dell' anim. Harvei Exerc.*

III. p. 251. *Satur. Siles.* T. II. n. 4. *Cassebohm Se&ct. viscer.* p. 5. *Hafenest l. c. Simson* p. 150. *Weber Fascic. II.* obs. 6. *Buttner zwey - köpficht Kind* p. 11. *Haen rat. med.* T I. *Gummer submers.* Cava vena pugnæ equalis in strangulato *Riolanus in Gassendum* p. 111, & rupta denique *Corn. Consentinus in progymn.* p. 115. Sanguis super intestina effusus *Leeuwenhoeck Phil. Trans.* n. 14.

o* *Mendel de suffocatis.*

ab aere distendi nequeat, hinc sanguis in dextris cavis cordis, in arteria pulmonali, in pulmone & demum in omnibus venis colli, pectoris & abdominis congeratur, ad sinistras vero cordis caveas nullus veniat, & arteriæ ipsæ inanes sint. Neque absque exemplo est venas enormiter distentas, demum ruptas fuisse, ipsam demum *Cornelio Consentino* teste cavam venam, passimque sanguinem effusum, & super cerebrum & super intestina. Non video quare *Ill. Haenio* visum sit, sanguinem non frequenter in cerebrum congeri o*.

Cl. *Stolte* experimenta huc faciunt in submersis capta, & memini in nobilissimo viro ob injustum homicidium in Anglia laqueo extincto, sanguinem sub cutem brachii & manuum effusum fuisse †.

Quæ strangulatio mala facit, eadem a submersione sub aqua fiunt, inque iis, nostro ævo multorum bonorum civium conjunctis conatibus magis cognitis, liceat hic aliquanto esse uberiores.

Animal sub aquammersum aerem quidem captat & inspirare conatur, & in mortuo etiam

o* l. c.

† *Dettharding, Evers* p. 5. *Roderer* p. 11. Facies livida *art de faire les rapports* p. 516. Vena cava inde maxima *Fontan. consil.* p. 11. *Littre hist. de l'Académie* 1704. n. 2. A ruptis valis sanguis de ore exit, quo cum signo negant Fenni hominem

suscitari posse *Birch T III. p. 6.* Idem erumpit ex iis, quos vapor cloacæ occidit *Dionis mort subite* p. 113. & perit, qui altero die sanguinem vomuerat, cum ex aquis extractus & refocillatus fuisset *Eph. N. C. Vol. I. obs. 124.*

epiglottis erecta reperitur *, sed aqua cinctum aerem non invenit, & plerumque aquam deglutit, & in ventriculum & in pulmonem, ut etiam fundum petat, ut in strangulato o**. Etsi enim exempla sunt, in quibus aut in ventriculo o† submersi animalis nulla aqua fuit o††, aut in ventriculo aut in pulmone, longe tamen plerumque in cadaveribus incisis & in ventriculo p aqua reperitur, & in pulmone q inque aspera arteria, cum residuo aere, qui in pulmone relictus erat, subacta, inque spumam versa. Utramque aquam & ipse vidi in animalibus de industria submersis, & viderunt plurimi Cl. viri q*, etiam suum per colorem conspicuam, cum in aquam tinctam animal experimentis causa demersissent: eamque homines infelices q** vomitu rejiciunt. Demum ex iis hominibus, quos laudabilis industria Societatis Amstelodamensis servavit, plurimi

* *Hannov. Magaz.* 1763.

o** *Buttner* p. 11.

o† *Veber* ib.

o†† *Detbarding Hist. de l'Acad.* 1719. p. 29. *Alberti Med. Legal.* T. II. p. 289. *VVespremi obs.* *Kulnius anat. monstr.* p. 39. 40. *Exp. sur la respir.* n. 138. *Bruhier sur l'incertitude de la mort* addit. p. 190. *Veber fasc. II.* 2. & inprimis *Engelmann* l. c. p. 394.

p *Gummer* l. c. exp. 2. 4. 6. 7. *Hanover Magaz.* 1763. *Mendel.*

q *Birch* T. III. p. 7. *Louis sur la certitude des signes de la mort* p. 239. 241. 297. *Evers disp.* p. 20. ad octo & sex uncias *Exp.* 1. & in puero *exp.* 5. *Eschenbach Med. Legal.* p. 74.

Rocderer satur. p. 3. 51. *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 26. *Hæuermann oper.* p. 370. *Exp. sur la respir.* n. 135. 136. 137. *Hæenrat. medend.* T. XV. *Boyle Phil. Tran.* n. 62. *Gummer* l. c. *Mendel* Inde spuma illa ante os, etiam Cl. *Engelmann* dicta *Verhandel van der Maatsch* T. IV. p. 378. & *art de faire les rapports* p. 516 *Pulmo pituita plenus Comm. Lit. Nor.* 1736. hebdomada 8. *Gummer* ib. exp. 2. 4. *Boyle Phil. Transf.* n. 62. in an. *V. Medec.* in lite *Claudinae Rouge*, experimento facto.

q* *Gummer* ubique *Exp.* 1.

q** Ipse *Forestus obs. chir.* L. VI. p. 33. *Pia sur des noyés.*

aquam spumamque de ore reddiderunt *r*, etiam vomuerunt, aut per alvum egerunt, & admistum perinde lutum *r** & aqua saponaria *r***.

Cum vero aqua non perinde ut aer pulmonem ita distendat, ut per rarum elementum sanguis de arteriis in venas facilius transeat *s*, & potius pondere suo transitorio sanguini resistat, fit ex submersione, quod ex strangulatione, ut nempe sanguis in arteria pulmonali, ventriculo & auricula dextra, inque venis ad cor ducentibus colligatur, neque ullus in sinistras *t* caveas, etiam meo experimento; ita subtracto sinistro cordi suo stimulo quiescit idem, & venæ demum rumpuntur, aut in pulmone *t**, aut alibi. Ita in Cl. viri Professoris nunc Gottingensis *J. Frederici Gmelini* periculis, ita in *Haenii*, pulmo a congesto sanguine in fæctus est, ut aquæ jecoris similis videretur, & fundum peteret *v*. Hæc theoria, mortisque ab impedita respiratione deducta causa *x*, confirmatur experimento canis, qui submersus sub aqua vitalis superest, si per longum tubulum ex aspera arteria educ-tum super aquam ei aeris comneatus reservatur *y*. Hinc submersi feliciter nonnunquam per *Hookii* experimentum servati sunt *y**.

r Homo Cl. *Pia* dictus etiam ster-cus deglutitum & simul tres pintas aquæ revomuit IV. p. 155.

*r** Laudat *Louis* p. 271.

*r*** *Forest* XV. obs. 2.

s n. II.

t *Evers*. In suffocatis a fumo carbonis, a fumo sulfuris *B. Langrish* L.I. exp. 152. a vapore fontium babylonicorum *Diodorus* II. c. 52. a vapore ntri pestiferi *Bel. Phil. Transf.*

n. 452. ab aere non renovato *Menghin. Bonon* II. P. 2. p. 274.

*t** *Roux Journ. Med.* 1774. Oct.

v *Buttner* l. c. *WVeber* 116.

x *Hist. de l'Acad.* 1725. 12.

y p. 226. Auctor excidit.

*y** In program. Argentorati edito, & a Cl. *Behrens* recuso p. 7. Conf. *Comm. Lit. Nor.* 1740. n. 34. *Borell. Cent. III.* obs. 58. *VVespremi* observ.

Hi homines aliquamdiu non vivunt *z*, cum neque cor saliat, neque respirent *a*, neque sentiant, neque extracti meminerint eorum, quæ sibi acciderunt *b*, demum frigeant toti, & eorum conditio in veram perpetuamque mortem transeat, nisi auxilia artis accesserint. Aliquod tamen tempus est, & pro strangulatis & pro submersis, & pro enectis a fumo carbonario, in quo a benefica amicorum industria suscitari possunt: idque tempus in submersis quindecim minutorum, semihoræ, etiam horæ integræ in iis miseris fuit, quos Societas Amstelodamensis vitæ reddidit *b**. Mirificas historias legas, in quibus narratur, multas post submersionem horas tamen potuisse vitam restitui, maxime mirifica olitoris *Pechlino* dicta; non facile tamen fidem adhibeo, qui & ipse vidi, & Cl. *Haenium c*, & *Gmelinum* habeam consentientes, pauca post minuta horæ aves *d* canesque irrevocabili morte interiisse, neque ullo conatu, neque scintillis electricis eductis potuisse suscitari. Videtur hic aliquod hominis esse privilegium, qui cum paulo aqua gravior sit, subinde emerferit aeremque

z L. IV. p. 449. seqq.

a Obscure respirare *Eschenbach*.

b *Pia*.

*b** *Drenkeling* p. 28. Minutis 80 hirundo *Hamb. Mag.* 1767.

n. 20. Verum non erat mortua, & cor pulsabat.

c Difficulter suscitavi, sic

Haen XV. Unicum canem post 4. minuta idem *Haenius* revocavit, sic *Eschenbach*. Multa animalia non potuit suscitare *Portalius* a vapore moribunda.

d Post semi minutum mortuæ *R. Boyle Phil. Trans.* n. 62. Alia animalia intra sex minuta, sic musculus celerime.

captaverit, cujusmodi cani vi sub aquam merfo nihil contingere potest. Id tamen privilegium non potest adeo laxari, ut homo hæctenus animalibus quadrupedibus simillimus, & perinde aquam deglutiens, eventus ab animalium casibus totos diversos sperare possit, & procul dubio præsidia, quæ continuo laudabo, sæpe tenax illa spuma inutilia reddiderit, qua pulmo & bronchi submerforum replentur.

Nempe ea si via libera foret ab aere in os inflato plurimum sperarem, quo infantes *e*, qui a partu non valebant respirare, vitæ sunt red-diti; quo restituti, quos fumus carbonarius occiderat; quod etiam auxilium passim & a Cl. *Bertrandi & Wezpremi*, a *Borello* aliisque commendatum sit, & ab *E. Squaria* luculento experimento in femina confirmatum, quæ 45. minutis horæ in puteo merfa fuerat *f*, quod idem Amstelodami frequentissime efficax experti sint. Omnino etiam nunc, ut in *Hookii* experimento, aere vi impulso, pulmo moribundi hominis distenditur, & redditur sanguini arteriæ pulmonalis libertas, qua in venam transire, pulmones expellere, in arterias viam sibi aperire possit. Cor etiam sinistrum, quod ab officio cessaverat, ad pulsationem redibit stimulo recuperato, quo ex lege naturæ ad micandum compellitur *g*.

Cum vero aut ob eam, quam accusavi spumam *g*^{*}, aut ob aliam quamcunque causam aer

e Mendel, Portal apud *Colomb* p. 17.

f Portal. rapport. In puerpera *Pia* IV. p. 174. alia p. 157. in strangulato *Mussgrave*, in cane cui ligata aspera arteria *Simson* p. 150. in cadavere

Bohn sublan. p. 459. 460. in vivo

Grubel E. N. C. Dec. II. ann.

IV. obs. 43.

g L. IV. ad fin.

g^{*} *Negat Jeannin mort subite* p. 29.

impulsus difficiliter pulmonem distendat, alio modo quæsitum est, ut cor quiescens restituto sanguinis stimulo ad micationem incitetur. Bonus olim *Albinus* *h*, & nuper *Roedererus* *i* suaserunt, compresso abdomine & pectore sanguinem mechanica pressione urgere, ut ad cor sinistrum veniat.

Ad fine auxilium est id, quo *Wepferus* *k* olim; deinde *Needhamus* *l* corda mortua cogebat reviviscere. Inflabat ductum thoracicum; aer in pulmonem veniens urgebat sanguinem, ut in sinistras cordis caveas subiret, ita pulsum rhythmum redibant.

Non alienum ab isto consilium est incisionis venæ alicujus *m*, potissimum vero jugularis venæ *n*, ut per amplæ & cominus pulmoni præfectæ. Ostendi in vivis animalibus *o*, quoties cor quieverat, & sanguis arteriosus a motu cessaverat, incisa vena sanguinem fluxisse, & cor ipsum ad motum rediisse, dum simul oneratus pulmo liberabatur. Id consilium vulgo notum est, & ab Amstelodamensibus passim utiliter adhibitum. In *Cl. Gummer* experimento canis revixit, cui aquis merso casu *p* jugularis vena læsa fuisset.

Plerumque tamen facilius auxilium præfertur, irritatio nempe quæcunque vehementios, sternuta-

h *Kurzer Handgrif*, et si ei alius scopus fuit.

i *Satur. de suffocat.*

k *Cicut. aquat.*

l Apud *Thruston* respir. p. 63. alii *L. IV.* p. 402.

m *Louis* p. 290. *Portal* rap-

ports in suffocatis a noxio vapore. In anhelosis *Thruston* ib. p. 64.

n *Drenkeling* I. p. 28.

o *Memoire sur le mouvement du sang* p. 301.

p *Exp.* 6.

tionem *q* cientia medicamenta, acria ori infusa *r* naribusque, ignis admotus *s*, dolor quicunque vehemens *s*^{*}, adpersa abunde frigida *t*, scintilla electrica: *v* & potissimum clyster tabacarius *x* proprium per siphonem subditus, ut acris fumus incensi tabaci diu & repetito in intestinum impulsus, id ad motum peristalticum sollicitet, ac eo motu ipsa sanguinis circulatio cordisve motus restituatur. Hoc instrumento Societates illæ beneficæ Amstelodami & Parisiis nunc feliciter uti solent *y*.

Bronchotomen referas ad inflatum aerem. Eam proprio libello *Dethardingius* junior commendavit, & experimento confirmavit *z*, alii improbant.

q *Paré* p. 879. *Thruston* p. 66. *Bruhier* p. 123.

r *Boerhaave prælect.* I. n. 72. *Journ. historique* 1731.

s *Verband. der Holl. maatschap.* IV. p. 418. *Isuard* in libello.

s^{*} *Diff. sur les noyés, couronnée à Besançon.*

t *Trankebar Mission. Cent.* XXX. p. 829. *Roederer* p. 34. *Elem. phys.* IV. p. 496. *Pia* spiritu salis ammoniaci in nares dato.

v In suffocatis a noxio vapore *Portal.* Canis, qui in specu Agnani lacus exanimis factus est, a solo aere non facile suscitatur, melius in aquam projectus *Birch. Hist. of the R. Soc.* I. p. 421.

x In exanimis a lapsu *Pia* IV. p. 137. Motum submersæ avi ego reddidi, non vitam,

y *Vander Sterre van de tee-ling* p. 125. *Acadiensis* apud *Diereville Voyage d'Acadie* p. 190. & in *Beschreibung von Neuſchottland* p. 69. *Louis* l. c. p. 277. *Isuard* in proprio libello p. 28. *Mead of poisons* p. 174. *Boerhaave præl. J. R. M.* n. 42. *Lauremberg & Lemoine* Non ergo demersorum vitæ fomes ultimus respiratio *Engelmann* l. c. p. 387. *Pionier* in *Journal des Savans.* *Pia* sæpe *P.* IV. ita revocari vidit, cum nihil aliud proficeret. Alia similis fere historia repetitur in *Freye Urtheile* 1750. n. 82. Rejicit in casu vaporis noxii *Portal.* Alium clysterem feliciter adhibitum habet *Cl. Ziegler de submers.*

z *Pia* IV. p. 178. 179. post semihoram. Laudant in *Drenkelingen* I. p. 28.

A foramine ovali nihil hic oportet expectare, in cujus apertione spem *d* servandorum submersorum nonnulli posuerunt, ut etiam animalia juniora repetitis submersionibus crederent aquæ adsuefieri posse, & foramen ovale liberum per totam vitam servari *e*. Viderant juniora animalia diutius submersionem ferre *f*. Sed ejus privilegii causa in corde est magis irritabili *g*. In nostris *h* enim, & aliorum *i*, experimentis apertum in homine, inque animale, id foramen mortem ab aquis minime moratum est, neque necem a strangulatione *k*, aut a suffocatione *l* sequentem avertit. Sed etiam in *J. F. Gmelini* experimento catellus sub aquas merfus periit, cui foramen ovale nondum clausum fuerat. Et apud *Pierkinum* Leodiensem submersus interiit, cui foramen ovale apertum erat *l**. Fabulosum est, castori aut phocæ adulto foramen ovale apertum patere.

§. XIII. *Inspiratio continuata sanguinem in pulmones congerit.*

Paradoxum videri possit, ab inspiratione sanguinis in pulmonem com meatum expediri: inflato etiam aëre, quod genus est magnæ inspirationis, animalia moribunda reviviscere, &

d *Harvei* p. 64. *VValæus* *Epist.* II. p. 476. *Cartes.* *form. fet.* p. 202. *Phil. Trans.* n. 454.

e *Vandermonde* *art de perfectionner l'espece humaine* T. II. p. 223. 224.

f *Idem* *ibid.* p. 222. Soli Nigritæ juvenes, neque post annum 23. urinari norunt, & sub aquis edurare *Dargenville* *conchyl.* p. 178.

g *L.* IV. p. 405.

h *Exp. sur la respir.* 135. 136.

i *Roederer* p. I. 2. 6. *Evers* exp. I.

k *Boyle* apud *Birch* T. III. p. 74. *Riolan* p. 392. *Chefelden*

p. 288. *Eph. Nat. Cur. Cent. VII.* obs. 61. 62.

l *Roederer* p. 6.

*l** *Sigaud de la Fond.* p. 298.

sanguinis per pulmones iter revocari : & tamen hanc eandem , adeo faventem sanguinis per pulmonem motui inspirationem , sola paulo diuturniori continuatione , anxietatem primo incredibilem facere ; deinde , si vel voluntatis violento imperio tamen aer in pulmone retineatur , vel ab alia causa intra pulmonem copiosior fervetur , denique sanissimum , & fortissimum hominem subito interire. Hæc enim mors fuit latronis ad *Augustum* ducti *m* , & servi barbari , de quo *Galenus* scripsit *n* , & alius de quo *Walther Raleigh* apud *R. Bathurst* , hoc idem mancipiorum Angolenfium artificium o. Hanc eandem mortem olim alteri & maximo tetraonum generi , pervicaciter spiritum retinenti , familiarem esse legitur *p* : Hæc demum infantibus , aut ex ira , aut alio ex infortunio aerem retinentibus *q* perniciēs.

Deinde par omnino mors est hominum , aut animalium , quando in aere compresso & validiori extinguuntur *r* , in quibus pulmones inflati *s* & distenti reperiuntur , omnino quales per inspirationem facti sunt *t* , cum nimium aeris pondus expirationem inhibet *v*.

m *Valer. Max.* L. IX. c. 12.

n *De mot. muscul.* L. II. c. 6.

p. 637.

o *Dodart Mem. de l'Acad.* 1706. p. 520. & *Mémoire de l'Acad.* 1725. *Du Mont hist. de la Louisiane* T. II. p. 244. *Zucchelli in relazione di Congo* p. 501. Addit id revoluta , & in asperam arteriam impulsa lingua fieri. Negat equidem *Fontanus*

anat. p. 338. Sed testis adest oculatus.

p *Plinius* L. X. c. 22.

q *Ill. Schreiberus de lacrimis* & *fletu* n. 93.

r & *Gravezande* T. II. n. 2237.

s *Birch* T. I. p. 427. Distenti in homine aquis suffocato *Vespræmi* obs.

t *Schaarschmidt Berlin. Relat.* T. IV. p. 310. 311.

v *Idem* *ibid.*

Se&t. IV. MORS AB INSPIRATIONE PRODUCTA. 47

Hujus nunc anxietatis , & suffocationis , & denique mortis causam non est arduum invenire. Adparet enim , ab inspiratione diutius continuata sanguinem in pulmonem quidem advenire , & congeri *x* , exitum vero ex pulmone non invenire.

Nixus enim est ipsa diuturnior inspiratio : sed in nixu sanguinem in vasis stare & colligi ostendimus *x**.

Deinde , cum venæ se deplere nequeant , etiam in arteriis sanguis stat congestus , easque dilatat. Nihil frequentius aneurysmate ex nixu nato. In equis pontes conscendentibus , dum graves carros trahunt , frequentia aneurysmata.

Ab eadem causa vasa denique passim rumpuntur , ut in rene sanguis in vias urinæ transeat , inque cutis vascula , & in cellulosa spatia varia , aut de labiis effundatur.

Ex ipsis arteriis incisis sanguis nitenti altius salit *y* , in *Stephani Hales* experimentis in equa quatuor integris pedibus. Retento spiritu pro lubitu juvenis ex vulnere pedis sanguinem expellebat *z* , & vicissim suppressa respiratione sanguinis de vulnere saltum sistebat *a*. Arteria insignis rupta in femore & mors subita *b*.

Hæc in modica hætenus inspiratione constanter fiunt. Nam eadem diutius protracta

x *Sauvages diffic. respir.* p. 3. p. 15. 27. 162.
Swammerdam p. 80.

*x** *L. VIII. S. IV. n. 34. p. 397.* *z* *Swammerdam de respir.*
ed. 1769. p. 9. & fere *Baglivi* p. 458.

y Quatuor inde pedes altitudini saltus sanguinis in equa , &
3 1/2 in ariete additi *Hales hæm.* *a* *Baglivi fibr. mot.* p. 52. *b* *Guattani l. c.*

demum sanguinis ad finistrum cor redeuntis penus subprimitur, & cruoris adeo copia corpori universo debita diminuitur, & cordis vires labascunt, & pulsus parvus fit & lentus *c*, & vertigo obrepit *d*, & denique pulsus omnino evanescit *e*: quo quidem celebrem illam tribuni militaris *f* historiam refero, qui ex arbitrio, ut amico spectaculum præberet, mortui speciem induere noverat. Ab eo statu ad mortem breve iter est.

§. XIV. *Causa hujus congestionis & stagnationis.*

Aliquam partem hujus a retento & congesto sanguine natæ anxietatis sunt, qui ad cor pertinere crediderint. Nulla vero ejusmodi anxietas in maxima palpitatione percipitur, dum pulmo liber sit.

Videtur iter sanguinis per pulmones inhibatum, eo sensu, omnium minime tolerabili, animæ se prodere, ut ad corporis conservationem vires suas intendat: omnino uti dolor alias causas nervis inprimis inimicas denunciatur.

Mechanicam causam difficilioris post diuturnam inspirationem sanguinis per pulmonem transitus pauci aperire sunt conati. Nolim a diaphragmate derivare, quod cor deorsum tractum in
motu

c Senac T. II. p. 238. *J. de* inspiranti minuitur Galen. diff.
Gorter de perspirat. p. 333. *resp.* p. 12. Suffocatio voluntaria
d De Gorter ibid. *Cigna respir.* n. 3.
e In impostore Camerar. *memorab. Cent.* I. n. 64. Pulsus *f* L. IV. p. 421. 422.

motu turbet *g*. Neque tamen nullæ hic septi transversæ partes sunt, quod incitato nixu rumpatur, & non dubie abdomen vehementer comprimat *i*, & ad quod coliint, a nixu rupti exempla oporteat referre *k*. Sed diaphragmate minime vehementer contracto tamen eadem anxietas, mortisque necessitas ingrueret, si vel in leni inspiratione peristeremus.

A longitudine arteriarum pulmonalium aucta angustiam nasci, aque ea anxietatem Cl. olim *Samuel Theodorus Quælmalz l*, deinde *Franciscus Boissier m* phænomeni interpretationem quæsit, qui arterias quadruplo angustiores reddi æstimavit *n*, atque inflando addit se impedivisse, ne aqua ex arteria pulmonis in venam commearet *a*. Ut omnino a sola mediocri extensione hujus arteriæ libertas circumeuntis per pulmonem sanguinis penderet.

Verum certe arteriæ pulmonalis non unice longitudo augetur. In vase quocunque cæco, si undique resistantiam demseris, aut vim auxeris impellentem, non axis siphonis solus, sed una utraque latitudo augebitur, estque in pene facile exemplum, etiam post mortem cera repleti. Nunc undique de arteria pulmonali per inspirationem resistantiam demi ostendimus. Sed præ-

g Inde debilem pulsationem in vehementer nitente derivat *Schaarschmidt Berliner Nachrichten* 1740. n. 38.

Cl. Bond of the nightmare p. 18. *l* In progr. ad Cl. Bosc disp.

i Hales p. 162. Strake disput. anno 1748. edito.

cit. *m* Effets de l'air p. 44.

k Breslauer Samlungen 1719. *n* l. c.

a p. 45.

terea vehementer distento pulmone liberrime & sanguis *b*, & aqua *c*, & alius liquor ex arteria in venam pulmonis transit.

Simpliciter valde *Præceptor d* phænomenon a quiete pulmonis deduxit, quæ sit in summa inspiratione; persuasus, non posse sanguinem per id viscus trajici, nisi perpetim dilataretur. Verum experimenta ostenderunt, utique trajici posse *e*.

Similia fere habet *Bartholomæus de Moor f*, vasa nempe aerea, alioquin cartilaginea, per inspirationem dilatata, rubra vasa comprimere.

Altera, multo magis recepta theoria est, quæ hoc impedimentum circumeuntis sanguinis repetit ab aeris in pulmonem recepti, & a contactu calidioris sanguinis calefacti, aucto elatere atque pressione.

Nempe sanguis calet gradu fere 96 fahrenheitiani thermometri *g*: aer atmosphæræ verno tempore ad 60 gradus tepet. Miscetur in pectore adeo fluidum calidius & frigidius, & fit inde, divisa differentia, fluidum medio modo æqualiter calens, ut vulgo creditur, 78 graduum *h*, etsi incrementum caloris in aere a Cl. olim *Georgio Wolfgang Kraft i* paulo aliter determinetur, cui positis

b Ib.

c ib. p. 34. seqq.

d J. R. M. n. 619. & fere similiter Ill. *Senac* *Essais de physique* p. 386. Ed. II.

e p. 36.

f *Instaurat. med.* p. 357. seqq.

g L. V. p. 60. seqq.

h Conf. *Bong.* de gradu caloris p. 18. Gradum 69. *Hales hæmast.* p. 100.

i *Physic. theor.* p. 279. Reperit, in nostro casu, sumtis massis æqualibus, gradus adquisitos 15. Sed nunc non est ad manus.

massæ *a* caloris gradibus $m = \frac{11 am + 8 b n}{11 a + b b}$ & alte-

rius massæ *b* gradus caloris $n = \frac{11 am + 8 b n}{11 a + 8 b}$

inde positis massis aeris & sanguinis æqualibus, calore vero aeris minori quam calor est sanguinis, ut $a + 8$ sit incrementum caloris in aere = 11. Ab ea formûla *Rikmaniana* iterum aliter se habet, sed parum differunt omnes. Neque in eo calore subsistimus, cum enim neque sanguis in pulmone refrigeretur, neque aer de pulmone leniter expulsus ipso sanguine frigidior fiat, admitti potest, aerem totis illis 36 gradibus incallescere, quibus a sanguine superatur: neque nunc diligenter quærimus, quæ causa sit, cur aer ad eum gradum incalescat. Sed clausus nunc aer est, qui pulmone receptus continetur: rarefiet idem pro ratione novi caloris, una quidem octava parte, ut ex *Stephani Hales k* experimento solet recipi, aut accuratius forte $\frac{1}{5}$. Nam aer a 32 gradu, qui congelationis est, calefactus, ad 214 gradum, qui est aquæ ebullientis, rarefit una tertia parte sui voluminis *l*. Nunc si ab 182 novis caloris gradibus parte rarefcit tertia, rarefit parte 15^{ta} a gradibus 36.

Si 15^{ta} parte sui voluminis aer rarefit, & pectus ad summum expansum est, neque porro pulmo potest latefcere, neque in pulmone clauso aer se potest expandere, quin reliquam partem pulmonis, ejusque visceris systema sanguineum com-

k Veget. stat. p. 245. 246. Ad art. III.

nonam Gouraigne physiolog. l Sect. III. p. 205. ed. 1767.

primat, angustiora ergo reddentur vascula pulmonis, equidem quindecima parte sui, atque inde deducitur id impedimentum circuitus sanguinei, quod ab inspiratione continuata sequitur.

Videtur etiam consentire non unum experimentum. Nam certum est, calidiorem aerem atmosphæricum respirationi molestum esse, atque anhelationem facere: certum a frigidiori aere inspirato, a frigido etiam potu secundum pulmonem descendente, nos levamen aliquod accipere, quo videatur ea aeris interni rarefactio contemperari.

Video etiam compressionem sanguinis in rete vasculoso pulmonali majorem reddi posse, quam est $\frac{1}{13}$, quæ quidem portio non videtur tantum incommodum producere posse. Si nempe aereum systema pulmonis majus feceris, quam systema sanguineum, poteris fere pro lubitu circuitus sanguinis impedimentum augere *m*. Et omnino certum est, vesicularum caveam majorem esse earum pariete, uti cavea sphaeræ plus continet spatii, quam circumferentia, cui aliquam exiguam crassitiem dederis, ut fiat commensurabilis: deinde ambitum vesicularum membranæ esse, cujus membranæ pars aliqua vasculis fiat, multo major mera solida cellulosa tela sit *n*. Quare si aream aeream triplo sanguinea area latiore feceris, & ponas, dilatari eam aream subquindecupla parte, certè subquindecupla portione nunc sanguinem in minimis vasculis pulmonis meantem comprimet.

m Causam enim auges, quæ sanguinem comprimit.

n L. VIII. p. 194. ed. 1761.

Itaque hæc explicatio incommodi intolerabilis a continuata inspiratione nascentis, a multis physiologis recepta fuit o, & ab ipso nostro Boerhaavio similia fere proponuntur, tantum, ut ideo non trajici sanguinem credat, quod porro pulmo quiescat, neque ultra ab aere extendatur.

§.XV. *Dubia quæ non sinunt has hypotheses amplecti.*

Sunt tamen certe, quæ ad sensum meum hactenus morantur. Nam primo compressio vasorum rubrorum, etiam a qua per quintam partem sui arctentur, non videtur tantum facere incommodi, & adeo subitum. Nam eadem certe fiet compressio ab aere, quem machinis addensavimus, & quem pulmone recepimus. Verum ejusmodi aerem & homo & animalia facile ferunt, & per priora, aer duplo gravior, multo facilius & absque anxietate ab animalibus fertur, quam aer duplo levior p. Pone nunc duplum aeris in pulmonem receptum ab eodem sanguinis calore rarefieri, nempe 96 graduum. Aer densus perinde ad quintam partem rarefiscens, erit tamen duplo semper densior, quam ad quintam partem rarefactus aer communis. Illa certe inde vasorum pulmonis compressio dupla erit ejus, quam homo in aere duplo rariori, pateretur. Sed is eventus hypothesei repugnat.

o Pitcarne l. c. n. 18, Bellinus Lemm, 23. Neucranz.
p Sect. III, n. 29.

Ultra meditatatus reperio , totam illam compressionem vasorum sanguinem vehementium , a qua phænomeni solutio speratur , pendere a differentia , qua calor aeris pulmonalis calorem atmosphærici aeris superat. Nullam ergo debere rarefactionem timeri ab eo in pulmonem recepto aere , qui pari cum atmosphæra calore , & gradibus 100 *q* & paulo ultra calidus fuerit, neque ultra vel diutissime retentus incallescere potest, supra primum calorem , cum quo in pulmonem venit , aut supra primum etiam volumen rarefcere , quod modo receptus in pulmone occupavit. Sed perinde verum est , nullam ab aere montano , una tertia parte vulgari aere leviori *r* , nos molestiam pati , cum tamen aer densior vallium etiam ad calorem aquæ ebullientis in pulmone calefactus , demum in id spatium se diffundat rarefactus , quod ab aere montano occupatur *s*. Quare per hanc , quam pensitamus hypothesein , videtur , omne respirationis incommodum ab aere densiori & frigidiori in pulmonem recepto impendere , nullum ab aere raro & calido. Sed uterque eventus experientiæ facillimæ repugnat.

Iterum si aer in amplius spatium raritate sua diffusus illud in sanguinis circulo obstaculum producit , facile haberemus remedium , pectus nempe facere quam latissimum , aerem sorbere quam paucissimum , neque ad plenam inspira-

q L. V. p. 62. seqq.
r L. VIII. Sect. III. p. 193.
 ed. 1761.

s Elater aeris , & rarefactio ,
 est in ratione densitatis *Mus-*
schenbroeck n. 1374.

tionem , sed decem omnino , aut quindecim pollicum *t* , qui idem aer omni sua a calore induta raritate unice vasa aerea repletet , neque ea superesset densitate , ut in sanguinea vasa comprimenda quidquam posset.

§. XVI. *Proponitur alia , nempe aeris pulmone recepti corruptio.*

Aliam ergo causam quærere oportet , quæ faciat , ut cum aere inspirato retento , non supra paucissima minuta horæ vivere possimus. Videtur autem ipsa nos natura ducere ad analogiam aeris non renovati , in quo nullum animal perdurare potest. Verissime enim non renovatus aer est , qui in pulmone ipso retinetur. Sed aer non renovatus amittit eas dotes , per quas ad respirationem aptus est. Cl. *Stephanus Hales* v 522 pollices aeris intra duo minuta prima respirando inutiles reddidit : nos autem mediocri inspiratione tantum 40 x pollices novi aeris adsumimus. Ea penus pro tredecim respirationibus atque adeo pro minuto fere primo sufficit , & eodem tempore elapso utique cum aere pulmone retento , nec renovato , summa anxietas incipit. Neque diutius crediderim cum eodem aere sanguinem circumire posse , qui sursum & deorsum agitetur ,

t Senac Essais de physique nullus noxius vapor se admisceret.
p. 377. ed. 1735.
v Hæmaph. p. 323. 323. cum x p. 32.

etsi credidit Ill. *Jacobus Benignus Winslow y* & Cl. *Engelmann z*. De frigidis animalibus crediderim, aerem non perinde corrumpentibus, ut de rana, chamæleonte *a*, testudine, quibus pulmo diutissime inflatus manet. His enim exiguus sanguis est, qui per pulmonem trajicitur, sed ad calida animalia idem non potest transferri ratiocinium. Nam in eo tempore ostendemus, hominem submersum suffocari: sed ea mors ponit stagnasse sanguinem, & funestam inde secutam esse mutationem.

Nunc naturalis est quædam vis contractilis pulmonis ad aerem instantem contemperatio. Inflatus, sponte, quoties aeri effugium patet, subsidet omnino, tantum nempe est virium contractilium in pulmone, ut sponte, etiam post mortem, se ex summa distentione in statum expirationis restituat. Hinc idem pulmo, educto in spatium aereum, quo replebatur, aere, deinde eo qui pulmone continebatur, compressus *b* adparet, & denique in aqua subsidet *c*. Quæ ea vis sit, continuo exponetur. Sufficit nunc vere adesse.

Quare si vires pulmonem dilatantes sustuleris, quocunque tollas modo, agent vires pulmonem

y *Mem. de 1738. p. 69.*

z *Verhand. van de Holl. Maatschap T. IV. p. 394. de submersis.*

a *Parisini in casuarii anatome. De testudine Parisini in Mem. avant 1690. de la tortue p. 197. Bagliv. p. 462. Roësel Fröschke p. 25. Morgagni Advers. V. p. 42. 43. Taurvy Anat. rai-*

Sonn. p. 93.

b *Wolf Versuche T. III. p. 103. Senguerd Exp. I. Guide obs. anat. Sect. 2. Cotte meteorol. p. 331. sic in animale per electrum occiso.*

c *Senguerd l. c. Menghinus Comin. Bonon. T. II. p. 339. Guide, Birch T. III. p. 255. &c.*

contrahentes, & vesiculæ aeræ comprimentur, & vasa sanguinea breviora reddentur, & in plicas se colligent, & sibi incumbent, & fiet is status pulmonis, qui ante inspirationem fuit. Id vero putatur fieri, si aer elaterem suum amiserit, quo in pulmone retinetur.

Sed eo in statu sanguis per pulmones circumire nequit, per experimenta: Facileque suadet ipsa ratio, si pulmo æque densus fuerit, ac viscera reliqua, tunc ejusmodi tantum sanguinis copiam transmissurum, qualem ea viscera transmittunt. Sed pulmonalis arteria, & paulo, quam aorta, minor est *d*, & omnem sanguinem habet, quem paulo post aorta accipit; tantum ergo, quantum omnes universi corporis arteriæ conjunctæ transmittunt. Tantam per pulmonem vim sanguinis absque peculiari illa libertate transmitti non posse, quæ pulmoni propria sit, æquum est creditu. Eam facilitatem circumituro sanguini vidimus a dilatato per aerem pulmonis *e* habitu nasci. Eum aerem nunc sustulimus, siquidem ejus elaterem destructum esse ostendimus, quo solo pulmonem dilatat. Novum aerem admittere non possumus, siquidem pulmo plenus est. Fiet ergo, quod vere ostensum est, a continuata inspiratione fieri, nempe sanguis per pulmonem non poterit transire, congeretur in vasa pulmonalia, auriculam dextram cordis, venas proximas, orietur illa anxietas, cujus causa quærebatur.

Quare porro, cum instinctus naturæ non fallat, non conamur ab ea anxietate nova nos vindicare inspiratione, qua porro pectus conaremur dilatare; sed expiratione sola, certissimo remedio, aerem inutilem rejicimus, quam novi & boni aeris inspiratio sequitur.

Nunc quidem ostensum est, merito hætenus dubitari, num id quod aer in respirando amittit, id ipsum propter quod ad respirandum utilis erat, & nunc desinat utilis esse, num id elater sit. Putredinem suspicantur alii. Demus vaporem subputridum de pulmone halare, aerem inficere: is tamen certo adeo tenuis est, adeo debiliter putridus, ut in homine sano nullum putredinis signum edat. Et tamen is aer retentus continuo suffocat, cum aer latrinarum evidenter putridus, aut aer de cadavere multis horis respirationi sufficiat, & morbum faciat, non vero strangulet. Demus iterum vapores vitriolicos, sulfureos, bronchia constringere, pulmonem reddere immeabilem, nemo tamen in aere pulmone retento, aut in anima, ejusmodi acrimoniam ostenderit. Quare ne supra ea progrediamur, quæ certa fide nobis comperta sunt, in eo effato subsistimus, aerem, utcumque id fiat, certo per respirationem amittere eam aptitudinem, qua pulmonem dilatare, atque sanguini iter aperire debet. Num vero aer vitiatus pulmonem quasi convellat, num unice cesset distendere, nondum definio *e**, eo minus quod nuperi Cl. viri mortem ab aere putrescente illatam nequidem defectui respirationis tribuant.

*e** *Carminati* p. 109. Siquidem in eodem aere neque hirudo pereat, neque multi alii vermes.

§. XVII. *Causa necessitatis , qua exspiratio post inspirationem sequitur.*

Nobilis sequitur quæstio , quare post inspirationem tanta necessitas expirationis succedat : & quibus causis agentibus novus iste pulmonis status nascatur.

Mechanice rem interpretari plerique Cl. viri adnisi sunt. Agentibus musculis intercostalibus internis, trahi externos, & molestiam percipere, hinc illa tensione remittente externorum sequi contractionem , valde simpliciter olim *Hambergerus* *f* docuit, ex qua cetera theoria nullus non artus perpetuo a muscutorum suorum alterna contractione & extensione , ab alternis pariter reagentium *antagonistarum* muscutorum vicibus nata , agigaretur. Flexores enim ubique , & in artubus evidentissime , extensores sui artus extendunt , & vicissim extenduntur ab extensoribus.

Christianus Stroemius *g* , passim ingeniosus hypothesium physiologicarum structor , ad venam sine pare confugit. Eam venam aiebat , in summo gradu inspirationis elidi , stagnare adeo sanguinem in muscutorum intercostalium vasis, eosque adeo inspirationis præcipuos auctores resolveri : Tunc , sua ex indole , cartilagine costarum dimissas resilire , eamque porro præcipuam venam liberari *h* , & novam sequi inspirationem. Et azyga quidem vena utique turget , dum inspi-

f l. c. p. 35. 36. n. 43. 44. etiam *Fizes* *conspect. phys.*
g *Nov. theor.* p. 58. Habet p. 123. 124.
h *Stroem* p. 59.

ramus *i*, a compressis autem aut turgentibus venis lentissime demum musculorum vires franguntur, si omnino franguntur: & ostendimus demum, sanguinem venarum intercostalium alia, præter venam sine pari, effugia habere *k*.

Non dispar hypothesis est, quam *Idem* vir *l* liberaliter obtulit, deinde *Georgius Martine m* amplexus est, neque displicere sibi ostendit *Ill. amicus noster Christianus Gottlieb Ludwig n*, ut etiam industrius viri discipulus *o* eam sibi sumserit defendendam, & nuper *Cl. Jadelot o**. Nervum nempe phrenicum, principem inspirationis auctorem, in plenissimo thorace, ipsam per inspirationem comprimi, sic ab ipsa vi recepti aeris diaphragma resolvi: Succedere vices expirationis, nervum, expulso nunc aere, pressione liberari. Verum phrenico nervo compresso solum diaphragma resolveretur, non perinde intercostales muscoli: neque nervus a mollissimo viscere ea vi premi potest, quæ ad vires musculo subtrahendas sufficiat, lenis enim nervi pressio diaphragma non reddit inutile; neque ejusmodi nervi compressio, quæ stuporem faciat, absque ingratissimo sensu fit, uti ex afflicti cubiti formicante illo dolore discimus. Demum omnino eum nervum non comprimi certum est, qui in pleuræ canaliculo sibi exsculpto tectus descendat, neque convexus pressioni se offerat.

i L. VIII. Sect. I. p. 299.
ed. 1761.

k p. 110. III. ed. 1761.

l p. 66.

m *Essays of a Societ. at Edimb.*
Vol. I. p. 164.

n In thesibus Lipsiæ editis &
in physiol. n. 436.

o *Clausen de nervo phrenico*
p. 97.

*o** *Phys. corp. sani.*

S. IV. CUR INSPIRATIONEM SEQUATUR EXSP. 61

Alternam pressionem aeris thoracici Cl. *Henshaw* q proponit, quem dilatatus pulmo compri-meret, donec idem ad majorem densitatem re-dactus, vicissim restitutus pulmonem urgeret. Ad eam theoriam responsum est, cum ostende-retur, ejusmodi aerem nullum esse.

Inde Ill. *Boerhaavius* r usus est circuli san-guinei impedimento, quod per inspirationem nascitur; colligi nempe in venas sanguinem, ad sinistrum corde ventriculum legitima copia non ad-venire, aortam nihil accipere, cerebellum sanguine privatum debilitari, spiritus intercostalibus mus-culis & diaphragmaticis, non submittere, utrasque adeo vires resolvi: ita superari ab anta-gonismo perpetuo virium expiratoriarum, quas oportebit enarrare.

Dudum, & ante me s, varia in hanc hypo-thesin dicta sunt. Non quidem urgebo, exspi-rationem succedere inspirationi, licet nullus debilitati cerebri sensus, nulla tot aliorum mus-culorum resolutio percipiatur: contra in nixu aerem retineri, viresque in continuata ejus mora quæri: neque pulsum t in sani hominis inspira-tione minui, aut languere; cui tamen suo tempore vires expirationis succedunt. Id unice volo, *Præcep-torem* rationem non reddere, si sanguis restagnat & cerebellum cessat, quare expirationis muscoli

q *Aerochalinos* p. 76. seqq. & de Gorter de mot. vital. n. 30.
fere *Hoadley* p. 56. Addit iste *Senac* p. 380. 387. de *Bremond*
atmosphæræ pondus. l. c. p. 336. Ill. *Gunzius* de
r n. 619. *Littre* *Memoir. de respirat.* p. 10. 11. *Crell* l. c. de
l'Académie 1713. p. 7. &c. *respir. vital. caus.* n. 17.
s *Martine* l. c. p. 161. *Job.* t *Malder* de *respir.*

possint in motum cieri : Si soluta est illa circuitus sanguinei mora , quare non possint inspiratorii muscoli in agendo persistere. Sed inprimis certum est , pulmone quieto , in strangulato animale *v* , cujus nulla est inspiratio , & diaphragmatis vires , & intercostales musculos multo diutius vigere , suisque officiis magno cum conatu longiori tempore defungi , quam est legitimum duorum stadiorum respirationis intervallum.

§. XVIII. *Causa quæ nobis verior videtur.*

Sectæ me inservire nemo objecerit , si ad voluntatem & animæ imperium hic recurrero , qui placitis *Stahl*i nunquam fidem dederim : irascentur potius , qui me a *Boerhaavii* sententia , aque mechanica secta deficere queruntur , ut plane apostatæ nomen mihi impingant. Verum non alia mihi secta est nisi adgnita veritas , aut id quod mihi quidem verum videtur. Nunc tota respiratio & in homine , & in brutis voluntate *x* regitur. Rana , ut sæpe vidi , tum ut alii *Cl. viri* , chamæleon *z* , testudo , pulmonem pro

v Exp. 24. tum 23. 97. de *Bremond* l. c. p. 339. 342. *Che-selden anat.* p. 105.

x Agnovit respirationem voluntariam tota antiquitas , ut *Galenus mot. musc.* II. 5. ubi manifesto separat a corde & ab intestinis , quæ a natura reguntur non ab anima *de util. resp.* qui idem recte addit, pulsus in febre nos ex arbitrio, neque au-

gere posse , neque minuere , inspirationem vero in pectoris inflammatione ex arbitrio intermitteri. Deinde *A. Laurentius* p. 502. seqq. *Isbr. v. Diemerbroeck* p. 318. *Archangelus Piccolomini prælect. anat.* p. 242. *Fabricius* L. II. p. 25. 26. alii que.

z Valisneri &c.

lubitu extendunt , aereque replent , aerem retinent, in distento pulmone, aut subito deplent vicissim, ut penitus flaccidus collabatur. Eadem animalia incertissima faciunt respirationis intervalla, ut modo longissimum inter inspirationem & expirationem tempus intercedat, modo pene nullum. Cuniculi *b*, aliaque meticulosa animalia, modo præ metu respirationem suspendunt, ut dolore aut anxietate respirationem suscitare necesse sit: modo vicissim intendunt, ut maximas inspirationes moliantur: modo mutant, ut has quidem imperfectas abrumpant *c*, expirationes vero subitas cogant sequi: eadem animalia intervalla respirationum pro arbitrio regunt, & protrahunt, aut vicissim decurtant.

Eadem nobis potestas est. Possumus inspirationem aerisque in pulmone moram protrahere, ob nixum, aut ex quietis inter studia amore, aut experimenti faciendi causa *d*. Possumus solis costis uti *e*, aut solo diaphragmate *f*. Possumus maximam respirationem moliri, plurimumque aerem recipere, ut pectus pro cantu quasi penu aeris replëamus. Possumus grandem inspirationem facere, quando ex labore anhelamus, possumus pene nullam, quando pleuritici dolores inspirationem exosam reddunt. Possumus inspirationem maximam ad clamorem comparare; possumus parvam, quam alia inspiratio sequatur,

b *Memoire sur la respiration* suum tempus suspendebat *J. Floyer* l. c. T. II. Exp. 7. 8. &c.

c p. 258. 259, ed. 1761. Exp. *e* *Schwartz* n. 8.

10. 32. *f* p. 12. & 232.

d Ad quindecim usque pul-

ut omnino vehementi inspirationi pene nulla succedat exspiratio. Possumus diu absque respiratione superesse. Ipsa necessitas novi aeris per consuetudinem diminuitur. Urinatores enim ipsam per exercitationem artis discunt, diu sub aqua morari, aerisque vicissim levioris incommoda sensim *h*, per eandem adfuetudinem, mitescunt. Denique suppressa respiratione ostensum est, omnino hominem, nullo instrumento adjutum, invisam sibi vitam posse abjicere *i*. Vicissim primam respirationem per voluntarios motus animalia moliri, pullos rostro aperto aerem captare, catulos in aere se contorquere, hiare, quasi oscitare, demum respirare sæpe vidi. Adeo initium, & finis, & incrementum, & diminutio, & intervalla respirationis voluntate reguntur.

Si voluntaria respiratio est, regitur, ut ea omnia quæ voluntati obsequuntur, voluptate & dolore. Doloris & quidem omnium minime tolerabilis, genus anxietas est. Anxietatem homo percipit, cui sufflaminatur exspiratio, & aer in pulmone retinetur. Ea anxietate vindicat se exspirando, exspirat adeo, eodem modo, uti sternutat, fæces deponit, & urinam egerit, ut intolerabili incommodo se liberet.

Novi, quid contra hanc *Stahlianæ* *h* sectæ propiorem problematis solutionem passim, etiam
ab

h Fryer travels p. 192. Conf. Martini.

P. 47.

k Instinctui quod fere idem *i* Passim de servis nigris est, Ridleyus tribuit of the que citavimus. Add. Thibault brain p. 165. 166.

Se& IV. RESPIRATIO VOLUNTATIS OPUS. 65

ab acutissimi ingenii viris *l* sit objectum. Inscios nos respirare, in somno, in apoplexia, & ad omnia alia magis adtentos *m*: molestiam illam diuturnæ inspirationis tantam esse, ut in veram causam exspirandi possit abire; non eam tamen ideo perpetuam exspirandi causam esse, neque ab homine sano expectari id incommodum, sed occupari, brevioraque per intervalla respirationis vices alternas sibi succedere, ocyus omnino, quam vel post inspirationem, vel post expirationem, aliquis anxietatis sensus nascatur.

Quare & veteres, & nuperi *n*, difficultatem mollire tentarunt, & aliam respirationem necessariam, & vitalem fecerunt, cujus causæ per apoplexiæ tempora pergant operari, aliam voluntariam, quæ a mentis imperio cieatur.

Verum non videtur simplicitati naturæ, aut perpetuitati eorum, quos fixit, inter motus humanos limitum, convenire, eundem muscolum, & a voluntate regi, ad usus prævisos, & eundem absque voluntate, & sensu animæ, etiam sponte cieri. Iterum simplices motus esse, quos necessitas edat, & ad meram contractionem alicujus organi pertinere, alibi ostendemus, quicunque a necessaria stimuli potestate pendent, cordis exemplo, & intestinorum, & vasorum. Respiratio composita est diversorum organorum

l Senac l. c. p. 383. 384. *merdam thes.* 8. 9. Borellus l. 8. c. 7. p. 161. 162. Bohm p. 89.
Contra eâ Ypey in p. 16. *Verheyen* L. II. tract. 2. c. 8.
m Fabricius L. II. p. 24. *Cl. Bertier* p. 181. 145. 146. *Ypey*.
n Willis p. 29. 30. *Swam-*
Tom. VII. E

functio , quæ consilio aliquo in eandem actionem oportet consentire , septi nempe transversî , musculorum intercostalium , colli , capitis , pectoris , dorsi. Ipsa experimenta me docuerunt , stimulo ejusmodi , etiam acerrimo , compositas actiones produci non facile posse , tussis exemplo , quam vix ulla arte ab animalibus extorquere potui. In sternutatione posse non ignoro. Sed nullus ejus violentiæ stimulus ab homine recte valente percipitur.

Sentio , quam difficile sit , sensationem anxietatis in perfecto somno *o* , & in perfecta apoplexia tueri. Verum si gradus somni *p* percurreris , non erit penitus ita insuperabile. Delirium somnus est , non quies animæ *p*^{*}. In somno perturbato noctambulorum omnia fere organa voluntatis operantur : in somno aliquanto minus vitioso alii homines noctu tamen loquuntur ; pauci sunt , qui subinde corpus non convertant.

Animi efficaces adfectus vel ex sono respirationis dormientium percipias , quem metus , tristitia , incommodi sensus , gaudii que suo caractere distinguit. Sunt in somno ad suum , & quidem peculiarem cuique homini modum ,

o Galenus fassus est , nescire se eum solvere nodum , conf. similis fere sensus locum *Fabricii* p. 26. Solebat tamen *Galenus* ad necessitatem provocare , quæ faciat , ne unquam respiratio cesset in aphor. II. n. 42.

p Hæc omnia demum in L. XVII de sensibus internis poterunt demonstrari , quæ interim recipio vera esse , ab omnibus admitti persuasus.

p^{*} Conf. Cl. *Porterfields on the Eyes*. T. II. p. 156.

Seçt. IV. RESPIRATIO VOLUNTATIS OPUS. 67

conflexi artus , quos utique voluntarii muscoli eo in situ retinent. Video clausos sphincteres, clausas palpebras, & utraque ex consuetudine voluntaria clausa , per metum primo , deinde, deleto metus sensu , tamen per eosdem musculos, quos solum arbitrium regit. Multa ergo volentis, suisque pro arbitrio musculis animæ etiam in somno vestigia sunt. Apoplexia gravis & morbosus somnus est. Recte hic *Whyttius q* , eo in cerebri adfecti statu , ad stimulum leviozem surdi , intervallum inter duas respirationes longius esse , & 7 ad 10 secunda minuta , adque 40 pulsus produci , quod anima impedito cerebro , malum suum non prius sentiat , quam summum factum est. Sed incommodum sani prævertimus , quod productæ inspirationi succedit , postquam experiendo didicimus , inevitabile malum nos oppressurum , quam primum hoc naturæ debitum negligimus persolvere. Sæpe mihi meditati anxietas ex improvise supervenit , quando stimulum nascentem neglexeram. Mediocris enim dissimulari potest. Verum tunc gravior vis necessitatis in me incubuit , auctusque stimulus prementis mali , cui nemo resistit nisi moriturus *r*. Ita denique in legem abeunt alternæ vices expirationis , & in alio exemplo in legem abit sæpe repetitum experimentum incommodi , ut palpebrarum nictitatio ad lucem paulo fortiozem , sponte quasi sua , & in non meditato sequatur, quæ tamen meræ voluntatis sit , & inhiberi possit.

q On vital motions p. 192. r Ibid. p. 200. 201.

Quare, donec meliora istis didicero, hic cum *Fantono s*, *Stahlio*, *Francisco de Sauvages t*, *Roberto Whytt v*, aliisque & nuperis medicis omnino necessitatem vicium respirationis ad anxietatem ex sanguinis mora natam, ipsas vices ad animæ, ad averterendam molestiam suis viribus utentis, imperium retulero.

§. XIX. *Quamdiu absque expiratione vivi possit.*

Liceat hic objectionem occupare, quæ contra theoriam nostram a longo tempore sumi posset, quo homines sub aqua merfi vivunt. Inspiravit enim animal, quod aqua mergitur, atque pulmonem habet aere distentum *y*, apertamque glottidem; idemque incisum, phænomena in pulmonis organis ostendit, quæ inspirationem protractam sequuntur *z*. Ab eo porro tempore spes pendet excitandorum, qui de aquis extrahuntur mortalium.

Multum continuo interest, num subito quis mergatur aquis, sanus & vegetus: num contra languidum animal, & ægre spiritum trahens, corde debiliter faliente, semivitale, lente se sub aquas recondat. Exemplum, est hiru-

s *Anat.* p. 338.

t *Respir. difficult.* p. 10. n. 13.

Daousteno &c.

v l. c. p. 192. 178. 179.

x *Bergier Ergo respiratio est motus sympathico-mechanicus*
Parisi. 1743. E. A. Nicolai von

der Einbildungskraft p. 210. &

n. 13.

y *Wespremi obsl. I. Evers*
p. 5. Louis p. 230. alii.

z *Detharding* l. c. depresso
 diaphragmate, visceribus ab-
 dominis deorsum actis, pulmo-
 ne sanguinis plenissimo.

dinum *a*, quæ in stagna septentrionis se ipsas ingruente hieme demergunt, appensæ arundinibus *b*; & sensim in aquas inclinatæ *c*, aut demum, ut nuperi malunt, frigore occupatæ somnoque fuere, cum arundinibus a vento merguntur. Eæ enim aves, cum aliqua mortis imagine, vitales utique supersunt, & igne admoto facile suscitantur, blandisve redeuntis veris vicibus *d* quotannis reviviscunt. Aliquid in iis hominibus simile est, qui a mortuis parum diverfi *e*, absque pulsu & spiritu, dies integros *f*, & si fides est historiæ, dierum septimanas supervivunt *g*.

Subito si demerferis animalia, hominesque ipsos, certe plerumque intra pauca minuta, & idem fere tempus pereunt, quo alioquin extinguuntur, quibus respiratio alio ex casu

-
- a* Connor hist. of Poland II. p. 85. Phil. Trans. n. 319. Bruhier T. II. p. 126. 139. Regnard voyages p. 124. Licetus apud Fabrum in Hernandez p. 708. 709. Pontoppidan hist. natur. Norveg. II. p. 187. Linn. Econ. natur. p. 39. Berger nat. ham. p. 279. Breslauer Sammlung 1719. April. Henshaw apud Birch T. IV. p. 534. Ekmark migrat. avium p. 35. Boyle of frost p. 232. Nebring in Franci palingenestom p. 75. & imprimis Klein Danzig vers. T. I. p. 480. seq. cum authenticis testimoniis. Absque calore & motu reperit hirundines ipse Harveius apud Birch T. IV. p. 537. Sub glacie ipsa vivæ reperiuntur Derham physico-theol. L. VI. c. 3. p. 341. Phys. æcon. Patriot. T. I. n. 49. Blankaard chirurg. p. 336. ranaque Boyle on frost p. 232. & palamandra Memoir. de l'Académie 1719. p. 145. sub glacie edurant.
- b* Ekmark l. c.
- c* Nebring l. c. Sed perire Derham & Colas ib. Pechlin aeris & alim. defect. c. 3.
- d* Ekmark l. c.
- e* Absque respiratione valde parva vita superesse potest Whytt l. c. p. 227.
- f* Triduo Diamerbroeck p. 319. Sed vide historias a Cl. Bruhier collectas.
- g* Quadraginta diebus apud Heraclidis.

inhibetur. Pene subito nempe suffocantur, quibus in asperam arteriam, aut in laryngem, infeliciter illapsum corpus aliquanto crassius spiritus iter intercipit. Vidi ab avellana *b* in larynge sedente id infortunium accidisse; vidi ab illapso verme terete *i*; alii a deglutito, sed in alienam aeris viam illapso carnis frusto *k*; a pilula *l*; ab ovis induratis *m*; a phaseolo *n*, a linteamine, a casei frusto, ab uvæ acino, a piso *o*, a gramine *p*, ab ore compresso *p*^{*}, demum a bolo in gulam quidem suscepto, ut tamen ob nimiam molem bronchum videatur elisisse *p*^{**}. Subito etiam intereunt animalia, quibus periti luctatores prehensum laryngem comprimunt *q*, subito infantes & in Martinico inf. æthiopes, quibus fugentibus lingua retracta in laryngem descendit *κ*. Subito etiam extinguuntur, quibus pus, de abscessu ruptum, asperam arteriam replet, qui funestus eventus in desideratissimo trium regnorum herede, ex rupta antiqua vomica non demum lacrimas iis expressit, quibus virtutes optimi Principis cominus inno-

b Opusc. patholog. obs. 7.

i Obs. 9.

k Bartholinus Cent. I. hist. II. cist. med. p. 524. Heuermann oper. T. II. p. 368.

l Alex. Bened. L. VII. præf.

m G. D. P. Della morte apparente degli animali.

n Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 153.

o Alberti med. leg. T. IV. c. 9. append.

p Frequens esse pecudibus

Hooke exp. p. 28. 29.

p^{*} Celerrime interiit Hasenest T. IV. p. 149.

p^{**} Schelhammer physiol. p. CXVII.

q Oribasius L. XXIV. p. 56. Qui asperam arteriam tigridi compressit, vitam suam servavit Sarr Oslind. Reisehesehr. p. 79.

Klein quadruped. p. 80. & qui cani Thoresby antiq. of Leeds p. 615.

r v. Bergen de morb. infant. n. 30.

tuerant s. Subito demum ipsæ illæ hirundines ad ferendam hyemem natæ, & irrevocabili morte pereunt, si sanæ validæque sub aquas mersæ tenentur.

Æque subita mors ingruit, quando sanguis in pulmones effusus systema aereum opplet t, aut pulmones quasi exsiccati sanguinem non transmittunt v.

Subito denique moriuntur, quibus aut corpus peregriana in pectus illapsum x, aut aer atmosphæricus aliquo tempore pulmonem compressit y.

Ita certe etiam submersa sub aquas animalia in melioribus experimentis subito suffocantur, & intereunt. *Musschenbroeckius* aves, etiam anates z, intra primum minutum & post $\frac{3}{2}$ minuti periisse vidit a. Ne hirundines quidem aliquot minutis sub aqua supervivunt b. *Robertus Boyle* Chloridem intra 30 secunda minuta sub aqua exspirasse vidit c, tum passerem, & murem, anatem post 4 vel 6 minuta d, talpam post $\frac{5}{4}$ fringillam etiam minori tempore e. Cl. noster *Evers* inter quatuordecim varii generis animalia, alia tribus, alia octo, alia quindecim minutis extincta vidit f, neque post 15 minuta puer

s Habet etiam exemplum Cl. Pfann p. 153.

t *Dionis cours d'anat.* p. 448. 449. 450. *mort subite* p. 70. 74. *Smet miscell.* L. X. p. 581.

v *Bartholin hist.* 45. Cent. I. Inde cor dextrum & auricula amplissima.

x A glande plumbea *Manchart de lethalit. vuln.*

y p. 4. seqq.

z *Essais* p. 42.

a *Ad Cimentinos* p. 115.

b *Roefel Heuschrecken* p. 158.

c *Phil. Transf.* n. 62. tit. 10.

d *Ibid.*

e *In Linum.*

f *Exp.* p. 3. & iterum p. 14. 15. 10.

potuit ad vitam revocari *g*. Sed etiam ego felem *h*, & aviculam *i*, post duo minuta vidi absque omni spe periisse, gallinam post tria *k*, canem post 7 minuta *l*, alios canes post 25 *m*.

In porcello submerso post 20 minuta vita nullo inflato aere revocari potuit *n*, neque in homine, qui subito ob ova in asperam arteriam illapsa perierat *o*.

Urinatores ipsi, siquidem de homine sermo est, omnium peritissimi sub aqua non ultra 2 minuta horæ supersunt *p*, secundum optimos auctores.

Si aliæ historiæ exstant hominum, qui suscitati fuerunt, cum sub aqua fuissent 15 *q* minutis, & 20 *r*, & 22 *s*, & 25 *t*, & 30 *v*, & hora *x*, & novem etiam horis *y*, & 16 *z*, & 42 *a*, & 48 *b* & aliis temporibus etiam longioribus *c*, ut de urinatoribus legimus, qui 15 *d*, & 30 minutis *e*, & 60 *f*, & quatuor *g* horis, &

g p. 5, n. 7,

h Exp. 137.

i Obs. 141,

k Exp. 140.

l Exp. 139.

m Exp. 135. 136.

n Fleming proposal. p. XXIX.

o G. D. P. della morte apparcute.

p Phil. Trans. n. 349. Boyle digress. de usu respir. nisi aeris penum secum sub aquas sumferit. Septem astracani ap. S. G. Gmelin It. II. p. 205.

q Ziegler de submers. Phil. Trans. n. 454. Eph. Nat. Cur. vol. 7. obs. 124.

r Raulin obs. de Medec. p. 275.

s Wesspremi obs.

t Charis & Kesselring de morte submers. Sed ea femina in sacco vixerat.

v Journal de Med. 1757. Oct.

x Freye Urtheile 1750. n. 83.

y Bruhier p. 196.

z Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 20. Act. Hafn. vol. IV. p. 175. 176.

a Birch T. III. p. 6.

b Alex. Benedict. L. X. c. 9.

c Albinus Handgrif. Gentlem. Magaz. 1749. Aug.

d Phil. Trans. n. 43.

e Jos. a Costa hist. natur. Ind. L. IV. c. 15. Vesalius apud Levinum Lemm. miracul. natur. L. VI. p. 173. Engelmann Holland Verband. T. IV. p. 387.

f Brasilienses apud Pisonem de re natural. Ind. L. I. c. 13.

g Celebris ille Colapesce apud Cardanum de subtilit. p. 327.

integrum diem *b* & triduum *b** sub aquis edur-
runt, eæ historiæ partim ab ignaris hominibus,
neque ad observandam minutius rerum naturam
curam aliquam adhibentibus, profectæ sparguntur,
partim ad aliam causam pertinent. Nempe homo
aliqua, non magna, portione aqua levior est.
Juvenis mediocriter obesus in aere 138 l. in aqua
8 uncias pendebat *i*. Accuratus nuper ostensum est,
sæpe æquum esse aquæ pondus, alias *i** paulo majus.
Celebre nomen est abbatis *Moccia*, viri ingeniosi,
obesi, qui nulla sub aqua mergitur. Hystericas femi-
nas, dum paroxysmus viget, non mergi vulgo
notum est, & multa exempla ejusmodi in *Causæ*
celebres collecta sunt. Carpio in aere 2 libras scru-
pulum unum pependit, in aqua unciam semis,
grana 10 *k*. Aves adhuc leviores sunt, ob aerem
abdominalem, ut ægre a pondere detractæ mersæ
maneant *l*. Inde fit, ut homines perquam diffi-
culty mergantur *m*, & identidem super aquam
emineant, etiam mortui, atque adeo, dum vivunt,
aliqua aeris penu refocillari possint. Ita etiam
negligentius submersum animal, facile vitam
recuperat *n*, quia erecto capite ex ipsa aqua
aerem adducit. Ita olim ex conjectura scripsi *o*,
nunc manifestiora exempla reperio *o**.

b Leon a Capoa della mofette enatat Browne *Erreurs populaires*
p. 47. 48. Radziwil itin. Palæst. L. IV. p. 463.
p. 146. *n* Evers p. 10.

*b** Birch T. III. p. 6. 7.

i Apud Rouhault.

*i** Ph. Transf. Vol. L. P. I. p. 32.

k Birch T. I. p. 69.

l De hirundinibus Roessel l. c.

m Fischer de senio p. 60. 61.

Homo etiam exenta vesica, &
intestinis, semper super aquas

o Opuscul. patholog. p. 161.

*o** Ter enataverat puer, qui
de aquis extractus refocillari
potuit Brem. Magaz. T. II.
p. 568. Puer sub aqua plusquam
semihora duravit, natabat enim
supinus Phil. Transf. T. 49. P. I.
etsi minime se exercuerat.

Ne ipsa quidem amphibia animalia , & cete ad vitam sub aquis a *Creatore* destinata ; absque aere diu vivere possunt , quibus tamen belluis propria venarum amplitudo ad colligendum sanguinem facta est , dum sub aqua degunt , ut de balæna *Fridericus Martens p* , de delphino *Aristoteles q* , de manati *Gumilla r* , de hippopotamo alii *s* , de lutra , animale ad piscaturam facto *Lemery t* , de phoca *Schelhammer v* , de castore scriptores itinerum testes sunt.

Neque hic foramen ovale quidquam prodest , si utique in phoca patet *x* , aut in marino urso *y* , inque lutra *z*. Et extra aquas educatus castor , aut phoca , omnino fundum aquæ petere dediscunt *a* , atque lutra perinde sub aquis suffocatur , ut alia animalia *b*. Sed neque in homine strangulato mortem moratur.

Quare adparet , animalia hominis similia exiguo tempore absque respiratione edurare posse , quin suffocentur.

p *Reise nach Spizbergen & Phil. Trans. n. 387.*

q *Histor. anim. L. VIII. c. 2.*

r *Histoire naturelle de l'Ore- noque T. II. p. 9.*

s Non supra dimidiam horam sub aqua durare *Labat Afriq. occid. T. V. p. 270.*

t *Arnauld hist. des anim. T. V. P. 2. p. 182.*

v In ejus animalis anatome. Ea necessitate ad eos pisces capiendos piscatores abutuntur. Addit *Leigh natur. hist. of Lancashire* ea animalia accurate os & nares sibi claudere prius ,

quam se in aquas dent ; venas eadem habent amplissimas , si cum arteriis comparaveris *Schelhammer ibid.*

x Ita *Rai synops. p. 190. Kullmus Buthner Suppl. I. obs. 5.*

y *Steller Nov. Comm. Acad. Petr. T. II. p. 743.*

z *Memoir. des Savans étrangers T. II. p. 204.* Negant patere *Buffon T. VII. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 112.* De delphino negat *Grew Mus. p. 93.* de castore *Parisini.*

a *Klein de piscib. miss. IV. p. 7.*

b *Buffon T. VII. p. 145.*

Strangulatorum hominum exempla huc non pertinent, qui post satis longam moram refocillantur *c*. Eos enim homines creditum est ex apoplexia *d* potius, quam ex intercepto spiritu perire. Stupent certe *e*, colores vident *f* primo vividos, inde tenebras meras, & vasa cerebri sæpe sanguine plenæ sunt. Minus ergo mirum est, adeo frequenter convalescere *g*, resecto fune, vena incisa. Florentiæ adeo vulgo redibant ad vitam, ut necesse fuerit, mutare mortis genus, & vertebrae luxare *h*. Vera tamen & vulgatioe mortis causa est, quod sanguis in arteriis pulmonalibus, in dextris cordis caveis, in venoso systemate collectus restagnat.

Non æque admittunt experimenta mea, laqueum organis respirationis non nocere. Nam vidi funestum funem inter cartilaginem scutiformem, & os hyoidis, in pharyngis caveam irrupisse: vidi cricoideam cartilaginem a broncho separatam fuisse: vidi ruptam scutiformem, ut superior pars sursum distraheretur, inferior deorsum, & similia nostrorum alii Cel. viri viderunt *i*; luxatum caput *i**, ruptas vertebrae, ut caput de cute penderet: sic etiam a laqueo musculum mastoideum, musculos laryngis, laryngem ipsum fractos.

c Cæsalpin. quæst. med. p. 229.

d Roederer l. c. p. 8.

e Cæsalpinus l. c.

f Boerhaave in prælect.

g Cornar. histor. rar. p. 1. 2.

Elis. Green in propria historia suscitæ puellæ. Plot nat. hist.

of Staffordshire p. 292. J. M. Hofmann de aerotéria, iste ob asperam arteriam osseam.

h G. D. P. Lettera sopra la morte apparente p. 35.

i Ruptam cartilaginem cricoideam & a broncho divulsam, diruptosque musculos Weiss progr. V. p. 14. cartilaginem anularem in multa fragmenta diffractam Mauchart luxat. nuch.

*i** Sabatier I. p. 102.

Aliter cum iis animalibus res comparata est, quibus exigua pars *k* sanguinis per pulmones trajicitur, & quibus iisdem pulmones etiam aeri atmosphærico expositi distenti manent *l*. Ea enim diutius absque respiratione vivunt, & sub aqua aut fero enecantur, aut omnino nequeunt enecari *m*. Habet præterea testudo, ut nuperis claris viris visum est, musculosos anulos in aditu arteriæ pulmonalis, ut sanguinem ab ea arteria avertere possit, quamdiu sub aquis vivit *n*, atque in iis animalibus iter sanguinis etiam deleta pulmone superest *o*. Eadem 20 diebus ore & naribus obsignatis absque respiratione vixit *p*: & tamen, in calidis certe regionibus, omni septimo & duodecimo minuto ex aqua caput effert, aeremque haurit *q*. Insecta etiam minus aquam metuunt. Cochleæ septiduo sub aqua vivunt *q**. Muscæ varii generis, & apes, quas sub aquis suffocatas esse *r* credas, facile ad vitam redeunt, sole reddito aut alio calore.

§. XX. *Exspirationis causæ. Musculi abdominis.*

Si insuperabilis est exspirationis post inspira-

k Testudo Bagliv. p. 467. Buffiere Mem. avant 1699. Parisini in anc. memoir. Rana Swammerdam p. 823. 831. Phil. Trans. n. 94. Frigida animalia in universum Malpigh. posthum. p. 14. Salamandra, lacertus, chamaeleo, serpens, testudo Swammerdam p. 830.

l Borell propos. 95. Duverney in obs. de phys. p. 34.

m In ranis per 8 dies integros demersis expertus est Browne Erreurs populaires T. III. p. 315. *n* Jenty Course of anat. II. p. 363.

o Parisini, Duverney l. c. *p* Bagliv. p. 460.

q Dampier T. I. itin. p. 442.

*q** Swammerdam bibl. p. 115.

r Swammerdam p. 721. Nat. hist. of California T. I. p. 208.

tionem necessitas , vires exponere oportet , quibus hæc mutatio obtinetur.

Uti diaphragma lenissimæ , communissimæ & maxime naturalis inspirationis organum est , ita muscûli abdominis similis expirationis s , ut omnino eos musculos neque ad violentam unice expirationem t referre oporteat , neque ab instrumento respirationis excludere v. In omni enim , & viri potissimum , respiratione , uti abdomen per inspirationem tumet , ita paulo post in expiratione videas detumescere & contrahi. In suis ejulantibus laborantem obliquum majorem percepit *Fabricius* x , & in vivis animalibus , si integrum fuerit abdomen , vehementer rigescere , & magno robore contrahi percipies y. Hinc illa deliquia z , & subitæ sæpe mortes a , quando aquæ hydropicæ subito extrahuntur , neque cingulo circumposito abdominalium musculorum quasi vires repræsentantur. Descendit enim , quod altissimum fuerat , diaphragma , neque porro a musculis abdominis , mirifice in ejusmodi cadaveribus extenuatis , abdomen stringi potest , neque exspiratio inspirationi succedit. Eadem a partu subitæ sæpe mortis causa est b. Hinc resecti muscûli abdo-

s *Galenus de caus. respir.*
Helmontius de catarrhi deliram.
 n. 48. 49.

t *Fabricius* p. 92. 94. &c. *Bohn*
 p. 88. *Borellus* prop. 93.
 v *Spigelius* p. 102.

x p. 94.

y *Exp.* §1. §2.

z Remoto cingulo *Simson*
Essais p. 220.

a Cl. *Kaltschmid* in programme.

b *Engelmann Verhand. der*
Holland. Maatsch. T. IV. p. 454.
Slevogt insel. curat. hydrop.
saccul.

minis ac violatum diaphragma perinde nocent, & respirationem reddunt laboriosam *c*.

Quid hi muscoli in abdomine & thorace mutant, fere expositum est *d*. Comprimunt equidem abdomen, ad validissimi cinguli modum *e*, obliquus uterque & transversus musculus, & viscera *f*, quæ neque deorsum cedere queant, neque retrorsum, ea sursum contra diaphragma impellunt, eumque musculum ex planitie sua in fornicem cogunt, qui & ipse sursum *g* in pectus eminet. Eum fornicem, spatiumque costis inferioribus comprehensum, hepar nunc replet, & ventriculus, & lien, & ipsi sursum repulsi renes. Varia autem diaphragmatis in pectus repulsi altitudo est, ut varius expirandi conatus. Et inter 6 & 7 costam pectus *h* visum est perforari, neque diaphragma læsum est; & contra perforatum a vulnere, quod inter quartam & quintam costam subierat *i*. Cæterum, cum mors cum expiratione conjungatur, in cadavere diaphragma semper sursum *k* pulsus reperitur, & sub fornice præalto hepar, ventriculus, lienemque comprehendit, renumque magnam partem.

Facile enim & diaphragma, & intercostales musculos, a musculis abdominis superari, vel

c Oeder n. 17.

d Sect. II. p. 28. seqq.

e Ibid. n. 30. p. 70.

f Vesalius p. 349. & 823.

Spigelius L. IV. c. 8. Pecquet

p. 83. Sylvius diff. VII. n. 23.

Drelincourt canic. 7.

g Thruston p. 38. de Gorter

n. 27. Neucranz c. 5. Parisini in
itruthione, *Memoire sur la*
respiration exp. 40. 42.

h Bogutzki p. 18.

i H. de Heers obs. 25.

k Cheselden p. 105. Verheyen
p. 170. conf. S. VI. p. 123.

ex iis experimentis adparet , in quibus muscoli abdominis integri animalis , ad ejulationem nitentis , diaphragma secum in expiratione detraherunt *l*. Verum ejusmodi eventus rariores sunt , neque ex naturæ lege. Iis tamen auctoribus facile crediderim , qui musculos expirationis , & vel solos abdominales , diaphragmate fortiores faciunt *m*. Qui debiliores esse putant *n* , non videntur in vivis animalibus vidisse , quam velox , quam valida , exspiratio sit , quanta cum ejulatione & clamore musculorum contentio jungatur , & quam manifesto flatus vehementia inspirationem vincat. Neque nixum contra nos proponere oportet. Nam in nixu vires musculorum abdominis cum diaphragmatis viribus conjunguntur.

Porro iidem abdominis muscoli , & recti potissimum atque obliqui minores , intercostalium musculorum vires superant , costas elevatas detrahunt , earum intervalla augent , eas cogunt inferioribus marginibus introrsum ire , & deorsum , ita diametrum transversam pectoris diminuunt. Ea actio est , qua costas constringimus , ut a vestibus recedant *o*. Altera ergo diameter pectoris nunc diminuta est , quæ in transversum a dextris in sinistra ducitur. In hac actione sterni triangularem cum musculorum abdominis viribus consentire credibile est.

l Exp. 26. p. 289. *Schwartz* n. 8. *Cheselden* p. 105, *Swammerdam*

m *Willis* l. c. p. 27. 28.

p. 72.

n *Lientaud* *essais* p. 547.

o *Winslow* *Mem.* 1738. p. 67.

Denique iidem musculi sternum *p*, costis connexum, deorsum ducunt, retrorsumque, recti inprimis, atque adeo tertiam pectoris diametrum decurtant, quæ est a sterno ad vertebrae. Erat homo, qui violenta contractione musculorum abdominis, quorum tendines in alba linea tamquam funes rigeant, sternum adeo vehementer ad vertebrae repellere noverat, ut ingens ea in fede cavitas nasceretur *q*.

§. XXI. II. *Elastica natura costarum.*

Costæ in cadavere, & in homine non inspirante, & quoties sibi permissæ sunt, in statu sunt expirationis, intervalla nempe ampla habent, angulos (præter primam costam) deorsum cum sterno & vertebrae acutos, marginem inferiorem sub superiori positum, & quæ reliqua alias exposuimus. Ex eo statu per intercostales musculos emonentur, certe quoties hi musculi costas elevant, & angulos fere rectos, & rectos, & obtusos demum cum sterno describunt *r*, & mucronibus suis descendunt *s*, & mediis arcubus elevantur *t*, & marginem *v* inferiorem ante superiorem habent eminentem. Quampri- mum iidem musculi intercostales a contractione remittunt, continuo cartilaginee elasticæ ex violento statu in naturalem resiliunt, etiam in
sceleto

p Conf. *Gunz de situ parient.*
p. 31.

q *Fryer Orient. travels*
p. 192.

r Conf. n. 7. p. 31. seqq.

s ib.

t ib.

v ib.

sceletto hætenus flexili *x* ; quando in anatomico experimento sursum ductæ fuerunt , arcubus mediis descendunt , mucrones intimos elevant , marginem inferiorem retrorsum ducunt & introrsum , & thoracem arctant *y*. Facile est experimentum , & in vivo animale , & in mortuo *z*. Inde fit , ut , destructo abdomine & diaphragmate , tamen alternæ intercostalium musculorum contractiones superesse possint. Ea in respiratione , solus costarum elater intercostalibus musculis est pro adversario. Quod primo loco hanc expirationis causam *a* non posuerim , est quod costæ sæpe , in maxime naturali respiratione , vix quidquam moveantur *b*. Hæc ea exspiratio est , quæ per solam relaxationem peragitur *c*.

§. XXII. III. *Contractilis vis asperæ arteriæ & bronchiorum.*

Quam primum pectus contrahitur , & aer expelli cepit , etiam in pulmonem ea mutatio transit. Neque solum cedit parietibus pectoris , a quibus comprimitur , sed etiam hætenus propria vi contractionem molitur. Certe pulmo , qui

x *Memoire sur la respiration* p. 218. Exp. 2.

y *Borellus* prop. 85. 86. 87. 88.

z *Conf. Havers* p. 295. *Ber- tier* p. 191.

a Adgnitam a viris *Cl. J. Alph. Borello* prop. 91. *Mayow* p. 248. *Sam. Collins* p. 825. *Clopton Havers* p. 292. *Archibaldo Pit- carne* l. c. *Senaco* in *Heist. Jo-*

hanne Lieutaud p. 547. *G. Cheyne natur. relig.* p. 136. 137.

b p. 232.

c Sic fere *Fabricius* L. II. c. 7. p. 46. *Borellus* *Propos.* 92. *Whytt* p. 186. Solam tamen fere septi relaxationem & musculorum intercostalium vim quos novissimos nominavi, viri crediderunt sufficere.

inflatus tumuit, sibi permissus flaccescit & eliditur, non ab aere compressus, cum in cadavere aerem ejusdem densitatis contineat, quæ est atmosphæræ: neque adeo hujus pondus sentiat: Sed etiam in spatio aere vacuo, postquam extractus est aer, quo dilatati fuerant, pulmones subsident *d*, & merguntur, *e*, denique sub aqua, cum nulla nunc aeris externi vis ipsis incumbat. Neque ab aere thoracico pulmones eliduntur *f*, cum eodem modo contrahantur in aere libero, quando inflati fuerunt, primum sponte, deinde etiam magis, quando aer per fistulam exfugitur *g*. Pulmo adeo vastus post hæmorrhagiam ad duas uncias rediit *h*.

In hac contractione duplex potestas consentiens, simplex elater *i*, & naturalis in fibra animali contractio, hic omnino adgnosci debet. Siquidem, multis a morte diebus & horis, pulmones, quos incifores ad suos usus vellent siccatos, si minimum vulnusculum, aut laxitas vinculi aeri exitum concesserit, continuo detumescunt *k* & in exiguum spatium contrahuntur.

Neque tamen adeo evidentes etiam carneas

d *Phil. Transf.* n. 122. *Birch* T. III. p. 309. *Sanden de antlia pneumatica. Veratti Comm. Bonon.* T. H. p. 337. *Wolf Verfuebe* T. III. p. 103. *Senguerd inquis.* Exp. I.

e *Phil. Transf.* l. c. *Petit Mem. de l'Acad.* 1733. p. 5. *Veratti* l. c. p. 336, 339. *Hartmann gener. vivip. app.* n. 4. *Senguerd, Guide* p. 17.

f Ut credidit *Desaguliers* T. II. p. 391. Aere externo admissio minores fiunt, quam unquam in vivo animale fuerunt *Barry* p. 120.

g *Sylvius* l. c. n. 26.

h *Senac* T. II. p. 147.

i Habet *Cl. Bertier* p. 190 seq.

k Ut multi clari viri negaverint siccari posse p. 124.

fibras exclusero , eas maxime quæ pulmonem undique decurtant , cum bronchi longitudinem sequantur *m* , atque adeo ab omni ambitu superficiem visceris versus bronchi ingressum contrahant. Num cartilaginee super se adducant invicem *n* , non dixerim : certe in humano pulmone , mortuo , atque adeo post expirationem , non ita vicinæ sunt cartilaginee , ut inferior sub superiorem se subducatur. Denique valde probabile videtur , idoneosque testes habet . etiam alias , præter has longas , fibras , segmenta cartilaginea intra pulmonem revincire , ut superius solent. Etiam ex adeo bronchos arctabunt , & aerem expellent *p*.

Sola hujusmodi machina pulmonem in quadrupedibus frigidi sanguinis deplet , quæ glottidem adeo accurate norunt constringere , ut in aperto aere , frustra comprimente , pulmo turgidus se efferat. Eadem pro voluntatis arbitrio subito norunt eundem pulmonem evacuare *r* , ut flaccidus concidat. Ea mutatio , cum neque ab aeris pondere , neque ab aliqua caloris inæqualitate pendeat , ad musculosam aliquam , etsi parum oculis conspicuam , fabricam pertinet.

Etiam in homine potentius a bronchiorum &

m Conf. Galen. de usu part. L. VII. c. 9. Bartholin specim. anat. p. 80. Willis l. c. Collins p. 289. Bohn p. 88. Comper introduction &c.
n Adduci Galenus , Bellinus Lemm. 21. Willis p. 5. Schelham-
r mer de voce p. 10. Drake T. II. p. 219.
p Fanton p. 337. &c. Morgan Prop. 6.
r Chameleon totus dissectus diu potest spirare Aristoteles hist. L. II. c. 11.

pulmonis contractione id viscus subsidet, quam ab aeris pressione, qui abdomini incumbit, & musculorum, qui ventrem comprimunt. Nam pulmo in thorace multo amplior est, quam idem exemptus, quem tamen sola propria contractio inanit.

§. XXIII. IV. *Musculi auxiliares.*

Ad maximas inspirationes faciendas alias machinas natura paravit, quæ in communi, sani hominis expiratione quietæ, tunc demum operi succedunt, quoties vehementer clamare, aut tussi, aut sternutatione, asperam arteriam expurgare, aut ex adulti hominis amplo pectore vocem fortem, celeriter aucta glottide oportet edere: quam efflationem maxime laboriosam esse Cl. viri ostenderunt s. Ergo tunc musculi, qui totum pectus deducunt, costasque inferiores retrorsum revellunt, efficaciam suam cum musculis abdominis conjungunt, longissimus dorsi, sacrolumbalis, lumborum quadratus. Demum ut cervicis musculi extensores elevationem costarum adjuvant, ita flexores earum costarum depressioni favent. In fortissima inspirationum, sternutatione, exemplum est, in qua caput & collum vehementer antrorsum curvatur.

s Conf. Boissier de Sauvages de respir. diff. p. 18. n. 90. &c. Ob quadrata velocitatis summa reperit Vir Cl. si homo adultus pueri vocem voluerit imitari, dum interim pectus duplo amplius est, & pariter duplo angustior glottis, velocitatem 64plo augeri debere.

An etiam aliæ expirationis causæ fuerint , inquirere oportet. Multi scriptores x , & minime contemnendi y , mediastinum , aut pleuram , cum pericardio a septo transverso deorsum tractam , idem sursum ducere persuadentur , quando vires inspiratoriæ se remiserunt. Restitui equidem viscera , & sursum duci , antrorsum , certum est , verum debilis vis a membranis , potestate musculari , & vi irritabili destitutis sperari potest.

Sed neque aer thoraci z inclusus pulmonem comprimere potest , qui nullus sit.

Neque aer atmosphæræ a , qui abdomen & pectus comprimit , vim habet , quæ cum aliis causis expirationis comparari possit , cum ne in abdomine quidem flatus , aut fæces , aut alia contenta expellat , etiam ubi nulli sunt sphincteres , ut in avibus.

Debilem etiam a cutē b dilatata contractionem expectarem , qui videam , quam lente & debilitate eadem , post dilatationem a graviditate , hydrope , œdemate natam se restituat.

Aerem vesicularum inferiorum pulmonis , quasi alius esset a superiorum vesicularum aere , hic producebat *J. Baptista Mazinus* c : & aiebat , huic superiori columnæ resistere , hinc , quam primum aliquam nactus sit libertatem , eam ex-

x *Diemerbroeck* p. 317. *Bohn* p. 88. *de Gorter* l. c. n. 17. *Riolanus* p. 849. 854.

y *Parisini Academici* in *struthiocameli anatome*. *Perrault* *essais de physique* T. III. p. 234.

z *Hoadley* p. 9. *Hamberger* n. 55.

a *Hoadley* *ibid.*

b *Dan. Bernoulli* c. I. n. 5.

c *Mechanic. morbor.* T. I. p. 46. Edit. *Offenbac. Instit. medicin. mechanic.* p. 97.

pellere. Deficiunt hic limites duplicis aeris , & repugnat natura minus elastica ejus , qui penitissime in pulmones receptus est. Eum enim aerem oportet cedere potius puriori & elastico aeri atmosphærico , non vicissim superiorem evadere.

Videtur , vir Cl. hypothesein *J. Alphonsi Borelli* imitari , qui aerem per inspirationem ad mediam fistulam aeream unice penetrare *d* voluit , ultimas vesiculas per expirationem distentas tumere *e* , & in inspiratione detumescere.

Contractionem dextri ventriculi cordis *f* repugnare sanguini a pulmone redituro , sanguini nempe sinistrae auriculæ , deinde sanguini replenti pulmonis vasa , atque adeo aerem de vasis pulmonum expelli , nova est hypothesis. Verum post datas causas indubitatas expirationis , hypothesei non egemus.

Cæterum , cum exspiratio etiam a sola vi elastica costarum fieri possit , neque adeo multa musculorum opera egeat , merito velocius fit quam inspiratio *g* , etsi claros viros dissidentes memoravi. Merito eadem , quæ a relabentibus in naturalem situm thoracis partibus etiam absque musculorum motu fiat , ultimum est naturæ fatiscentis in moriente animale molimen.

§. XXIV. *Expirationis effectus.*

Primus , si glottis libera fuerit , est compressio

d Propos. 96.

e Propos. 91.

f Bertier *physique des corps animés* p. 147, prop. 11, Exp. I.

g *Floyer* pulsus duos ex-
spirationi assignavit , tres in-
spirationi *pulsewatch* T. II.
p. 332.

mollissimarum vesicularum pulmonis , dum cartilaginei bronchi liberi manent *h* , atque adeo aeris expulsio , qui per inspirationem paulo prius pulmonem subiit , dum de contracto pulmone , animæ nomine , molliter exhalamus , modica in expiratione , retentum aliquamdiu , hinc calentem & vaporibus infectum , quos alibi dicemus , Quando parum retentum aerem celeri expiratione abigimus , tunc vix mutatus frigere videtur.

Nunquam totus pulmo aere evacuatur , quem recipit *i*. Mirum est visu , experimentum facile & sæpissime factum. Pulmo fetus , qui aerem non respiravit , densus *i** & ruber *k* subsidet *l* , neque natat unquam , nisi putredo accesserit , neque tunc aut facile aut semper. Idem pulmo , sæpe unicam per inspirationem *m* , certe per unicam lenem inflationem *n* , ita

h Hoadley p. 49.

i Pitcarne l. c. n. 12. p. 51. Bohn p. 87. Molinet. in disquis. anat. pathol. p. 215. Borellus prop. 94. Hoadley p. 48. Petit Memoir. 1733. p. 13.

*i** Buttner zwey-köpf. frucht p. 13. 14. Sed nuper addit non tamen ut subsideat.

k p. 243. Petit ibid. Galen. util. part. L. XV. p. 6. Thruston p. 85. Ridley obs. p. 203. Roukema byvoegzel p. 28. Jecore solidior est Riolan p. 411.

l Notissima res testibus non eget. Ecce tamen aliquos Spigelius de form. fet. p. 20. Phil. Transf. 1755. p. 256. Drelincourt perioch. 55. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 202. & Dec. III. ann. 5. 6. obs. 256. in cane. Ruysch canal. Mus. p. 171. Ridley obsf. p. 180. Bohn de infan-

ticid. p. 179. offic. med. leg. p. 663. Cheselden p. 176. Mem. sur la respir. obsf. 126. 127. 128. 129. 130. Sancassani l. c. In cæsareis catulis Bohn offic. med. p. 663. in equo de Buffon l. c.

m Per paucissimas respiraciones Moebius in diss. inaug. obsf. 13. per unam Sancassani Galer. di Minerv. T. V. p. 296. Boeckelmann ap. Blancard Jaaregists. Cent V. Mem. sur la respirat. obsf. 126. 127. 128. 129. 130.

n Benligh de utero rupto p. 21. Pistorius fetus ex rupto utero &c. Conf. Petit Memoir. 1733. p. 4. Mem. sur la respir. 119. 120. 121. 122. 123. 125. 132. 134. Roukema byvoegzel p. 26. Phil. Transf. 1755. p. 256. In equi fetu Buffon hist. de la nature T. IV. p. 337. in vitulo Eschenbach contin. obsf. rar. 22.

mutatur, ut porro nulla adhibita compressione *o*, neque aeris arte densati *p* vi, ab aere purgari possit, neque alia præter inane spatium ratione *q*, & etiam is lobus solus natat, qui solus respiravit, dum alter fundum petit, ad quem aeri nondum datus est accessus. Una albicat nunc, & spumofam molitiem induit *r*. Neque effici potest, ut porro mergatur. In avibus *s* utique, quarum pulmo amplis foraminibus patet, non eadem promptitudine pulmonum mutatio perficitur, postque plusculas respirationes, id viscus in aqua subsidet, ut toties vidi in pullis meis.

Sed in homine, & in animalibus hominis similibus, utique ab hoc phænomeno fatis fidum signum reperitur, ex quo cognoscatur, num vivus in lucem editus puer respiraverit, num in utero materno prius vitam amiserit, quam sit in lucem editus. Vixit certe puer, cujus pulmo aquis innatat, neque vitium subrepere potest, nisi vel in os inflatus *t* aer fuerit, quod verum respirationis genus est, vel putredo *v*,

o Birch T. III. p. 255. 319. Roukema natuurl. Stelling. p. 2.

p Menghini Comm. Acad. Bonon. T. II. P. 2. p. 274.

q Phil. Transf. n. 122.

r Roukema natuurl. Stelling byvoegzel p. 20.

s Mem. cit. exp. 146. 148. & p. 358.

t Horn forsta bref om Siunkande och drifvande lungan p. 17. Valentin Pandeet. T. II. p. 564.

v Adlegata jam Boekelmanni tempore Blaneard Jarregift. Cent. V. deinde a J. de Gorter

Verhandel T. III. C. F. Kalt-Schmid exper. in pulm. Buttner

zweyköpfige Frucht II. Bosc diagnos, vitæ fetus & neogeniti.

Putridus fetus pulmo natat, qui nunquam respiravit Bohn

offic. p. 663. 664. Bresl. Saml. 1722. M. Oct. Heister de fallac.

pulm. exp. p. 21. Eph. Nat. Cur. vol. I. obs. 188. Erndl itin. angl.

bat. p. 90. Alberti de pulmon. subsident. p. 12. seqq. & in med.

leg. Roederer Sat. p. 13. Geelhausen p. 64. Boessel Comm. Lit.

Nor. 1736. hebd. I.

neque ea modica, tantum produxerit aeris, ut pondus specificum pulmonis, aliunde equidem aere exigua portione majus x , aquæ pondere minus factum sit. Id modica putredo y non efficit, major præstat z . Ita interpretor experimenta dissona Cl. virorum, in quorum aliis pulmo fetus, qui nunquam respiravit, per putredinem natavit, in aliis subsedit. Vidi & ego subsedisse, cum aliquot mensibus pulmo in cloaca cum fetu servatus fuisset, & ex eo phænomeno causam sumsi reæ servandæ. Sed alias utique & certo natasse vidi. Maxima demum & perfecta putredo, postquam volatile omne & aer exhalavit, & solus fere mucus atque terra de fetu superest, iterum subsidentiam efficit z^* . Neque tunc error in medici effato locum habet, si levî opera voluerit explorare, num & reliqua viscera natent a . Id si viderit, non aer in pulmonem per respirationem receptus causa erit natandi, sed aer ex humoribus carnibusque per

x In fetu mense quarto ut 282 ad 274. mense quinto ut 504 ad 494 in maturo fetu uti 3002. ad 2927. *Mazini de respir. fetus* diff. 6. & uti 30 ad 29. in in experimento Cl. *Sauvages Embryol.*

y Ejusmodi putredinem in experimentis fuisse oportet, quæ habet *Ruyfchius* apud *Blancard Jaaregist.* Cent. V. n. 92. III. *Teichmeyer med. legal.* p. 238. *Bohn de infanticid.* p. 175. *Zittmann* Cent. V. cas. 71. *Vater de sign. infant. viv. & mort.* p. 20. *Comm. Lit. Nor.* 1736. hebd. I. *Clauder. prax. leg.* cas. 7. *Joh.*

Horn bres. I. p. 18. 22. & in bres II. *Roukema byvoegzel* p. 33.

z Non recte adeo negat *J. Horn Act. Lit. suec.* 1721. p. 123. *Bres.* I. p. 5. aut Cl. *Eschenbach med. leg.* p. 115. per ullam putredinem pulmonem, qui nondum respiravit, natabilem reddi: ipsumque Cl. viri experimentum repugnat *conf. obs. rar. obs.* 2.

z^* *Bockel.*

a *Mem. sur la respir.* p. 359. *Roederer Satur.* p. 19. Ipsum cor & pulmones in vini spiritu nataverunt *Geelhauser* p. 55.

communem legem putredinis expeditus quam videbit, bullarum specie de tota superficie aut pulmonis aut integri fetus quasi efflorescere.

Contra poterit fieri, in adulto homine aliquando, in fetu rarissime, ut pulmo calculis, scirrhis, aliave materie morbosa gravis in aqua subsideat *b*, etsi quam maxime respiravit. Summa putredo, quæ pulmonem & integra corpuscula fetuum in tabum resolvit, dissipato aere iterum finit tabum fundum petere, in quem pulmo versus est. Vidi sanguinem ex ruptis per funestam peripneumoniam *c* vasis in pulmonem effusum *d*, ut tamen nataret: vidi scirrhos *e*, calculos *f*, & lymphaticum coagulum *g*, ut minime tamen subsideret. Sed viderunt alii, & in nimis tristi exemplo expertus sum *b*, post funestam peripneumoniam pulmonem fundum petiisse. Eundem eventum vidit post dolorem pectoris *Damianus Sinopeus i*; in pulmone ejus

b A pulmone denso posse errorem nasci *Hafsenest* T. II. p. 68. *de Haen* rat. med. II. c. 9. *Hafenörhl* febr. petechial.

c *Opusc. pathol.* obs. 14. hist. I. Pulmo animalium in vacuo spatium enectorum non subsedit in aqua, cum sanguine tamen suffunderetur *Mem. &c. Obs.* 142. 143.

d In apoplecticis non subsedit *Geelhausen* p. 53.

e Neque in *Moebii* obs. 5.

f Neque in exemplo *Comm. Lit. Nor.* 1743. hebd. 13. aut *Geelhausenii* p. 53. nisi valde multi fuerint calculi.

g Pulmonem carnosum in asthmaticis vidit *Fantonus* obs. 15. Lienis similem in hydropico

Idem obs. 5. hepatisque obs. 29. & *Gagliardi del mal di petto* (peripneumonia) p. 27. Pulmones solidi, & sanguine plenti in eo malo *Journal des Savans* 1757. Aug. in hydrope *Becket obs. chir.* p. 233. Densus pulmo & quadruplo sano major *Giorn. di Firenz.* 1768. p. 312. *Beschi Gal. di Minerv.* T. VII. p. 195. In subito mortuo *Smetius miscell.* X. p. 581. niger, & durus; tum apud *Kundmann Seltenheiten* p. 772. M. Oct. Durior & glandulæ similis pulmo *Bohn offic. dupl. med. diss.* I. n. 13.

b Obs. cit. hist. 2.

i *Parerg. med.* p. 58. & *Hofmannus* apud *G. v. Suvieten* T. II. p. 722.

lateris , quod aquis hydropicis plenum fuerat Cl. *Tschep k* , & G. *Cowper l* & Ill. *Portalius* ; in pulmone a tumido hepate eliso J. *Horn m* , in scirrhuso trienni puero *Idem n* , in purulento pulmone fetus o ave costis depressis compresso alii & Ill. *Kaltschmid p* , tum in aliis q vitiis ejus visceris post pleuritidem , peripneumoniam , scorbutum , asthma , hæmoptoen. Etiam a coagulo lymphatico pulmonem vidi subsidisse r. Inde , si inæqualis infarctus fuerit , aut perinde , si aerem non æqualiter totus pulmo receperit , poterit alia pars pulmonis submergi , alia natare s.

Poterit etiam in puero , partu vero excluso , qui tamen præ debilitate aerem nondum duxit , pulmo fundum petere t , etsi aliquantum se agitavit v. Neque enim adeo subito fetus respirat

k De amput. non cruenta.
l AdT. 21. Bidloi *Phil. Trans.* n. 285.
m *Forsta Bres.* p. 9.
n *Ibid.* p. 9. 10.
o *Geelhausen* p. 96. conf. *Zeller de subsid. pulm.* p. 24.
p *Kaltschmid* l. c.
q *Kulmus* T. 27. *Valentin pandect. medic. legal.* Heister l. c. n. 8. conf. *Geelhausen* p. 45.
r l. c. hist. 3.
s *Eph. Nat. Cur. Cent. IV.* obs. 90. *Select. Francof.* T. II. p. 317. *Alberti med. leg.* T. III. c. 5. *Kaltschmid* l. c. *Petit* l. c. Triduo a partu monstri pulmo fundum petiit *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs.* 158.
t *Diserte excipit Alberti in*

constit. crim. Carol. p. 117. 118. *Wittebergenses* apud *Amman de lethalit.* p. 431. *Bohn offic. med.* p. 666. Eo refero exempla *Schuchmanni Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. I. obs.* 104. *Heisteri* l. c. p. 15. *Bohnii* p. 181. l. c. de offic. med. p. 664. *Mauchartii Eph. Nat. Cur. Cent. I. obs.* 121. *J. Horne forsta bres.* p. 14. In *Zelleri (de pulm. subsid.)* vitulo morbus in pulmone erat. Eo retulerim eos fetus, quorum pulmones non natant , quia parum respirarunt, ut in *Guilielmi Cheselden* casu , pulmonemque vivi fetus in ipso partu enecti , cujus pulmo subsidebat *Alberti med. leg.* T. II. cas. XI.
v *Roederer* p. 13.

neque cum vigore v^* . In fetu in utero pulmones compressi rubri fundum petierunt v^{**} . Etiam pulmo fetus mortui inflatus, cum pars nataret, parte sui subsedit v^{***} .

Adparet, siquidem hæc est ex celeberrimis quæstionibus ad medicinam forensam pertinentibus, argumentum a pulmone natante & subsidente repetitum bonum esse verumque, ut subsidens ostendat fetum non respirasse, natans respirasse confirmet, neque fallere, dum simus memores, putredinem efficere posse, ut pulmo fetus natet, etsi nunquam aerem duxit; morbum facere ut subsideat, qui dudum & repetito respiravit. Novi Ill. viros etiam nuper dissentire & negasse putredini eam potestatem, sed certo quæ vidi refero, & quæ nullo experimento negativo, possunt refutari.

Idem aer, qui in pulmone latet, sub campana vitrea, subtracto aeris externi comprimentis prelo, pulmonem aut excisum x , aut in pectore relictum distendit y , ut mire turgeat, & denique crepet z , usque dum omnis aer de aperta aspera arteria exiverit. Tunc enim contrarius est inanis spatii effectus, & idem pulmo aere reddito nunc ruber a , compressus, sanguine

v^* Sabatier II. p. 131.

v^{**} Buttner l. c.

v^{***} Id. ib.

x Senguerd exp. 2.

y Bohn de respirat. n. 42.

Kuhnbaum p. 14. Guide p. 9.

Birch T. III. p. 255. 309. Verat-

tus l. c. p. 339. Musschenbroeck

diff. p. 27. 28. Etiam in erina-

ceo, ab antro lethifero enecto,

pulmones distenti fuerunt Bel.

Phil. Transf. n. 45.

z Kuhnbaum l. c. Musschenbroeck.

a Cimentini p. 108. 109. Hales hæmast. p. 83. Senguerd exp. I. II.

Wolf vers. III. n. 101. Guide

obs. 6. Musschenbroeck in Ci-

ment. p. 108. 113. Birch Exp.

T. III. p. 255. 309. Paulum

compressi pulmones in iis cani-

bus, quos Grotta del Cane occi-

dit Mem. de l'Acad. 1750. p. 78.

tum apud Mead of poisons p. 292.

effuso plenus *b* denique, sed sero *c*, in aqua densatus subsidet *d*, cujus eventus certa sunt testimonia.

Compressus in fulgurato, in animale in crypta canina enecto. Si vero aspera arteria ligata fuerit, ut aer de pulmone fugere nequeat, natabit idem, neque soliditatem illam induet, quam in vacuo spatio derelictus *e*. Diversitatem eventus Cl. *Verattus f* recte per longiorem, vel brevior, in spatio vacuo moram interpretatus est. A brevi mora aeris multum in pulmone remanet, idemque expanditur. Diutius si pulmonem in vacuo spatio reliqueris, & iste aer extrahitur, & inanes supersunt vesiculæ, cum systemate sanguineo impervio.

§. XXV. *Vasorum sanguineorum compressio.* —

Pulmo per inspirationem sanguini patuit, eumque recepit uberiolem. Verum nunc totus undique a contracto pectore urgetur, & in multo minorem molem comprimitur, eo minorem, uti exspiratio validior fuerit. Vasa ergo sanguinea breviora quidem fiunt, cum retractis

b Exp. 142. *Hofmann tentam. phys.* p. 247.
c Non mergebatur pulmo felis Exp. 142.
d Birch T. III. p. 255. *Guide* p. 17. & S. 2. *Senguerd inquis.* Exp. I. rat. & exper. connub. p. 276. *Mem. de l'Acad.* 1733. p. 5. *Phil. Transf.* n. 122, v. *San-*
den de Antlia pneumat. Wolf Versuch. T. III. p. 103. *Hartmann gener. vivip. app.* n. 4. In avibus non facile mergitur, ob foramina Exp. 143.
e *Guide* p. 9.
f *Comin. Bonon.* T. II. P. I. p. 336, 337, 339.

bronchis *i* : eademque angustiora nunc sunt, siquidem pectus secundum tres suas dimensiones arctatur, & pulmo pectus perfecte replet, & vesicularum concidentium membranacei parietes, qui vasa gerunt, undique in minus spatium redeunt. Ergo sanguis quidem in pulmone undique comprimitur *m*, ea vi, qualem definire conati sumus.

Inde venosus quidem sanguis æqua vi pressus, partim versus arteriosum sanguinem quidem reprimitur, eumque moratur aliquantum, partim versus cor sinistrum promovetur. Cum vero cor dextrum sanguinem pergat per arteriam pulmonalem subpeditare, & fluentum venosum ab arterioso impulsu suum ductum accipiat, & obsequatur, sanguis adeo venæ pulmonalis ad sinum sinistrum pellitur.

Post magnam, aut longam, inspirationem ergo, homo vera anxietate per expirationem liberatur; dum aer corruptus, & vaporibus noxiis plenus, adque sustinendum pulmonem ineptus, expellitur: novoque & puriori aeri successuro spatium paratur: deinde sanguis per inspirationem in pulmonem copiosius receptus, ibique per suas causas stagnans, de viscere educitur *o*. Quare, post inspirationem magnam, & nixum, non necessaria solum, sed gratissima

i Ex conversa priorum.

p. 144.

m Bellin Lemm. 24. Musschenbroeck diss. p. 34. Ferrein Ergo actio mechanica pulmonis in Expiratione Morgan. Prop. V.

o Sauvages de respir. diff. p. 2. 3. effets de l'air p. 43. Senac T. II. p. 238.

succedit exspiratio. Cum in sanguinem aer flatu impulsus, in pulmone moraretur, animal magnas exspirations molitum est *p.* Ab exspiratione pulsus incitatur *q*, recepto nunc in aortam sanguine, & sanguis de vena melius salit *q**. Vehementer etiam exspirat, si cursu aliave a causa concaluerit. Subito levatur bestia, quæ ex æstu animam agebat, vena incisa, subtracto adeo sanguine, quo pulmo opplebatur *r.* Cl. *Bernard* per respirationem singulo in pulsu plus aeris in sinistrum cordis ventriculum penetrare calculis positis existimavit.

Verum alter effectus exspirationis est utique, pulmonis arterias ita comprimere, ut ne pari facilitate sanguinem a suo cordis ventriculo recipiant. Cum enim pulmo parvum viscus sit, & in exiguum spatium immensam sanguinis copiam recipere debeat, tanto magis egebit expansione, quanto ea copia, pro arteriarum portione major fuerit. Verum demisit utique exspiratio id omne auxilium, quod inspiratio sanguini in pulmone venienti præstiterat, omnem nempe illam ab aere circum vasa diffuso laxitatem. Quare aut majori nunc vi cordis sanguinem in pulmonem agi oportebit, aut minori celeritate per pulmonem eundem commeari. Sed vires cordis definitæ sunt, neque supra certum pulsuum numerum, absque prompta machinæ

p *Physique des corps animés*
p. 15.
q *Sauvages diffic. respir.* *p.* 2.

*q** *Tulp. L. II. cap. 4.*
r *Duntze effect. calor.* *p.* 21.

destructione, contractiones cordis multiplicari possunt, neque resistantiam suis viribus majorem id organum superare potest. Quare ab expiratione, quam ponimus stabilem superesse, pulmonis pro sanguine immeabilitas oritur, quam neque absque palpitatione & vitioso conatu, neque demum omnino ullis suis viribus cor vincere queat. Hinc ab expiratione diutius continuata pulsus parvus & celer α . Laborat nempe cor sinistrum, neque sanguinem accipit.

Adparet adeo, quod non adeo facile erat prævidere, eundem esse effectum diutius protractæ inspirationis & respirationis: in priori casu & in altero perinde vasa sanguinea compressa esse & sanguini impervia. Inspiratione protracta vasa & bronchi se spontanee contrahunt, cum a corrupto aere male distendantur. Post longiorem expirationem & vis contractilis bronchiorum pulmonem constringit & una thoracis pressio.

§. XXVI. *Mortes animalium in spatio, ex quo aer extractus fuit.*

Cor absque aeris auxilio pulmonis resistantiam superare non posse, mortes animalium submersorum, aut in spatio inani inclusorum, utique ostendunt. Etsi enim etiam aeris de nostris humoribus se expedientis y sua noxa est, celerior est tamen suppressa respiratio, quam animalia

α Robinson l. c. p. 197.

y Conf. S. V. n. 6.

malia aere privata anhelatione anxia z, inspirationibus maximis, & miris conatibus thoracis, ad dilatationem nitentis, facile demonstrant: tum pulmonum a, cerebri, & mesenterii vasa cruore plena b, & ipsa demum refocillatio, quæ per novam inspirationem, inflatumve aerem obtinetur. Breve tempus est, quo animalia eo in statu superesse possunt, brevissimum quo quadrupeda & aves b*, quibus nempe ante omnem sanguinem, cordi sinistro & toti corpori destinatum, pulmo ponatur, quem transire sit necesse, ut quidquam reliquum corpus accipiat. In universum animalia calida fere pereunt intra unum minutum c, aut dimidium d. Paucis horæ minutis selem superesse vidi e. Intra 13 & 14 ictus pistilli catulus, & alius, aliquanto etiam maturior, post 7. 8. ictus interiit f. Intra 30 secunda cuniculus g exspiravit, Continuo canis, catus, mus, in *Johannis Mery* experimentis h. Juniora animalia aliquanto diutius durant i, & facilius reviviscunt k.

z *Camer. de antl. pneumat.* p. 14. *Sanden de antl. pneumat. Guide observ. anat.* 2. *Boyle phil. transf.* n. 62. etiam vipera.

a In nostris Experimentis n. 1. 2. 143.

b *Camer.* p. 27.

b* Aves continuo *Spalanzan. opusc.* I.

c *Derham physic. theolog.* p. 8. *Wolf vers.* III. n. 103.

d *Musschenbroeck in Cimentinos* p. 11.

e Exp. 142. Septem minutis *Boyle Phil. Transf.* n. 62. Sed eo tempore minus accurate campa-

na inaniebatur, a nuperioribus magis sollicitè, hinc velociores istorum mortes In *Cimentin.* p. 104.

f *Mem. avant 1699. T. II.* p. 20.

g *Musschenbroeck in Ciment.* p. 114.

h *Memoir. avant 1699. l. c.*

i *Pitcarne* p. 57. *Mery l. c.*

Boyle Phil. Transf. n. 62. tit. 4.

Arbuthnot of air p. 96. *Musschenbroeck post essais* p. 42.

k *Boyle ibid.* Catellus non revixit.

Sed nihilo longior vita fuit aviculæ *l*. In *Veratti* experimentis aves non super 32 & 42 secunda minuta vixerunt *m*. Continuo alia periit avis *n*, & intra 30 secunda minuta ple-ræque *o*, intra 90 secunda avicula *p* columba *q*. *Anas Boyleanus* 2 minuta eduravit *r*.

Quæ animalia parvam sanguinis particulam per pulmonem transmittunt *s*, frigida eadem ea longe ferius pereunt. Pisces aliquot aliquando diebus supersunt *t*, & pereunt tamen, aerem de squamis reddunt, semen dimittunt *v*. Idem branchiis vinculo constrictis male afficiuntur, hiant, celeriter os aperiunt clauduntque, & morti videntur proximi. Laxato tamen vinculo ad se redeunt *Ill. Gouano* teste. Sed hujus phæ-nomeni alia causa est, & sanguinis unice cir-cuitus turbatur non exigua arteria vinculo inter-septa.

Neque ob subtractum aerem lacertæ intereunt *x*, aut ranæ *y*, aut viperæ *z*,

- | | |
|--|--|
| <i>l</i> Exp. 143. | <i>v</i> <i>Cimentini</i> p. 108. 109. |
| <i>m</i> <i>Comment. Bonon. T. II.</i> | <i>x</i> Negat perire <i>Hartmann</i> |
| <i>P. I. p. 336.</i> | gener. vivip. app. n. 4. Pereunt |
| <i>n</i> <i>Birch T. III. p. 450.</i> | tamen minuto 10. <i>Cimentini</i> |
| <i>o</i> <i>Musschenbroeck Cimentin.</i> | <i>p. 101.</i> |
| <i>p. 114.</i> | <i>y</i> Difficulter istæ pereunt, & |
| <i>p</i> <i>Boyle Phil. Transf. n. 62.</i> | 27 demum hora <i>Derham physico-</i> |
| <i>q</i> <i>Guide p. 3. etiam citius</i> | <i>theol. Nollet p. 271. sic Spalanzan</i> |
| quam feles. | <i>ib. conf. p. 266. Mery. Pechlin</i> |
| <i>r</i> <i>Phil. Transf. n. 62.</i> | <i>aer. & alim. def. Mori negat</i> |
| <i>s</i> <i>p. 259. Spalanzan.</i> | <i>Wolffius Versf. III. p. 105. Birch</i> |
| <i>t</i> <i>Desaguliers T. II. p. 381.</i> | <i>T. IV. p. 319. Bertier p. 226.</i> |
| <i>Conf. Musschenbroeck essays tr.</i> | <i>Diu vivit bufo Bradley phil. ac-</i> |
| <i>des machines p. 42. s' Gravezande</i> | <i>count p. 120. Reddito aere con-</i> |
| <i>T. II. n. 617. Nollet leçons de</i> | <i>valescunt Boyle n. 62.</i> |
| <i>physique T. III. p. 271. Non</i> | <i>z</i> <i>Camer. Epist. Taurin. p. 18.</i> |
| <i>pereunt Boyle n. 62. Post ses-</i> | Negat perire, tum <i>Valisnerius</i> |
| <i>qui horam perierunt apud Birch</i> | <i>T. I. oper. p. 359. Diu vixerunt</i> |
| <i>T. I. p. 216. Ad se redierunt</i> | <i>apud Meryum. Aliæ perierunt</i> |
| <i>Phil. Transf. n. 33.</i> | <i>Boyle n. 62. aliæ ad se redierunt.</i> |

languent tamen *a* sed reviviscunt *a**.

Ædem ranæ & testudines ferunt levem illum aerem , & vacuo spatio proximum , cavernæ lacus Agnani *b*.

Etiam facilius exsanguia animalia aut *b** aere carent , aut leviozem & rarefactum ferunt *c* , ut cochleæ aut congeneres limaces *d* , tum de vermium genere hirudines *e* , & lumbrici *f*. Cochleæ aquaticæ tamen perierunt *g*.

Insecta *h* , quibus aer per cutem perspirat , diu vim vacui spatii ferunt , etsi in tanta raritate ætheris nequeunt volare *i* ; sunt , quæ mortua cum videntur , aere reddito vitam recuperant *i**. Ita muscæ *k* , scarabei *l* , grylli *m*. Perierunt apes *n* ; cancri non potuerunt occidi *o* , nec erucæ *p*. Animalcula illa simplicissima aquæ piperatæ post 24. horas vixerunt *q*. Acari triduo superfuerunt *r*.

a Bertier p.227. Birch T.IV. p. 319. Boyle Phil. Transf. n.62.

*a** Boyle l. c.

b Connor antr. lethif. p. 64.

*b** Spalanz. tardissime pereunt.

c Derham l. c.

d Derham , Boyle hora 12. Phil. Transf. n. 63. Sex horas vivunt Ciment. p. 114.

e Cimentini p. 99. Sex & ultra horis vivunt Musschenbroeck l. c. Occidi nequeunt. Phil. Transf. n. 63.

f Musschenbroeck ad Ciment. p. 99.

g Derham l. c.

h Martinet de respir. insect. ea quæ non pereant enumerat

p. 23. add. Derham L. I. c. r.

i Wolf l. c. Cimentini p. 101. Phil. Transf. n. 63.

*i** Boyle Phil. Transf. n. 63.

k Muscæ Desaguliers T. II.

p. 390. Boyle digress. de util. respir. Birch l. c. Pereunt tamen Cimentini p. 101. 106. & culices Phil. Transf. n. 63.

l Octavo demum die Hugen. Phil. Transf. n. 122.

m Cimentini p. 100.

n Boyle de aere exp. 40.

o Wolf , Boyle Phil. Transf. n. 62.

p Boyle Phil. Transf. n. 63.

q Derham l. c. p. 9.

r Boyle l. c. n. 63. tit. 20.

Uti submersa sub aquis animalia , ita quæ in spatio ab aere inani aliquamdiu vixerunt , & videntur periisse , aut certe animam agere , reddito aere , inspiratione utique reparata , & dilatato pulmone , iterum convalescunt ; minus tamen ea quæ in perfectius s inanito spatio , & diutius quidem vixerunt ; facilius contra , quæ in aere unice valde raro t. Sufficit autem aerem reddere ; ita post aliquam sæpe moram ad se redeunt , hiant , aerem captant , & facile convalescunt v , nonnumquam etiam ab aere , qui per effervescentiam natus est x.

Aviculæ promptum y auxilium requirunt , vix alias convalituræ.

Ranæ , ut tenacior ipsis vita z est , ita post longius tempus reviviscunt a , tum anguillæ b , & viperæ c. Sic in cochleis d , muscis f , apibus g , scarabeis h , locustis i , formicis k , post longius temporis intervallum vita cum aere redditur.

s *Phil. Transf.* n. 122. *Guide* p. 101.

nouv. exp. sur le vuide. Nollet a *Derham* p. 8. post 11 & 27. horas , & post integrum diem *T. III.* p. 265. *Hugenius Phil. Transf.* n. 122. Inde forte 7 minuta eduravit felis *Boylei Phil. Transf.* n. 62. *Nollet* l. c. p. 271.

b *Boyle digress. de respir.* c Post 23 horas *Phil. Transf.* n. 62.

d *Derham* post 28 horas. f *Boyle de util. resp. digress.*

Idem of posit. and privat. natur. of cold. p. 33. *Phil. Transf.* n. 62. *Derham &c.*

g *Derham , Boyle.*

h *Phil. Transf.* n. 122.

i *Boyle Phil. Transf.* n. 63.

k *Ibid.*

x *Birch T. II.* p. 25. Vapore ex aqua forti cum conchis effervescente nato.

y *Nollet* l. c. *Boyle exp.* 41.

z *Birch T. IV.* p. 319. *Boyle Phil. Transf.* n. 62. *Cimentini* p. 106. Inflata glottide *Ciment.*

§. XXVII. *Sanguinis per venas refluxus.*

Hic alter, & in anxietate augenda efficax, expirationis effectus sparsis olim experimentis innotuit, & per nostra demum l, & Cl. Lamure experimenta, firmitus in physiologiam potest recipi. Nempe in pulmonem, quamdiu expirationis status superest, ob compressa & angusta vasa, sanguis difficulter recipitur, & stat in auricula dextra, inque vena cava utraque. Deinde non stat solum, sed per pectoris compressionem vehementem omnino retro premitur, in cerebrum urgetur, sinus in duræ membranæ elevat, & totum viscus cogit turgere. Inde vertigo, pulsatio venarum brachii & colli in, metus apoplexiæ.

Contrarius est expirationis in venosum abdominis sanguinem effectus. Quum enim diaphragma venam cavam inter inspirandum comprimat, sanguinem a pectore repellit, intra hepatis venas & inferiorem cavam cogit refluere; exspiratio contra laxato diaphragmate, agentibus nunc abdominis musculis universum abdomen urgentibus, sanguinem cordi facilius reddit.

§. XXVIII. *Necessitas novæ inspirationis.*

Nihil nunc in hac necessitate obscurum superest.

l Conf. L. VI. & L. X.

m Ibid.

n Hist. de l'Acad. 1704. p. 160.

Neceſſe eſt poſt exſpirationem , pulmonem dilatari , ut ſanguis a corde dextro o in id viſcus viam inveniatur. Etiam tumorem cerebri tollere , ſanguiniſque undique de corpore reſluxum expedire oportet , ut undique venæ detumefcant , & explanentur o*. Ea ergo neceſſitas voluntatem impellit , ut vires inſpirationis explicet : & eadem per experientiam cognita , etiam prius ſuadet explicare , quam illa anxietas nata fuerit. Nihil hac voluntatis in molienda inſpiratione evidentius in aſthmate , laborioſa nempe , longa , & cum ſumma extenſione colli , capitis , viriumque inſpiratoriæ contentione , conjuncta inſpiratio , quæ cum polypis cordis p aut cum pulmonis tuberculis q adeo frequenter conjungitur.

Post longam intermiſſionem , in animalibus per vernalis teporem torporem hibernum excuſſientibus , ipſe calor ſanguinem , vix motum , expanſum per venas cordi miniſtrat , ſicque non a dolore r , ſed ab anxietate , renaſcitur inſpiratione. Mero a mechaniſmo ſanguinis de corde in muſculos intercoſtales expulſi inſpirationem cieri s , ideo minus receperim , quod & manifeſta ſit anxietatis obſervatio , & ſanguis muſculos minime ad contractionem ſollicitet : neque

o Conf. *Whytt* l. c. p. 178. ed. nov. p. 102. ſeqq. *Grævius* 179. *Fanton* p. 339. apud *Hofmann* de gener. mort.

o* L. VI. l. c. *Sauvages* l. c. in morbis &c.

p. 32.

p *Act. Soc. Med. Budiff.* p. 39.

Becket obſ. 25. *Hist. de l'Acad.*

1704. p. 160. *Barrere* obſ. anat.

q *Gibſon on horſes* p. 243.

Salmuth L. I. obſ. 7.

r *Whytt* p. 221.

s *Verryſt* p. 43.

enim cordis exemplum eo oportet trahere, cujus interna superficies irritatur *t*, neque in ullo alio musculo ejusmodi a sanguine impulso contractio percipitur, neque omnino sanguinis motus ad irritationem motumque musculi requiritur, exemplo motus peristaltici. Erinaceus, qui hyeme sopitur, non respirat conglobatus, idem respirationes molitur, si extenderis *t**.

Quæ causa sit primæ in fetu inspirationis, commodius dicetur, quando hominis in utero vegetantis historia prius exposita erit.

§. XXIX. *Tempus unius respirationis.*

Pergunt adeo in vivo animale alternæ vicēs respirationis; & inspirationem paulo prius, quam anxietas nasci potuit, sequitur exspiratio; hanc pariter cum bono hominis statu, inspiratio excipit, & æquabiliter compensatur alterna sanguinis per inspirationem in pulmonem subeuntis facilitas *v*, atque proxime secutura per venam pulmonalem, ab exspiratione expeditum in sinistram auriculam iter. Quare, cum modicæ fiant inspirationes & exspirationes, neque ab illis sanguis valde retardatur, neque ab istis nimis acceleratur, & æquabilis est cordis micatio *x*. Neque adeo aut sola in inspiratione sanguis pulmonem subit, aut in sola exspiratione *y*, neque

t Conf. Fontana Epist. II. spirationem evacuari, sinistram

*t** Targioni viagg. VII. p. 177. per exspirationem.

v Conf. Sauvages l. c. p. 3. *x* Thruston p. 88.

Caveam cordis dextram per in- *y* Idem p. 96.

vicissim aut in sola expiratione de pulmone exit, aut in sola inspiratione *z*. Neque unquam aut in expiratione ita evacuatur pulmo, ut exalbescat, neque per inspirationem ita repletur, ut magis rubeat, eaque phænomena *a*, a claris viris excitata, ad vehementiores expirationes pertinent: neque porro satis certe affirmatur, sanguinem per venam pulmonalem celerius, quam per arteriam fluere *b*, ut duo vel tres pulsus pro inspiratione, pulsus unus vel duo pro expiratione numerentur *c*, aut quinque pro expiratione, pro inspiratione tria tempuscula *d*.

Lentior autem, quam pulsus, est respiratio. Plerumque, in meo certe corpore, ad unum pulsum quatuor ex inspiratione, & expiratione compositæ respirationes fiunt, atque adeo, si 80 feceris in minuto primo pulsus, respirationes in eo tempore erunt 20, & unius respirationis tempus erit trium fere secundorum minutorum *e*. Non valde aliter *Johannes Floyer* 20 respirationes in pulsibus 80 numerat *f*. Aliquando tamen quinque in minuto primo respirationes admisit *g*, aut demum sex *h*. Duos tresve pulsus pro inter-

z Idem ibid.

a De pulsu per inspirationem diminuto, per expirationem

aucto vide *Sauvages respir. diffic.*

p. 2. aut per inspirationem aucto

& per expirationem aequali *Floyerum* p. 382. De pulmonis colore *Morgan. Prop. 5. p. 144.*

& olim *Swammerdam* p. 96.

b Ita *Santorinus obs. anat.* p. 148. *Whytt vit. mot.* p. 73.

c *Hahn l. c. p. 104.*

d *Sauvages diffic. respir. p. 3.*

e Sic *Hamberger n. 2.*

f *Floyer T. II. p. 384. in cho-*

lericis conf. p. 343. Stæbelin l. c.

cum pulsibus in minuto primo

86.

g *Slare Phil. Transf. p. 204.*

Floyer T. II. p. 330. 332. Qua-

tuor vel quinque *Charleton*

p. 151.

h *Floyer Cl. Bernard in probl.*

4. quod opus ferius accipio.

vallo unius expirationis & inspirationis numeravit *Sanctorius i*, & octo demum in homine, 60 pulsus in minuto primo numerante, respirationes alii *k* fecerunt.

Chinenfes *m* quatuor, vel quinque in una respiratione pulsus in sano homine numerant; vitiosum habent neque sine periculo, quando sex sunt, funestum si octo. Idem 13500 in die respirationes faciunt, in secundo adeo minuto supra 7, si de die 24 horarum sermo est *n*. Facile video, varietatem fuisse, & optime respirare, quibus plurimi ad unam respirationem pulsus sunt. Tibicen erat, qui per duo minuta horæ inflare pergebat, huic pulsus fere decem o in una respiratione fuerunt.

A motu incitato corporis 30 in minuto respirationes habuit *Floyerius* cum pulsibus 90. & quinque contra a pastu horis non erant supra 19.

In gravida femina *Idem* ad 98 pulsus respirationes vidit 37.

In pueris respirationem unam numerat ad tres pulsus *p*.

In febre pulsus alias quatuor ad unam respirationem *q*, & cum inflammatione pulsus 130, respirationes 60 *r*, adeoque ad usque unam ad $2\frac{1}{2}$ pulsus, & unam in minuto secundo respirationem *Idem* recipit.

i In I. Fen. *Avicennæ* p. 365. est ad manus.

k *Stæbelin* p. 26. *Boerhaave prælect.* ad T. V. P. I. p. 155.

m *Du Halde.*

n *Cleyer* p. 15, neque enim

o *Hales hæmast.* p. 100.

p *Floyer* T. II. p. 345.

q p. 344.

r *Ibid.*

Contra paucae sunt respirationes asthmaticis, ut 13 pulsus uni respirationi respondeant *s* & demum 7 respirationes sint ad pulsus 96 *t*, neque supra septem in minuto primo sint.

Ita porro, uti pulsus celeriores in animalibus, ita fere respirationes numerosiores sunt. In avibus *Floyerius* 25 & 50 respirationes *v* in minuto primo numeravit. In catello fuerunt 43 *x*, in equo 16 *y*, in asino 12 *z*. Elephas lentissime respirat, ut intra unam respirationem 30 voces pronunciare possis *a*.

In piscibus intra 1 minutum branchiae 25^{es} & 26^{es} & 30^{es} agitantur *b*.

Rarissimae sunt respirationes animalium frigidorum. Ranæ longissima sub tortura incisoris inspirationum intervalla faciunt: chamæleon etiam dimidii diei *c*; & testudo mensem integrum absque respiratione supervivit *d*.

Quæ hæcenus diximus, videntur concentum aliquem inter pulsum & respirationem ostendere, quem plerique statuunt, ut una numerus pulsuum crescat & respirationum *e*, & cum circulationis velocitate & calore sanguinis *f*, & ipsa respiratio acceleretur.

Verum multis modis iste concentus turbatur. Et primo solo voluntatis imperio respiratio pro-

s Ibid. p. 384. 414.

t Ibid. p. 344.

v T. II. p. 345.

x Idem ibid.

y Idem ibid.

z Idem ibid.

a Gillius p. 503.

b Floyer.

c Parisini de la tortue.

d Mem. avant 1699.

e Stæbelin puls. p. 25. Swam-
mordam p. 80.

f Whytt p. 180.

duci potest, cum pulsus interim non mutetur. Quindecim pulsus adeo unica cum respiratione metitus est Clariss. Floyer g. Ergo ad sedecim secunda minuta, & pulsus 21 h unam respirationem produxi.

Sed præterea & olim *Aristoteles i*, deinde *Galenus k*, denique *Harveius l* vidit, minime firma esse, quæ de hoc perpetuo concentu alii docuerunt. Nam pueris multi pulsus, respirationes paucæ sunt. In febribus, accurate requirendo propria mei corporis phænomena, reperi, quoties nimius ardor abest, & pectus est liberum, pulsus posse ad 120 incitari, dum respiratio vix pro sensibili portione frequentior est, quod adeo ornavit *Harveius m* ut etiam rariorem fecerit. Contra in maligna febre celerem respirationem viderunt Cl. viri pulsu parum mutato m*. In asthma ostendimus, pulsus in minuto primo 91 & 98 n fuisse, respirationes tantum septem. In Cl. *Martini* adnotationibus pulsus in variolis alio & alio tempore diversam ad respirationem rationem habent. Fuerunt pulsus 127 cum respirationibus 35, & 140 cum respirationibus 37 & sic alia & alia rationes fuerunt n*.

Quare omnino memorem esse oportet, longas respirationes, & suspiria, infarctum pulmonis

g T. II.

h Conf. *Muralt vadem. anat.*

p. 239.

i *De spiritu c. 4.*

k *Art medica p. 61.*

l *Proem. p. 11. 12.*

m l. c. citat. d. 1.

n* *Medical facts p. 3.*

n Floyer II. cc.

n* *Wetensk. Acad. Handl.*

1773. trim. 3.

demonstrare, & cum lento sanguinis motu, & denique cum crebris pulsibus consistere posse, dum una pulsus exiguus sit, & cor parum sanguinis suppeditet o. Celeres vero respirationes necessario requiri, quando multus sanguis a corde in pulmonem expellitur, quem oportet per id viscus promovere.

Etiam id vere p vidit *Galenus*, si parva est respiratio celerem esse: compensanda enim est celeritate parva illa, quæ a minori respiratione pendet, pulmonis dilatatio, & plurium quasi inspirationum uniendæ vires.

Ex tempore, quo una respiratio absolvitur, definitur copia sanguinis, quam per pulmonem cor intra unam respirationem transmittit. In uno minuto 8. 74. libras numerat *Cl. Hales* q. Si vero 27 in eo tempore sunt respirationes, & pulsus 65, qui numerus certe est ex uberioribus, sanguinisque unda duarum unciarum, erit summa 150 unciarum, & in una respiratione uncia $5\frac{1}{2}$ neque multo plus numerari potest. Alios calculos inivit *Cl. Bernard*, quos nunc cum hæc res non possint certis experimentis definiiri, malumus omittere.

Semel omnino cor evacuari potuisse in una respiratione, cum totum cum pericardio, & adeo cum pulmone conferbuiſſet, summi viri est adnotatio. Pulsus una celer erat, non tamen palpitans r.

o Unica respiratio fuit cum malium moribundorum *Hales* pulsibus forte 100, cum hi 100 pulsus tantum duas sanguinis uncias adferrent de *Haen ratio medend. L. II. p. 138.*

p *De util. respir. L. I. Hæ* sunt celeres respirationes ani-

hæmast. p. 6: quæ nempe parvæ sunt & imperfectæ.

q *Hæmastat. p. 98.*

r *De Haen rat. medend. L. II.*

p. 138.

§. XXX. *Respirationis species rariores. Suspirium.*

Quæ sequuntur corporis humani actiones, ad respirationem omnino pertinent, & vel inspiratione absolvuntur, vel expiratione, vel utriusque definita aliqua consensione.

Ad inspirationem pertinent suspirium, oscitatio, suctio. Ad expirationem vox, cantus, loquela.

Ad vires inspirationis, cum expirationis viribus certis legibus conjunctas, anhelitus, nixus, tussis, risus, fletus, sternutatio, denique singultus & vomitus.

Suspirium est lenta & diuturna inspiratio, qua æquabiliter pectus extenditur, & plurimo aere repletur. Quare ex animæ imperio suspiramus, quoties difficilius, sed absque dolore inspirationem inacceptam reddituro, sanguinis per pulmones iter est, sive nunc cordis vires deficient, sive pulmo impediatur, sive & cor valeat & pulmo, verum sanguinis ad pulmonem confluxus solito major sit, neque a viribus consuetis inspirationem cientibus in copia transmitti possit. Plerumque ex tristi adfectu suspiramus, quando vis quasi ponderis pectori incumbit, & ipsa cordis contractio debilitate languet. Suspiramus etiam in pulmonis infarctu, in peripneumonia, & post nixum, cursum & fatigationem. Cum suspirio reviviscunt feminæ hystericæ, post diuturna animi deliquia. *Suspiriosi* denique sunt,

qui nunc Asthmatici audiunt, qui idem *Virgilii* morbus fuit. Finis naturæ semper idem est, facilitatem sanguini per pulmonem transituro parare quam maximam *t*.

Quare a suspirio pulsus acceleratur *v*, & sanguinis de vase aperto saltus altior est *x*, & pulsus in minora usque vasa producitur *y*.

Cur noceant in mœrore suspiria *z*, aut inde in auricula cordis abscessus nascatur *a*, ego non video, sæpe benefici moliminis benignum effectum & præsens inde quasi levamen expertus. Vires, quibus cietur, non repeto, videtur autem diaphragmatis in suspirio præcipuas partes esse.

§. XXXI. *Oscitatio.*

Oscitatio & ipsa & longa & lenta est inspiratio, qua multus in pulmonem aer adducitur. Non uno tamen modo a suspirio differt *b*. In oscitatione maxilla inferior lente & quam maxime diducitur, ut oris aditus quam amplissimus fiat. Inspiratio & diuturnior est, & major, quam quidem in suspirio. Deinde in oscitatione post longam inspirationem, adducto una ore, exspiratio magna succedit, non sine aliquo, qui exaudiri possit, moti aeris strepitu.

t Per ea quæ supra p. 243. 244. 245. 246. dicta sunt.

v *Hales hæmæstat.* p. 78.

x p. 16. Omnino $14\frac{1}{2}$ lineis.

y p. 246.

z *Thruston* p. 70.

a *Nicol. Fontanus consp. & resp.* p. 62.

b Notas discriminis collegit vir egregias *Dav. Eman. Berdot* in propria de suspirio thesi inaugurali p. 4.

Præcedit oscitationem lentior per pulmones sanguinis motus, ut cum solitis inspirationis viribus per id viscus circumire nequeat. Inde incommodum & quasi pondus percipimus. Ergo maximam inspirationem, plurimo cum aere molimur, ut quasi ad *Hookiani* experimenti similitudinem, per pulmonem quam distentissimum, aeris iter quam facillimum sit. Voluntatis adeo & ipsa opus est, & potissimum diaphragmatis.

Remotiores causæ fere omnes ad aliquam debilitatem pertinent, somnolentiam potissimum ingruentem, nam pariter omnino eo in statu animalia *c* oscitant. Aliquoties etiam, quando expergiscimus, oscitare solemus, quando nondum absque somni miscela vigilamus. Eo in statu ostendemus alias, sanguinis venosi lentiores esse reditum *d*.

Oscitamus etiam, maxime quicunque corpore sumus graviori, quando incitato gressu nos ad anhelationem usque exercuimus: eo in statu cor quidem celeriter micat, sed sanguinis copiam majorem pulmoni submittit, quam quæ facile transire possit, nisi nova per id viscus meaturo facilitas parata fuerit. Oscitamus etiam utcunque defatigati. Celebris est oscitatio cum fame conjuncta, quæ per validam corporis per frigora exercitationem oritur, quæ eadem in

c De Gorter de perspir. p. 292. *J. de Gorter de perspir. aphor.*
 Integerrimæ valetudinis addit 338. 339. 340. 357. Vide interim
 signum esse. *Comm. ad Boerh. T. IV, n. 599.*
d Sanguis incipit stagnare *not. m. & x.*

Bruto e minori innotuit, & in septentrionalibus regionibus *f*, atque in ipso Belgio *g* juvenibus glacialia hiemis æquora percurrentibus non rara accidit: etiam funesta, quoties eam famem firmus & difficilior cibus non consolatur *h*. Ejusdem generis esse videtur, quod a defatigatione oritur.

Oscitant feminæ hystericae, & ante paroxysmum convulsivum, & eo superato. Oscitant ægri in febrili frigore.

Sed etiam in vacuo spatio *i* aerem, quæ captant, animalia oscitare videntur, & cæsarea sectione incisi catuli, quando primum aerem vitalem gestiunt haurire, ipseque nuper exclusus fetus *k*. Similis est illa diuturna, pene novem mensium, oscitatio feminæ, cui pulmo tophaceis concrementis plenus erat *l*. Conatus erat naturæ, ut pene inutili pulmone uteretur. Rariores & minutiores causas omittimus *m*.

Effectus oscitationis est, sanguini per pulmonem plurimo aere distentum iter aperire *n* liberius. Ad tollendam ergo in fatigatis difficultatem transeuntis per pulmonem sanguinis facit, sanguinis motum accelerat, pulsus augeat, hæmorrhæ-

e *Plutarchus* in vita viri.

f De ea fame *Bartholinus* de nive p. 187. Neque ignota fuit *Rhazi* ad *Manzorem* L. V. c. 6.

g *Boerhaave* *Prælect.* T. IV. p. 620. ad n. 433.

h *Boerhaave* l. c. Vinum cum pane dare jubet *Rhazes*.

i *Guide obs. anat.* 2.

k *Walther* de oscitatione p. 35.

l *Coschmiz* de morb. gravid. & puerp.

m Ventriculi plenitudinem, quæ diaphragmatis motum moritur *Walther* p. 32. glandulæ parotidis in biventrem musculum pressionem p. 16.

n *Nicolai* von der Einbildungskraft p. 77.

hæmorrhagias visa est o incitasse, perspirationem de pulmone præcipitat, expedito sanguinis exhalantis motu p. Id est forte illud a Sanctorio ad cutaneam perspirationem traductum incrementum ejus excretionis. q.

Subtilius est, sed verum, in oscitatione bronchum vehementer descendere, & adeo cellulosa tela conjunctas venas & educi, & iterum adtrahi, & quasi concuti r.

Certum est tamen, minus, quam ab alio musculorum motu in somnolentia ab oscitatione profici, neque perinde corpus levius reddi s.

Alios effectus ad hiatum oris potius refero, quam ad respirationis mutationem t. Quod oscitans oscitationem ad similem hiatum invitet, ad communem utrique ab iisdem causis oscitandi necessitatem refero, cujus memoriam præfens exemplum animo revocat.

Longa inspiratio oscitationem tollit v, quia pulmonem quantum satis est liberat.

Pueri oscitant frequentius, quia somni cupidiore sunt, quibus in dato tempore cor numerosioribus defungatur ictibus, & quibus plerumque etiam totum corpus crebriori & perniciosiori motu exerceatur x.

o Etiam lochia a partu auget
Walther p. 29.

p Walther p. 27.

q Sect. I. n. 74. Sect. IV. n. 32. 33. Addit intra 30 minuta per oscitationem, & paniculationem, plus perspirari, quam tribus horis alterius temporis n. 34.

r Walther p. 22.

s De Gorter de perspir. p. 292.

Tom. VII.

t Mucum tonsillarum spissiorrem ejicere Walther p. 19. & tubam Eustachii aperire Idem p. 18.

v Hippocratee Epidem. L. VI. S. 2. & L. II. S. 3. Cohibere respirationem jubet Galenus de diffic. respir. L. III.

x Ob flexilem thoracem plus oscitare Schreiber Almagest. p. 368.

Minus audiunt oscitantes *y*, quod in magna illa inspiratione, aer plurimus ore forbtus, per tubam *Eustachii* subeat; & resistat aeri per meatum auditorium ad membranam tympani venienti, ut ea membrana sonoris suis tremoribus minus recte defungi possit *z*.

§. XXXII. Suctio.

Suctio & ipsa inspirationis genus est, etiamsi alium finem habet. Qui fugere vult, tubulum aut liquore replet, aut in vas dat, quo liquor continetur. Deinde labia sua tubulo liquorem adducturo, aut papillæ, in exemplo infantis, accurate adplicat, ut nullum inane spatium labia inter & tubulum supersit. Tunc inspirationem molitur *a*, ita aer ex ore in diducti pulmonis laxius spatium descendit, & ipse adeo rarefcit, qui in ore superest, aer. In id spatium, quod minus nunc resistit, per leges alias dictas *b*, atmosphæræ pondus, aut elater aeris vase contenti, quando de clauso vitro fugitur, liquorem impellit, qui in tubulum succedit, ut in os veniat. Ex ore porro idem liquor per vires alibi explicandas, & deglutitionis operam in ventriculum descendit. Perinde suctio fit, si tubulum in liquorem dimiseris, siphonem tubulo adplicaveris, & adducto embolo spatium in eo

y Cassius problem. 20.

z J. R. M. n. 554. & comm. T. II. p. 158.

ad eum n.

b n. 230. seqq.

a Sturm. colleg. curios. exper.

siphone *c* laxius paraveris, ita enim de vasculo is liquor succedet, ut solemus in anatomicis administrationibus.

Hirudo fugit *d*, dum in ore suo spatium parat, lingua sua in pharyngem retracta. Marina illa hirudo, ab amico olim nostro *Garcino* descripta *e*, antliam pneumaticam imitatur, dum partem corporis sui anteriorem mobilissimam, in posteriorem firmiorem immotamque reducit, postquam propria quadam eminente carne id corpus amplexum est, de quo vult fugere. Sed ea melius dicemus, quando de fugendo lacte sermo erit.

§. XXXIII. *Anhelitus.*

Vocem, cantum, loquelam, organi difficultas jubet alio, & peculiari loco dicere. Sequuntur aliquæ virium expirationis cum inspirationis organis consentientium functiones.

Anhelationem brevibus verbis licet absolvere, quæ sit unice frequentior series brevium inspirationum, cum brevioribus pariter expirationibus alternas vices tenentium. In omni cursu, & vehemente motu, anhelamus *f*. Inspirationes crebriores sanguinis per musculorum motum celerius reducis *g* copia poscit: expirationes

c Nollet T. III. p. 200.

d Poupart Journ. des Savans 1697. n. 28. Morand Memoire de l'Académie 1739. p. 63.

e Phil. Transf. n. 415.

f Nares findunt asinis in Persia, ut facilius in cursu

inspirent Chardin T. IV. p. 7.

g Anhelant adeo, ut minorem pulmonis a leviori aere distentionem compensent, qui in rarissimo aere montium Peruvianorum corpus exercent Bouguer Mem. de 1744. p. 161.

jubet subjicere anxietas, quæ post magnas inspirationes inevitabilis sequeretur, si una longæ essent. Cum adeo omnia respirationis organa, & celeriter equidem, in anhelitu laborent, promptissimum est, ut vehementer calefaciat, circulationem sanguinis & pulsum augeat, & viribus absumentis fatiget.

Anhelamus in orthopnoëa, in pectoris vulneribus, in febribus pectus impredientibus, in febribus calidissimis, in ipso aere præter modum calente, in vacuo spatio, in mortis confiniis. Pulmonem nempe oportet vehementer distendi, ut sanguis per difficultates pulmonis commeare possit; ut cum aere calidiori, rariori, leviori pulmo tamen quantum satis est, tumeat & inflectur. Expirationes per priora validæ sequuntur. Multum enim sanguinem in pulmonem per inspirationes receptum, oportet per expirationes abigere.

§. XXXIV. *Nixus.*

Vulgatissimus hic naturæ conatus est, neque tamen fere invenio, qui pro dignitate hunc præcipuum vehementer volentis animæ satellitem exposuerit.

Nixus est diuturna inspiratio, & diaphragmatis major descensus, cum longa aeris detentione, dum interim muscoli abdominis una agentes vehementer expirationem moliuntur, neque ad effectum perducunt, quia diaphragma pari cum ipsis robore una laborat, & resistit, ne in thoracem se repellant: glottis vero accurate clauditur *b*.

Hujus nunc nixus aliqui effectus manifesti

sunt, alii obscuriores. Pressionem abdominis incredibilem facile perspicimus, quam præstat, dum desuper diaphragmatis vis, & antèrius & ad latera musculorum abdominis obliquorum & transversorum cingulum, & rectorum demum anteriores carnes eum ventrem arctant. Maxima ergo vi in pelvim urgentur viscera quæque, aut quæ visceribus continentur, fæces alvinæ, fetus reses, calculi recti intestini, ureteris, vesicæ, urethræ. Incredibiles inde dilatationes sequuntur urethræ, uteri, vaginæ, recti intestini: & demum ipsa ossa pelvis suis in commissionibus luxantur *i.* In partu difficili omentum fufum *h.*

Eadem vis abdominis vasa sanguinea arctat, venæque cavæ sanguinem exprimit, versus cor compellit, hepar evacuat, bilem, calculos felles per suos canales promovet. Neque nunc retrocedit de corde venosus sanguis, quem abdominis muscoli potentissime ad loca liberiora, & pectus dilatatum urgeant, dum interim etiam diaphragma contractum eam venam stringit, neque cruorem finit relabi *l.* Arteriam porro aortam, etsi valentem, comprimit tamen vis nixus, atque de corde succedentes undas moratur *m* ut

i Suo loco id confirmabimus. Vide interim diff. a Winslowo & Bouvarto defensam, qua evidentia rei gestæ testimonia continentur.

h Solingen Embryulc. p. 22.

l Quelmatz de adjum. sang. regress. Schwartz n. 17. conf. Mem. sur la respir. Exp. 53. 56 -- 62.

m Habet aliquid simile Cl.

Hales hamast. p. 161. 162. sed ab influxu sanguinis in musculos majus robur expectat. Nunc in nixu sanguis de inferiori aorta avertitur, & tamen etiam eorum artuum muscoli majus robur accipiunt. Sed etiam absque arterioso sanguine muscoli agunt. In minimis vasculis sanguis a nixu acceleratur

Caldani experimento.

arteriæ distendantur *m*^{*}. Inde illa, quæ jam tetigimus aneurysmata *n*, a nixu adeo frequenter nata, ut etiam in equis *n*^{*} notissimum morbum efficiant, demum a nixu arteriarum & venarum ipsiusque cavæ diruptiones, inque nitentibus crebræ, & quod ipse vidi, ex ruptis sub cute arteriis, latæ cruoris suffusiones per pectus & latera sparsæ, ut hæmoptoen nimis notam omit- tam. Hæmorrhagiæ a musculorum motu enor- mes *o*. Abcessus inde latus sanguineus *p*.

In pectus sanguis ex abdomine quidem con- gregatur. Sed & ob resistantiam cordi oppo- sitam, & ob diuturnam inspirationem, colli- gitur in pulmonem *q*, cujus vasa rumpi visa sunt *q*^{*}, hinc in dextras cordis caveas, venasque colli, capitis congeritur: hinc livida, tumidaque facies *r*, inde ruptis pulmonis vasis hæmoptoe *s* nimis a nixu frequens: inde inter nitendum mortes apoplecticæ *t*. Ruptæ venæ *t*^{*}; sanguis effusus sub membrana pulmonis, qua ad clavi- culam veniebat *t*^{**}. Hydrophobicus ligatus uno conatu omnes funes rupit, & una, resolutus exspiravit *v*.

m^{*} Hales p. 102.

n Lancis. aneur. p. 110. ed. nov. Le Dran obs. 150. Hist. de l'Acad. 1700. hist. 6. 1750. hist. 3. Savard obs. 40. Guattan obs. 2. Relof Mem. de Berlin T. XIII.

n^{*} Fontes adscendentibus G. v. Swieten III. p. 288.

o Schwenke p. 34.

p Eller in obs.

q Hipp. Epid. IV. n. 14. cum

homo asinum sustulisset.

q^{*} Clauser balsam. method. p. 175. in cane.

r Milonem nixu, venarum- que frontis tumore vinculum circumpositum rupisse legimus.

s Platner de actione negotios. circumcidenda.

t Ex choreis Platner.

t^{*} Zod. Gall. III. p. 444.

t^{**} Becket obs. chir. 16.

v Mead of poisons p. 136.

Eodem pertinet sanguinis tantus impetus, ut per lotii vias exeat v* inque cutis vascula v**, & in varia spatia cellulosa v†; ut etiam de labiis erumperet v††.

Facilia ista, id mihi vero obscurius videtur, quare diaphragmatis vires cum abdominalibus musculis jungamus, dum pondera sublevamus, & ultimo totius corporis conatu obstacula conamur superare. Neque enim fallit instinctus, & melius, dum aerem retinemus, superamus pondera, & continuo viribus flaccescimus, quam primum laxato diaphragmate spiritum dimisimus.

Meditato videtur non una causa esse. Et primo musculi corporis humani universi in trunco corporis, nempe in pectore fundantur, & continua dorso spina. Ut ergo plena vi ii musculi laborent, oportet eam spinam esse quam firmissimam, ut tota vis musculorum brachii, aut humerorum, aut aliorum artuum, in suorum membrorum adductione ad pectus, consumatur, nulla amittatur in pectoris adductione ad artus. Eam autem firmitatem præstamus nobis, dum viribus quidem inspirationis usi, cervicem, & caput retrorsum conjicimus, & pectus, ne antrosum cedat, retinemus. Præterea humeros elevamus cum pectore, atque ponderi & ipsos opponimus, & subrectam immotamque cervicem, & caput retro versum.

v* *Lister ad aphor. Hippocr.* p. 121.

v** Sudor inde cruentus E. N. C. Cent. VIII. obs. 81.

v† In ferotum *Saviard* p. 129.

v†† In ultimo Epiri principe *Alcaandro*, quem vulgo vocant *Scanderbeg*. S. *Alberti* de sudore cruento.

Deinde certum est, per inspirationem continuatam sanguinem in cerebro retineri, ne redeat. Verum in nixu non solum non redit de cerebro, sed etiam per arterias eo quam plurimus congeritur. Musculi enim abdominis contenti efficiunt, ut sanguis ab inferiori corporis parte, nunc quam maxime compressa, averfus, & pene exclusus, in cerebrum congeratur. Etsi nondum inquirimus, quæ sit encephali in musculos potestas, novimus tamen cum vulgo, ex sanguinis in cerebrum copiosiori confluxu in maniacis, in phreneticis, vires a musculis omnibus exerceri earum maximas, quæ per corporis conditionem possunt impendi. Phreniticus cancellos ferreos fregit *x*. Iratus leo dentium vestigia ferro impressit *y*.

Quam primum hanc virium unionem amisimus, & diaphragma sursum redit, evacuatur utique pulmo *z*, & sanguine se deplet, isque succedit in pulmonem, qui ante ventriculum dextrum stabat, atque eo evacuato paulo post cerebrum se deplet, nimioque suo cruore inanitur. Una firmitas spinæ dorsæ perit, musculique humerorum elevatores subrepto suo puncto fixo labascunt, & una cum pectore descendunt. Auferuntur ergo ab homine expirante causæ, quæ fecerant, ut robur musculorum majus esset.

x Panarolus Pentec. IV. *y* Phil. Transf. n. 310.
z *ibid.* 49. *p.* 94. 95.

§. XXXV. *Tussis.*

Non eodem tempore in tussi diaphragma operatur & musculosum abdomen, sed duobus, quæ se proxime consequuntur, tempusculis. Tussim præparamus magna inspiratione facta, diaphragmate adeo fortiter deorsum presso *a*, ut abdomen intumescat: ita plurimus aer in pulmones recipitur. Paulo post contrahimus, cum robore & velocitate, musculos abdominis, aliasque expirationis vires expeditus: ita subita sequitur & valida exspiratio *b*, non sine sono: Hoc modo obtinemus, ut aer ad torrentis modum, ventive, ab imo pulmone undique, per bronchum erumpat. Una mucus congestus, illapsa corpora aliena, materies pleuritica, pus, calculi, & quæ alia præter naturam in broncho ejusque ramis hærent quasi de prelo nitente expulsa profiliunt. Sæpius, quando prima expiratione causa molesta non potest expelli, aliæ & aliæ succedunt concussiones, pariter omnes ex inspiratione magna & veloci expiratione compositæ.

Voluntaria iterum actio tussis est, finemque habet, molestia nos liberare, quam teneri in bronchiis aut aspera arteria nervi patiuntur: ut omnino ex tussis fine, causaque, ad inspirationis aut expirationis fines causasque non imperite arguatur.

a *Memoir. sur la respir.* 1738. p.69. *Senac Mem. de* 1729. exp. 47. Inde venter tumet & p. 132.

durescit *Winslow Memoir. de* *b* *Mem. cit.*

Tussis ergo causa est stimulus quicumque , qui aut in diaphragmate , aut in pulmone , & in vesiculis ipsis , aut in bronchi majoribus ramis , aut in aspera arteria , aut in larynge demum hæret , & in imo demum pharynge supra glottidem , etsi aqua eo illapsa potius screatum quam tussim movet. Frequentissima causa est mucus per noctem in bronchi ramis collectus: frequens etiam acre quid non satis notæ indolis, quod oportebat per cutem perspirare , nunc acute repulsum , in pulmonem se conjecit *c*. Nimis frequenter in me ipso eam tussim sensi , quando humidiores , aut certe non satis tepidum in lectum sub prima frigora me recipiebam. In phthisicis calculosa *d* minime rara in glandulis bronchialibus concrementa , pro stimulo sunt , aut ipsum pus. Illapsa atque retenta in bronchio corpora dura pares habent effectus *e* officula , nummi , uvæ acini , spica graminis.

Validas vires inspirationis & expirationis cum tussis jungat , valde defatigat , calefacit , sanguinem incitat. Ad expirationis imprimis vires pertinet , quod in *Salzmanni* observatione , cum

c Ejusmodi tussim descripsit *La Mettrie* obs. de prat. 37. *Ill. Werlhofius* Comm. Lit. Noric. 1733. hebdom. 22. & olim *L. 2. obs. 4. Rhod. C. II. obs. 3. Hippocrates* Epidem. VI. & VII.

d Rejetti tussi ejusmodi calculi *Zacut. hist. med. mirab. obs. 103. Palfyn anat. Chirurg. ed. Ital. T. III. p. 68. D. Sinopei parerg. med. p. 57. Essays of a Societ. at Edimb. T. V. n. 57.*

La Mettrie obs. de prat. 37. *Borell. L. I. obs. 67. Pechlin L. 2. obs. 4. Rhod. C. II. obs. 3. Ruysch thes. I. p. 8. &c.*

e A nucleo *Barthol. Cent. II. hist. 27. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 242. a globulo plumbeo Birch T. III. p. 381. a nummo aureo in pulmonem admissio London Chronicle 1758. p. 296.*

magna pars cranii de vivi hominis capite remota esset, dura mater in tussi elevaretur, ipseque demum falcis sinus *f*, & sanguis frequenter in pleuriticis mota tussi fluere cogatur, quando in vena restagnat *g*. Pulmoni tenero ob distentionem magnam, & vehementem compressionem nocet. Eadem suffocat *h*, quando vehementior stimulus expirationes ita concitat, ut pulmo vix unquam liberetur, quin pressus sanguini de cerebro redeunti resistat.

Cohibetur tussis retento spiritu *i*, suspensa ergo virium expirantium convulsione, ut interim stimuli in organa sentientia impressio evanescere possit. Tollitur etiam percusso demum dorso, forte, quod nervus octavi paris aliquantum pressus de sensus acumine remittat *k*.

Voluntaria cum actio sit, vix per torturam *l* ullam animalibus illatam, extorqueri potuit. Suspenditur ideo cum ægri non bonis rebus, in pleuritide, ob dolorem, quem excitat. Si invitus idem tussit, ob intolerantiam incommodi id fit, cui expediendo anima consensum negare non sustinet, quoties nimium est. Ob eum enim potissimum finem *Natura* asperæ arteriæ interiorem membranam adeo impatientem fecit

f Slevogt de dura matre. n. 50. *l* Albrecht in exper. circa tussim, second Memoire sur les parties irritables Sect. 18. *Pal-lianus* chirurgus Rom. in literis. Semel successit, cum fumo sulphuris, & demum veneno, asperæ arteriæ membranam lacerarem. *Mem. sur la respir.* obs. 47.

g Tulp. L. II. c. 4. Boerhaave &c.

h Verhandel. vander Hollandz Maetschappy T. IV. p. 465.

i Camerar. Memorab. Centur. II. n. 153.

k Schreiber Almagest. p. 362.

stimuli, ut ne aquæ quidem tepidæ mollissimæ & lenissimæ guttulam ferre possit, quin insuperabilis irritatio nos ad tussim cogat. Causa in tenuitate villosæ membranæ, sive epidermidis, & in numero nervorum esse videtur, qui nerveam tunicam adeunt, & utique tum copia tum magnitudine eos ipsos superant, quos intestina accipiunt.

Ob irritationem diaphragmatis cum scirrhus aut abscessu hepatis tussis conjungitur, etsi causa irritans ea via expelli nequit. Similis mali per similem conatum simile levamen anima sperat.

§. XXXVI. *Sternutatio.*

Non valde a tussi sternutatio differt, violentior tamen est, quod stimulus in parte quam pulmo teneriori, & acrius sentiente hæreat. Ipsa quidem actio inspirationem habet maximam, ut una caput & cervix retrorsum rejiciatur. Huic succedit expiratione omnium quæ fieri possunt vehementissima, ut nullus, dum sternutamus, artus firmitatem aliquam retineat. Caput ergo collumque antrorsum curvatur, ut muscoli elevatores thoracis relaxentur, & pectus fortius detrahi queat, & ipsa femora *m* eleventur, atque contra corporis truncum flectuntur. Repetitur eadem actio, quamdiu causa stimulans molesta superest, centies nonnunquam & ul-

m Concutiuntur muscoli Glutæi *Thruston* p. 65.

tra *n*. Perpetua aliquot mensium sternutatio ovisa est. Demum a calcis vapore, ab helleboro, frequentissime repetita.

Stimulus iste non in aspera arteria residet: membranam tamen tenet ejusdem indolis, pariter cutaneam, & cum asperæ arteriæ interiori involucro continuatam, quæ narium interiora vestit, & mihi quidem, frequentissime hoc incommodo auxilio utenti, in anteriori nare, & ad latera septi, summumque lacunar potissimum sedes ejus stimuli esse videtur *p*, neque differt sternutatio a resorbis in eam anteriorum narium regionem pulvisculis acribus nata, neque cohibendæ sternutationis modus, quando angulus oculi ad narem comprimitur *q*, aut fricatur *r* & nervus, ut videtur, eo loco positus, & a quinto pare in nares recurrens *s* comprimitur. Visum tamen est, etiam alio loco fomitem sternutationis hæsisse *t*. Pisum de aspera arteria ejus succussione rejectum.

A stimulo facilius extorquetur quam tussis,

n A calcis vapore in exemplo Hofmanni; at aliud exemplum habet Hildan obs. 24. Cent. I. conf. Eph. Nat. Cur. Cent. III. obs. 47. aliud Cardanus ad aphor. Hipp. p. 587. aliud 13 horarum ab helleboro Smetius miscell. L. X. & simile Boerhaaviius Prax. med. L. I. p. 588. Millies & ultra repetita sternutatio Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs. 141.

o Journal Econ. 1755. Sept.

p Scolopendræ genus ejectum per nares, ex sinu frontali, post multam sternutationem Hist. de l'Acad. 1733. p. 34.

q Bartholin desper. hep. caus. S. II.

r La Motte chirurg. compl. T. IV. p. 316.

s Vid. Ill. Meckel de nervo quinti paris n. 54.

t In septo forte transverso, ut respiratio per solas costas perficeretur Hoadley p. 96.

certe in homine, stimulum autem putes tene-
riori membranæ admoveri nempe narium, quæ
acutius quam in bronchis sentiat.

Frequentior causa, & naturali propior, mucus
est in nare per noctem collectus. Frequens
etiam, nimisque mihi molesta, ab eadem per-
spirationis materia sternutatio succedit, quæ de
sua in cute sede repulsa, nares indicibili v qua-
dam acrimonia sollicitat, quam acrem esse non
dixeris, ferre tamen nequeas. Eadem ab humec-
tatione pedum pene continuo supervenit.

Voluntate sternutatio regitur, etsi ea, ob vehe-
mentiam stimuli, non valde libera est. Scopus
est eodem aeris torrente excitato, qui in tussi
dictus est, everrere id acre aut molestum, quod
nares obsidet; adjuvat, quod a vehementia
concussionis multus mucus, multa aqua in nares
effundatur, quibus humoribus id acre diluatur,
aut inviscetur.

Sunt, sed rari homines, qui pro arbitrio
sternutent x, & actionem a stimulo vulgo nas-
centem solo mentis imperio norint imitari.

Vehementia actionis facit, ut non alio modo
humores universi corporis violentius concutian-
tur, non alio nervi incitentur acrius.

Inde usus sternutatoriorum medicamentorum
ad recreandos homines semianimes y, feminasque
hystericis deliquiis oppressas z. Sanguis in uni-

v Vehementissima sternutatio In febre critica *Home facts*
a calcis vapore *Hofmann. med. p. 205.*

syst. p. 301. 302. & spiritu vini x *Hildan Cent. I. obs. 24.*

Breslauer Samlung 1725. M. Jul. y *L. IV. p. 454. L. VIII. p. 43.*

z *Thruston p. 66.*

versum perinde uti a tussi, vehementer exagitur, ut hæmorrhagiæ a sternutatione excitentur *a*, & mensium maximus fluxus *b*, & mors ipsa *c* sequatur.

In abdomine eadem fiunt, quæ a maximo nixu. Parturienti sternutatio bona *d*. Ut excident secundæ, dandum sternutatorium medicamentum *Hippocrates* suavit.

Periculo, ut omnes violentæ concussiones, non caret. Cæcitatem aliquando fecit *f*, & in hysterico morbo post immensas sternutationes visum vidi amissum, non quidem vitiato oculo, sed convulsiva vi sursum converso, ut iris palpebra tegetur, alba vero inferior pars scleroticæ inutiliter luci opponeretur. Convulsiones sternutationi *g* sæpe superveniunt.

Quæ causa sit, ob quam stimulus in naribus perceptus adeo remotos musculos respirationis cogat in consensum, dudum quæsitum est. Neque fere temperare sibi *h* potuerunt nuperi, quin per nervos hanc totam sympathiam interpretarentur. Nempe nervi narium sunt a quinto pare, certe multi, & maximi *i*. Ejus nervi ramo, etiam a luce irritato, sternutationes succedunt *k*.

a Append. obs. post Schultet armam. obs. 85. Le Dran obs. T. I. p. 348. Kerkring obs. 51. Helwig obs. 28.
b Hildan Cent. III. obs. 58.
c Cardanus l. c. Stella del tabago p. 278. Helwig ibid.
d Aphor. Hipp. 39. Sect. V.
f Dekkers Exerc. p. 22. Hildan l. c. Hagedorn. hist. 55. Cent. I.
g Albert Med. Leg.
h Willis de cerebro c. 28. p. 400. 401. ed. 4. Senac Essais de physique p. 255. Heisterus de utilit. anat. subtil. Kruger de nervo phrenico n. 25. p. 40.
i Ill. Meckel l. c. f. I. Tau tau tau.
k Le Cat des sens p. 232. Jac. de Partibus. Boyle of languid, and unheeded motion p. 264.

Ab eodem quinto pare non quidem antiqui de primo ramo furculi in truncum intercostalem emittuntur *l*. Sed alii tamen de secundo ramo *m*, peculiariter magis naribus destinato, duo furculi ad eum truncum constituendum accedunt. Porro intercostalis nervus cum phrenico *n* nervo in imo collo consentit, cum spinalibus, secundum totum dorsum & lumbos *o*. Habes viam, per quam irritatio, in naribus nata, possit in diaphragma, musculos cervicis, abdominis, & ipsius demum femoris continuari.

Ego quidem nervorum istis elegantibus sympathiis non multum in universum tribuo: huic omnium minimum. Sit irritatio nervi quinti, transeat in phrenicum, in abdominalium musculorum nervum, quem, ut simplicior res sit, unicum ponimus. Qui fit, ut eadem irritatio primo solum phrenicum absque abdominali; deinde eo phrenico nervo prius resoluto, demum abdominalem nervum in motum ciet, non eodem tempore utrumque? Voluntatis opus agnoscas, cujus in cerebro sedes est, & quæ organa sibi idonea nec alia in motum ciet.

Emunctio & ipsa inspiratione fit, quam exspiratio aliquanto major sequitur, sed ea quidem nihil habet convulsivi: finis idem est, ad mitiorem tamen mucum ejiciendum plerumque adhibetur.

l Quæ vulgaris est opinio, quam refutavi in *diff. de vera nervi intercostalis origine.*
m Mekei l. c. *ni*, *zeta*, *pita*.

n T. VI. p. 151.

o Uti vulgo notum est. Confer interim tabulam *Eustachianam XVIII*.

betur. Etiam emunctionis exemplo ostenditur, sternutationem voluntatis esse, quæ sit aliquanto violentior emunctio.

§. XXXVII. *Risus.*

Risus, quantum ad respirationem pertinet, incipit ab inspiratione, quam expirationes aliquæ minores & imperfectæ excipiunt. Quando diutius durat, & in cachinnum erumpit, tunc novæ inspirationes succedunt, cum sua quaque imperfectarum expirationum serie. Tunc etiam risus vocalis est *p*, & glottis arctata sonum facit. Sonus refert literam *a* & *o* in viris, in feminis *i* & *e* *q*. Lenior ille risus, quem subrisum ex analogia diceres, absque respirationis mutatione, unice in ore habitat, cujus labrum inferius elevatur, latera per musculos risorios, buccinatorios & zygomaticos diducuntur, paulumque genæ elevantur, ut intumescant *r*, & oculi aliquantum adductis palpebris connivent.

Organa risus nihil habent ardui: diaphragma imprimis cum musculis abdominis hoc officio defungitur, dum singula in expiratione sursum quassatur *s*, cumque multæ expirationes sibi succedant, alterne adeo cum suis imis costis adscendit idem & descendit, ut in lateribus ipsis manifesta sit succussio.

Causa majorem difficultatem habet. Hoc enim

p Mayom p. 259.

q Hamberger p. 632. 633.

r Conf. Nicolai vom Lachen

p. 27. 28. 29.

s Lower p. 94.

in risu fingulare est, quod idem a morali causa, in qua vix quidquam fit corporei, perinde producat, & a varia etiam nervorum irritatione, absque ulla lætitia, produci possit. Sic in multis hominibus, neque enim omnes hanc ad ridendum pruriginem patiuntur, si cutem labiorum, palmarum, & plantarum, cutem etiam alarum, & denique laterum infra medias costas, leniter; digitis blande tractis titillaveris, insuperabilis risus invadit, non remissurus, etiam maxime nolentibus ridere, donec causa titillans superest. Ad revelationem latentium thesaurorum hac in plantis pedum irritatione in Germania olim, tricennali bello Sueci, deinde emissi a Ludovico XIV. ad convertendos hæreticos milites usi sunt.

Inter symptomata hysterica frequens etiam risus est, absque causa, quæ in animam operetur, ex aliquo proculdubio in nervos agente stimulo s*.

Antiqua denique fama est, ab ipso repetita Hippocrate t, nonnullis etiam nuperioribus v exemplis confirmata, a diaphragmate vulnerato, aut inflammato x, risus oriri, quem Sardonium vocant, quod ex herba Sardoa olim legamus

s* Ex lapsu in sinciput risus *Plin. L. XI. p. 629.*
Binninger Centur. III. obs. 100. v Vulnus septi transversi fun-
 t In Tychone *Epidem. V.* nestum cum Sardonio risu *Art*
Sect. 34. cui telum diaphragma *de faire les rapports p. 147.*
 vulneravit. Ab ictu circa renes *Convulsivus Journ de Med. 1759*
 traditum est risum factum *Ari-* &c.
stoteles part. anim. L. III. c. 10. x Ab inflammatione septi
 Mortem cum risu faciunt vul- transversi risus *Eph. Nat. Cur.*
 nerati in præcordiis gladiatores *Dec. ann. 1. obs. 22.*

frequenter subortum fuisse, cujus herbæ nunc memoria periit. Non audio cum risu periisse milites, quos Oenantes succo viroso radices nuper in Corsica insula extinxerunt. Diaphragmati inflammato & læso certissima testimonia sunt neque risum supervenisse neque singultum. Optimus olim *Ithius*, quo cariores & gratiores discipulum nullum habui, cum ex morbo acuto interiisset, diaphragma inflammatum, abscessu etiam erosum habuit neque ullus risus præcesserat.

A calculosa materie convulsiones, & risum Sardonium natum legi, nempe eam faciei conditionem, quæ in risu obtinet x^* . Cæterum herbam Sardoam veterum, ob dulcedinem suam & imprimis ob folia apii similia y eo referrem.

Penitus alia in mente risus origo est, effectus in corpore idem. Oritur is risus fere ex inexpectato concursu duarum idearum, quas nunquam sperassemus concursuras; ut præterea earum idearum aut altera, aut utraque, aut earum conjunctio aliquid absurdi y^* habet, quod contemptum nostrum ciet, non tamen absque lætitia. Risum enim movet, si vir in dignitate constitutus humilem servuli personam sustinuerit, & perinde, si idem servulus regis adfectaverit majestatem. Risum funestum *Chrysippi* movit z , quod asini idea cum remotissima ab eo animale ad computationem invitatione convenisset. Mori-

x^* *Verhandel der holl. Maatsch.* p. 560.

XVI. p. 2.

z *Diogenes Laertius* similia de

y *Suidas Kusteri* T. III, p. 288.

Philemone habet *Valerius Ma-*

y^* *Wolf psycholog. empir.* *ximus* L. IX. c. 12.

bundus in risum erupit Pontifex, qui simiam, vilissimam bestiam, triplici illa supremi sacerdotis thiara indutam videbat *a*. Quare nunc muscoli faciei, diaphragmatis & abdominis consentiant, ad sensum nostrum absoni idearum vinculi exprimendum, id nemo vel susceperit dicere: cum neque nexus ideæ cum respiratione, neque scopus aliquis in enato inde risu sit, quo incommodum avertatur, uti quidem manifestus in prioribus animæ finis fuerat.

Neque magis suscepero exponere, quare a nervorum cutaneorum blanda contrectatione, palpatione, & razione, in diaphragmate & musculis faciei & abdominis ejusmodi motus superveniat.

Quoties in ipso diaphragmate & lumbis nervi violantur, possis aliquanto facilius intelligere, nervos eo loco positos convelli, & una cum ipsis sua organa in motum cieri.

Effectus risus plerumque salubris est, cum sit ad expediendum de liene, & hepate, & universa portarum vena lentius meantem sanguinem aptissima concussio.

Alius effectus est inspirationis diutius durantis absque plena expiratione, dum interim arctata glottis aeris etiam ab istis parvis expirationibus emissi vix transmittit quidquam. Ergo sanguis in pulmonem plurimus convenit, neque expeditur. Inde replentur vena cava superior, &

a Schelhammer affect. anim. p. 230.

facies tumet livetque *b* , & cerebrum sanguine retento turgescit , & nonnunquam ex ea sola congestione homo suffocatur *c*. Si nunc distento pulmone præterea illa a diaphragmate concussio accesserit , poterit abscessus rumpi , felici nonnunquam eventu *d* ; sed poterunt etiam vasa in pulmone frangi *e* : poterit etiam a solo congesto in dextra vasa cordis sanguine , neque de cerebro succedente , apoplexia fieri , & mors a coniecto in venas sanguine sequi , eo magis , quod succussiones illæ expiratoriæ sanguinem de aorta arteria versus superiora repellant. Mors a congesto in venas sanguine *e**. A risu aneurysma. Vulnus arteriæ a risu funesto eventu recruduit.

b *Parsons physiognom.* p. 46. *Boerhaave prælect.* ad n. 635. J. R. M.

c *Eph. Nat. Cur. ann. IX. X. obs.* 120. Sanguis inde in vena cava & sine pari plurimus. Mortua ex risu vetula *Joubert du ris* p. 347. Suffocatio ex ea causa *Engelmann verhandel. der hollandz. maatschaapp T. IV.* p. 465. *Zeuxis* inter ridendum interiit , cum festivam vetulæ a se pictæ imaginem contempleretur *Festus* in voce pictor. Inter comica spectacula homo exspiravit , de quo *Linden physiol.* Exempla collegit *F. Lupichius* in *diff. de risu* , & *Laurentius Joubert du ris* p. 232. 233.

d In pulmone pontificis exempto , quem excitavimus , & puellæ (*Slevogt vomicar. exempl.*) Alio ex abscessu *Erasmus* convaleuit , cum literas obscurorum virorum legeret :

iterum alio , ex naribus fluente pure *Binniger Cent. III.* obs. 46. Aliud *Breitingeri* exemplum est apud *Scheuchzerum* in *nov. litt. helv. ann.* 1709. Sanguis etiam ex risu feliciter rejectus fuit ad tres libras qui per vulnus in pectoris cavam effusus fuerat *Pechlin obs.* 28. L. III. Ridendo spina ex gutture rejecta *Castelli lexic.*

e Enormis inde in vulnere pulmonis hæmorrhagia *Schellhammer de animi affect.* p. 237. & hæmoptoe , ulcusque pulmonis *Zacut. prax. hist. L. II.* p. 340. Ex risu pleuritis *Act. Hafn. Vol. II. n. 96.*

*e** Mortes ex titillatione *Kloekhof morb. anim.* p. 53. *Joubert du ris* p. 131. *Robinson of the spleen* p. 148. Ex eadem causa Epilepsia *G. v. Swieten Comm. T. III. p. 402.*

Etiam id in risu malum est, quod ipse se propaget, & qui vehementer riserunt, convulsis respirandi organis, invitissimi ridere cogantur *f*.

Aliquod etiam jus nocendi a nervis habet, quos vehementer dum concutit, utique debilitat. Titillatio pedum omnes vires tollit subito *g*. Veneream adeo tentiginem delet. In nervorum vulneribus risus periculo plenus est *h*. Non crediderim, verum a lætitia risum in brutis animalibus reperiri, etsi sunt qui aiant *i*: Homini ita ingenitus videtur, ut puer inter urfos enutritus, cum non loqueretur, tamen rideret *k*.

§. XXXVIII. Fletus.

Voluptas dolori, fletus risui adfinis est, certe faciei ductibus, qui nonnunquam ægre in utroque distinguuntur *l*. Labium tamen inferius magis a dentibus deducitur, frons caperatur, & supercilia descendunt, neque foveola illa risorium inter & zygomaticum musculum excavatur, & cum fletu oculi magis comprimuntur, & frequentiores, atque fere inseparabiles lacrumæ conjunguntur, cum risu aliquanto rarius. In respiratione multæ etiam similes utriusque adfectiones sunt. Ab inspiratione majori fletus incipit, huic expirationes succedunt, imperfectæ

f Parsons l. c.

g Hildan Cent. I. obs. 23.

h F. M. Helmontius paradox. discurs. of man p. 76.

i Eph. Nat. Cur. Dec. II.

ann. V. VI. append.

k Schelhammer de voce p. 20.

l Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 8. obs. 176.

& crebræ , diaphragma nempe alterne adscendit & descendit celeriter *m* : eas sonora demum & major exspiratio terminat , quam continuo profunda inspiratio excipit , sive suspirium.

Vires , quæ risum , & quæ fletum faciunt , adeo eadem sunt , & si vehementior fletus fuerit , ut est nonnunquam in pueris , similis inde anxietas *n* sequitur. Plerumque tamen omnia in fletu moderata sunt magis , & plus juvat totus , quam nocet. In ipsa tristitia pondus illud , quod respirationem obprimit , levatur a fletu , & pueris clamores atque vagitus respirationis vires , sanguinisque circuitum expediunt , neque novi , ut risus solet , subito fletum nocuisse *o*.

Causa vix unquam alia est , quam tristitia *p* , aut certe gaudium , cum tenero animi adfectu conjunctum. Et nuper qui de utero prodeunt pueri , ex dolore & molesto per vaginam transitu , atque incommodis novi elementi , potius flere videntur , quam ex respirationis vitio , quam bonam esse oportet , ut in fletum vocemque erumpere possit. Ex corporis morbis nunquam fletus oritur , neque enim hystericus fletus absque tristi adfectione est. Anxietas & circuitus sanguinis difficilior nunquam fletum faciunt , etsi ita varii scripserunt. Neque in peripneumonia fletus , neque in asthmate , sed ne in morte quidem est.

m Schreiber l. c. p. 8. Nicolai vom Weinen p. 122. Schaarschmidt Berlin. Nachricht. 1740. n. 46. Walther de erubescere p. 4.

n Schreiber n. 91. Nicolai n. 121.

o Lancis. de corde & aneur. p. 113.

p Nicolai n. 64.

Animalia varia, & cervi potissimum, flere & lacrumare dicuntur.

Lacrumarum fluxus rectius cum oculorum historia describitur.

§. XXXIX. *Singultus.*

In singultum fletus non rarissime desinit, ut eum ipsum adpareat respirationis potius esse, quam ventriculi adfectum. Plerumque eadem causa, quæ ad singultum stimulat, in œsophago *q* & ventriculo residet, ut tenacioris cibi præceps deglutitio, hæc infantibus familiaris, aut irritatio ventriculi ex concepto ciborum magmate, aut a pulveribus crassioribus, neque minute contritis *r*, aut alio ejusmodi irritamento *s*, aut a venenis *t*, aut a frigida *v*, aut ab œsophago per vertebra[m] undecimam compresso *x*, aut a ventriculo in vulnere incluso *y*, aut ab ejus abscessu *y*^{*}, aut a mechanica ventriculi externi *z*, internive, qua gulæ propior est *a* pressione, aut a pancreatis scirrho, qui pylorum *b* comprimebat, aut a coli intestini vulnere *b*^{*}, aut a stomachi inflammatione *c*, qualem octo

q A cibo in œsophago hærente
Tabor p. 240.

r *Viridet du bon chyle* p. 547.

s *Bruning* exp. I. a pilis deglutitis: ab excutia intrusa, exp. 4.

t *Oenanthe succo viroso Bruning* exp. 3. Ab hypercatharsi
Portefaix p. 18. 19.

v *Viridet* *ibid.* *Apperlry*
p. 166. conf. multa exempla
ap. Portefaix de singultu p. 17.

x *Scholzius Centur. II. obs.* 6.

y *Bruning de singultu* exp. 8.

y^{*} *Υπερ* 202. 203. Pure per
alvum decedente idem quievit.

z *Idem* exp. 6.

a *Idem* exp. 7.

b *Viridet* p. 546.

b^{*} *Phil. Transf.* vol. 49. P. I.
p. 36. 37.

c Confer ad vitia ingestorum,
& venena *Portefaix* p. 18.

dierum funestum singultum vidi , cum medicus repetita ex antimonio emetica , septies vel octies iterasset : in quo viro perinde ventriculi nerveam membranam sanguine in cellulosam telam suffuso inflammata vidi , ut in canibus solet , qui arsenicum sumserunt : quem certe post casum omnino etiam vehementiorem vomitum ab antimonio excitatum reformidavi. Par fere causa singultus fuit in dysenteria , in gangræna intestinorum , a ventriculo a protracto epiploo lacescito & tamen quandoque a mero organorum respirationis vitio idem singultus successit : ut a diaphragmatis inflammatione *d* , ex costa depressa *e* , a pure in pectus effuso *f* , a luxata colli vertebra *f**.

Denique frequentissime singultus absque evidente aut ventriculi morbo , aut instrumenti spiritalis , mortem proximus præcedit ; ex nervorum vulnere *g* , medullæ spinalis irritatione *h* , ex hysterico malo , ex veneno venæ injecto *k* , ex funesta materiæ miliaris ad interiora corporis & vitalia organa retrocessione *l* , ab ictero , ex abdominis vulnere.

Quomodo a nervis ad diaphragma propagetur , facilius videtur intellectu , cum convulsiones distantium partium per nervos frequentissime

d *Barrere observ. anat. ed. de singultu p. 15.*
1753. p. 178. Perforatum tamen *f** *Hofmann apud Bachmayer*
absque singultu *Idem p. 177. de singult. Singultus inde qua-*
Ægre , neque nisi prope ven- tuor annorum.
triculum facta irritatione , sin- *g* *Imbert duodecim quæst.*
gultus excitatus *Bruning exp. II Monspel. 1749. p. 7.*
e *Albertus in diff. de singultu h* *Bruning exp. 10.*
n. 5. *k* *Idem exp. 9.*
f *Brunnerus apud Borellum l* *Portefaix p. 19. 20.*

cieantur. Qua ratione vero ab œsophago vel ventriculo ad diaphragma vitiosa contractio transeat, videre oportet. Si fasciculi carnei a septo ad ventriculum omnino irent, quæ vir Ill. descripsit *m* quærenti crederemus satisfactum esse. Cum vero eos fasciculos nuperior principum incisorum industria non confirmaverit, & forte optimo feni vasa imposuerint *n*, quæ a phrenicis ad œsophagum eunt, problema aliter solvendum erit.

Nunc quidem gula inter carnes diaphragmatis ita transit, ut decussatis fasciculis carneis inferiorius & posteriorius comprehendatur *o*, antèrius plerumque tendineis lacertis terminetur; eademque ab iisdem fasciculis per inspirationem contractis stringitur *p*.

Est ergo inter gulam & diaphragma ejusmodi vicinia, ut veli musculosi motus in eum carneum tubum potestatem exerceat. Erit utique etiam ejusmodi nexus, ut corpus in gula, aut in ventriculo hærens, diaphragma irritet, & ipsa denique concussio, ventriculo & gulæ innata, diaphragma sollicitet. Forte & nervi aliquid possunt, qui ex eodem plexu hinc cum phrenica arteria ad diaphragma eunt *p*^{*}; inde, alias dicendi, cum cœliaca ad ventriculum *q* eunt. Si aliquis in nervis consensus est, erit in proximis, quorum communis origo vix paucis digitis a sede convulsionis distat.

m Winslow traité des muscles
n. 670.

n T. VI. p. 156. & 136.

o T. VI. p. 136.

p T. VI. p. 144.

p^{*} T. VI. p. 146.

q In L. X. descriptos.

Tutius nunc de singultus causis modoque definire licet. Ergo incipit a valida & subita inspiratione *r*, quam a diaphragmate cieri hic præterea abdominis conspicuus tumor confirmat. Deinde aer de gula *s* exprimitur, dum interim glottis *t* constringitur, ut semper solet, quoties buccæ aut de ventriculo exit, aut in ventriculum descendit. Ita refoibtus aer ex viribus diaphragmatis in glottidem constrictam impingit *v*, sonitumque eum producit, qui in singultu notissimus est, & post sonum succedit exspiratio, ita certe vulgo docetur, nescio quid enim mihi superest obscuritatis. Apparet, cur a fletu, cur ab irritatione varia diaphragmatis *x* singultus fiat. Ejus enim musculi est quædam convulsio. An una descendit œsophagus *z*? Videtur, nam inter inspirandum idem deorsum trahitur *a*. Imo vero Cl. *Störzel* putat in singultu œsophagum manifesto moveri, & ventriculum fursum trahere *a**. Sed repugnant phænomena diaphragmatis descendentis cum quo non potest non œsophagus descendere.

Lentior equidem in hoc motu violentia est, ut duæ etiam, aut tres inter duos singultus respirationes intercedant *b*: idem tamen habet

r *Portefaix d. singultu* p. 11.
s *Hofmann* ib d. Eum tamen
aerem sonum producere non
crediderim.
t *Tabor* p. 240.
v *Portefaix* ibid. & p. 12.13.
Tabor l. c. *Tschudi* de singultu.
Störzel de singultu.

x Diaphragma organum est
singultus *Portefaix* l. c. n. 17.
Limprunner de paraphrenitide
p. 29. *Tschudi*.
z *Bruning* ibid.
a *T.* VI. p. 143.
*a** l. c.
b *Viridet* l. c. p. 545.

vitium, quod tussis, & aliæ respirationis organorum convulsiones, ut semel incitatus durabilis superfit. Vidi aliquot dierum *c* in nobili viro, cum causa in putrido magmate ventriculum obsidente hæere videretur, rheo demum barbaro superatum & opio. Diuturniorem alii viderunt *d*.

Eundem suspenfa respiratio fere tollit *e*, omnino uti tussim, aliaque ejusmodi vitia, suspenfa respiratione compefcimus. Dum nempe jubemus irritata organa quiescere, impressio illa stimuli sensusque minuitur, qui minime decrefceret, si continuo motu ea organa agitarentur.

Finem prævisum non habet, & ad motus vere involuntarios, convulsivos pertinet, qui in organis maxime arbitrariis notissimi se efferunt, quam primum major, ad certam mensuram stimuli est potentia. Ad voluntatis satellitium utique pertinent, quicunque in brachio muscoli reperiuntur, & tamen iidem, irritato nervo suo, convelluntur violentissime.

Si voluntarium sibi singultum fuisse *Lowerus* scripsit *f*, & *Franciscus Sylvius g*, alique clari viri animæ imperio eam actionem tribuerunt *h*: id quidem omne ad imitamentum singultus refero, quod utique ex arbitrio pendet; sonum nempe singultus similem producimus, quando

c Etiam quatuor dierum vidit *Aristophanem*, *Aristoteles posth. Marcellus Donatus hist. med.* 33.
mir. p. 319.

d Quatuor annorum *Bartholinus Cent. II. hist.* 4.

e *Eryximachus* medicus apud

f *De corde* p. 94.

g *Prax. med.* L. I. c. 23.

h *Tabor l.c. Sauvages pathol.*

Edit. III, p. 40.

glottide angusta lente inspiramus, deinde sensim ad incitatum inspirationem, & denique ad velocissimam transimus *i*.

§. XL. *Vomitus.*

Leviter hanc actionem hic tango, quæ sit potissimum ipsius ventriculi *k*. Non tamen, totum oportet a respiratione separare *l*. Certum est enim ventriculum a diaphragmate agente deorsum urgeri *m*, certum est denique a concussio diaphragmate, repetitis ictibus *n*, in vivo animale, ejecta fuisse, quæ ventriculo continebantur *o*, cum interim, pariter ut in nixu, vires suas muscoli abdominis cum septo transverso conjungerent *p*. Solius enim ventriculi etiam summa irritatio raro vomitum producit *q*. Nixus nempe est, sed id cum tussi commune habet, ut diaphragma repetito descendat, & ventriculum quasset, dum interim muscoli abdominis anteriorem ejus receptaculi faciem ad posteriorem compellunt. Finis est remissio diaphragmatis, & valida, ab iisdem musculis effecta, exspiratio, cum qua cibi prorumpunt.

i Portefaix p. 13.
k Conf. Lieutaud *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 226.
l Idem p. 230.
m Exp. 32. 33. 34. 37. 44. 54. 55.
n Schwartz de vomitu n. 9. 11.
Purcel of vapours p. 47.
o Schultze de emesi exp. 2.
p Idem ibid. De Man de na-

tur. hum. p. 21. 22. p. 100.
 Schwartz n. 11. Senac l. c.
 Petit *Mem. de chir.* T. II.
 Hinc boves non vomunt, quibus ventriculus a musculis obliquis abdominis minus comprimitur
Sauvages memoir. p. 20.
q Swieten T. II. p. 253. Senac p. 116.

Effectus iidem, qui nixus, vehementissimus nempe labor, incitatio circuitus sanguinis maxima *r*, pulsus major *s*, congestio ad cerebrum *t*, rubor faciei, rupta vasa, hæmorrhagiæ incitatae *v*, quassatio summa viscerum abdominis, evacuatio hepatis, lienis, renum etiam, & ureterum. Sed ea olim pro dignitate repetentur, cum [ad eam] mei operis partem pervenero.

S E C T I O V.

RESPIRATIONIS UTILITAS.

§. I. Unde Respirationis sit necessitas.

Problema Harveianum.

UANDO quidem de utilitate respirationis disputare oportet, ordo quærendus est, quo hæc tractatio commode procedat, multis enim nimis hypothesibus & litibus impeditur. Summa ergo utilitas est, absque qua nē vita quidem hominis consistit. Ea diversis modis considerari potest, quos sæpe video confundi. Nam primo, in adulto homine respirationis necessitatem definivimus, quæ in est inevitabili illa dilatatione *x*,

r Sylva de la saignée p. 146. Sylva l. c.
 147. *v* A vomitu rupta vincula, &
s Robinson of discharges sanguis ex venæ incisæ vulnere
 p. 113. Obs. of a Societ. at London iterum prorupit Woodward
 p. 259. cases p. 22.
t G. v. Swieten T. III. p. 266. *x* p. 101. 102.

& compressione alterna y pulmonum , absque quibus nequit sanguis per id viscus commeare , neque ad aortam tantum ejus venit quantum ad vitam sustentandam venire oportet.

Alia est causa necessitatis , quæ facit , ut infans utero exclusus egeat respiratione. Certum est per nostra z , & per magnorum dudum viro- rum a experimenta , fetus nuper ex utero matris excisos , inque amnio relictos , mediis in aquis vivere b , & hiare ore c , & moveri , neque perire , nisi eo tempore , quo alioquin credibile fuerit , tenerum animal , minimumque habens proprii caloris , aliunde periturum , post aliquot nempe horas , aut altero demum die d. Deinde , si de rupto amnio fetum exemeris , inque aerem liberum posueris , hiabit idem , aeremque paulo promptius captabit seriusve e. Id si fecerit , facilitatem una amittit , qua sub aquis vixerat , & continuo perit , quam primum aeris usura privatur , ita certe relatum est. Id problema *Harveius* f proposuit , & varii viri variis modis conati sunt solvere.

Primum , non oportet miraculum augere supra modum. Non subita , neque unica respiratione facilitas illa amittitur , qua fetus aere

y p. 45. seqq.

z *Mem. sur la respir. Exp.* 126 -- 130.

a *Hippocrates Epidem. VI.* n. 5. *Vesal. p.* 824. *Plater quæst. phys. p.* 259. *Blegny Zodiac. Gall. ann. I. M. Januar.* *Birch T. II. p.* 232. 233. *T. III.*

p. 404. *Mobeius* in *diff. inaug.* obf. 13.

b *Cor pulsare Nymmann de vit. fet. p.* 31.

c *Exp.* 126 -- 130. *Plater , Birch , Vesal &c.*

d *Birch T. III. p.* 404.

e *Mem. sur la respir. l. c.*

f *De generat. anim. p.* 263.

caret. Vidi catellum , qui semel respiraverat , & cujus pulmo in aqua natavit , tamen per dimidiam horam in tepida vixisse *g*. Eodem tempore catellus vixit , quem , postquam respiraverat, *Buffonius* lacte merfit. Vidit *Bohnius* *h* , & bis vidit , fetum , qui respiraverat , & vivebat , aliquot horis sub ipsa terra , absque aere vixisse. Sed etiam broncho intercepto nuper nata animalia vivunt , & totis 24 horis *i* supersunt. In avibus ostendimus , etiam post plusculas respiraciones pulmonem ne natare quidem , non adeo continuo mutari *k*. Denique oportet repetere , non fetus solos , sed nuper etiam nata animalia , diutius vim vacui ferre , atque adeo esse posse absque respiratione *l*.

Si lentius hæc in lucem novissime edito animali mutatio supervenit , facilius utique intelligitur. In fetu pulmo minimus est *m* , brevissimus , & in exiguo thorace continetur. Eum enormis hepatis moles comprimit ; etiam thymus aliquam partem tenet tantilli pectoris ; aliam aqua , quæ fetui in pectore multa est *n*. Quare minima *o* pars sanguinis per pulmonem transit , cum longe major per foramen ovale , perque ductum

g l. c. Exp. 128.

h *Infanticid.* p. 79.

i *Senac* p. 413.

k *Sur le poulet* T. II. p. 121.

l *Boyle* , *Mery de la circulat.* p. 57. *Senac* l. c.

m *Pechlin de aer & alim. de-
fect.* c. 8. conf. rationem pulmo-
nis fetus ad pulmonem adulti

in numeris p. 29. Quam
parvus in avis pullo fit ; vide
Mem. sur le poulet T. II. p. 118.

n T. VI. p. 196.

o *Sauvages Embryolog.* p. 21.
Æstimavi ad partem totius san-
guinis minorem , quam quarta.
Ita sequitur ex *Fascic. Icon.* IV.
p. 11.

ductum arteriosum ex dextris cordis caveis in sinistras committit, & pulmones prætereat.

Quando nunc animal respiravit, & pulmonem suum aere distendit, non quidem continuo aut ductus arteriosus clauditur *p*, aut ovale foramen *q*, plus tamen sanguinis per inflatum pulmonem transit, per experimenta *r*, quæ alio loco repetimus, & transit facilius. Dilatantur ergo pulmonalis arteriæ rami, & sanguini minus resistunt, quem cor dextrum emittit.

Si plus transit sanguinis per nuper exclusi animalis pulmonem, mersum idem sub aquas experietur partem ejus incommodi, quod etiam adultus homo experitur *s*. Nempe ea pars sanguinis, quæ per arteriæ pulmonalis dilatatos ramos nunc recipitur, & quæ non recipiebatur in fetu per eosdem ramos, minus patulos, ea nunc portio non potest per pulmones circulum obire, restagnabit adeo in arteria pulmonali, in ventriculo & auricula cordis dextri lateris, eritque suffocatio, sed in parte pulmonis. Cum vero celerrime pulsus sibi succedant, etsi ea portio non est maxima, cum tamen continuo & in singulo pulsu novus sanguis in ramos arteriæ pulmonalis adveniat, quem id viscus non transmittit, necesse est denique animalculum suffocari. Peribit autem eo citius, quo magis per validas & multas respirationes arteriarum pulmonem adeuntium ostia dilatata fuerunt: peribit

p T. VI. p. 263. 264.
q Fascic. citat.

r p. 34.
s p. 37.

eo tardius , quo pauciores fuerint respirationes , & dilatatio minor.

Si *Harveio* post unicam respirationem animalcula aeris perpetui ita indigere visa sunt *t* , ut ne eo quidem adeo brevi tempusculo carere possent , casui eam nimis celerem degenerationem pulmonis tribuerim. Neque certe sperarem , solutionem invenire problemati , si adeo subita mutatio vere observaretur.

§. II. *Necessitas primæ respirationis.*

Puer , dum per matris vaginam *v* transit , secundum idoneos scriptores incipit respirare ; vocem enim , quam primum de natura matris exit , solet proferre , neque ea vox , quæ plerumque vehemens est , primæ respirationis videtur effectus esse. Respirat certe animal , quando de matre solutum est , aut incisoris manu de amnio eximitur *x* , respirat & in ipso ovo pullus , & paulo post exemptus , dum in ovo pars animalis hæret , aeremque captat avidus *y*.

Quæ causa sit hujus cupidinis , qua fetus nunc demum ignotum elementum adfectat , quæ in eo novo pabulo sit ad vitam necessitas ,

t Post decem minuta , cum ligata fuisset aspera arteria *Birch* T. II. p. 232. 233.

v De ea lite , & an fetus in vagina respirare possit , an demum aerem capiat , quando totus de matris corpore exiit , alias inquiremus.

x Boyle *exper. phys. mech.* p. 41. *digress. de util. respir.*

Mem. sur la respir. Exp. cit.

y *Mem. sur le poulet obs.* 255. 256. 260. Clamare nondum rupto ovo *Bertier physiq. des corps animés* p. 224.

ut absque eo vita superstes esse nequeat: dudum equidem est quæsitum: augetque difficultatem universi regni animalis consensus. Neque enim solus homo respirat, quam primum de matre sanus secessit, ut vagitum accusare possis z, sed pariter animalia minime vocalia, aut muta demum, aerem captant, quæ non omnia possis credere, unice ad quirittandum respirationem moliri. Ita neque fæcum alvi irritationem tanti fecerim a, quæ certe in ave nullius sint momenti, neque diaphragmatis a nescio quibus humoribus irritationem b, nam etiam avis respirat, cui nullum diaphragma est.

Neque mechanice crediderim pondus aeris in fetus vacuum pectus c sibi viam aperire, qui ostenderim, dum languet, non respirare nuper natum animalculum: neque enim is languor ponderis necessarium effectum moraretur.

Subtilem illam viscerum abdominis a diaphragmate e dilabentium recessionem, quæ eum musculum liberet, iterum non explicat respirationem avis, quæ & plicata in ovo respiret f, & diaphragma non habeat.

A ventriculi cordis dextri majori extensione g, a capite extenso, collo educto, arteria aspera dilatata, a nixu fetus ad contrahendos omnes

z Quæ mea conjectura fuit
Comm. ad Prælect. Boerb. T. V.
P. 2. p. 464.

a Thruston p. 96. 97.

b Pitcarn. in diss. cit. Croeser
ontwerp. p. 12.

c p. 2.

e Roukema in scriptis Aan-
merkingen p. 19. &c. contra
Idema Wierdsma apud B. Idema
tusscheninspraek p. 22.

f Exp. nostr. 260.

g Nicolai von der Einbil-
dungskraft p. 65.

suos musculos edito aut alia ejusmodi causa, cujus testimonia desideres, aut cujus porro causam necesse sit inquirere, nolim adeo necessariam actionem novi animalis deducere.

Soli etiam casui quadrupedum, aviumque vitam committere nolim, ut motui alicui temere ex sensu incommodi facto hiatus oris committerem, vitamque pene universi generis mortalium ex debili quasi fune suspenderem.

Oportet autem ejusmodi causam invenire, quæ æque late pateat, ac ferarum spiritalia secula, si *Lucretii* vocibus uti licet. Vidi, aliique clari viri viderunt, mediis in aquis catulos hiare *b*, & pariter diu ante respirationem constantem in avium pullo morem esse *i*, quo diducto rostro, etiam exserta lingua *k*, captat quasi ignotum bonum, cibusne fuerit an aer. Conatu etiam aliquo animalculum cæsareo partu editum respirat, adductisque cruribus, & capite depresso *l*. Præterea fetus in lucem editus eo citius respirat, quo fortior fuerit: quando languet, aliquo neque minimo tempore absque respiratione perdurat *m*.

His computatis, nihil mihi promptius videtur, quam credere, fetum ideo respirare, quia eundem dudum sibi familiarem nixum edit, quo in amnio sua alentem humorem absorbsit, postquam & in homine, & in animalibus mihi notis aliquamdiu, aut ob ruptam amnion, aut

b Conf. p. 143.

i *Mém. sur le poulet* T. II. p. 129. &c.

k l. c. obs. 256.

l *Sur la respir.* p. 343.

m p. 2.

ob inanitum *n*, pabulo caruit. Non tango celebrem quæstionem, quam a nupero Cl. viro video renovari. Sed certe, quin pullus albumen in ovo deglutiat, post mea experimenta *o*; quin in quadrupedum genere aqua, in qua fetus natus, cumque ea pili *p*, & propriæ fæces in ventriculum descendant, post exquisitas aliorum Cl. virorum adnotationes dubitari nequit, neque ipse Cl. vir, qui contra nostram sententiam scripsit, diffitetur, amnii liquorem se in animalium ventriculo vidiſſe *q*. Id quidem vitio factum persuadetur, sed perpetua in pullo constantia albi & albuminosi coaguli, quo ingluvies, & ventriculus ipso in ovo plenus reperitur, non videtur ad violentiam refugienti speciem veri permittere.

Si animal in utero deglutit, si idem nixus extra uterum editus aerem invitat, & haurit, crediderim causam inventam esse, quare animal in lucem editum respiret. Cibum quærit, in quo natabat, aerem invenit, in quem se nunc demersit. Cæterum non excludero quiritationis molimina, animalculi per difficilem viam, multam post pressionem, ex calido utero mollique, in novum elementum, frigidum, inque terram, fulcimenque quodcunque, multo quam matris uterus durius, elapsi. Certe homo, & pleraque animalia, non unice vocem, quando de matre separantur edunt, sed querulam,

n In avibus *Mem. sur le pou-*
let p. 16. 17.

o Ibid. p. 129.

p *Malcolm Flemmyng. philos.*
transf. vol. 49. p. 257.

q *In Satur. de submers.*

testemque ejus, quod patiuntur, incommodi.

Quod animalia a prima respiratione vivida fiant, exque suo languore fuscitentur *r*, per multa & bona experimenta, quod cor, quod absque motu fuit, nunc micet, id pertinere videtur ad expeditum pulmonem, & experimenti *Hookiani* efficaciam. Solus inter catulos cæsareos robur demonstravit, qui respiraverat *s*.

§. III. Cur omnia pene animalia aere egeant.

Tertia quæstio, quæ huc pertinet, est de illa adeo a vita ipsa inseparabili necessitate, quæ in aere est, ut absque eo pene nullum animal *t*, planta nulla vivere queat. Certe ne acari quidem casei absque aere vivunt *v*, eoque elemento exclusi continuo intereunt *x*, iidemque aere reddito moventur. Vix ullum est animal, in quo non viæ sint cognitæ, per quas aer in intima recipitur. Vermes, etiam aquatici, suos habent a Cl. *Adansonio* toties repetitos bronchos *y*. Musculi alternis vicibus cum aqua aerem & respirant, & rejiciunt *z*. Sic universa animalia quæ in testis vivunt. Pediculus aerem ducit & expellit vicissim *z**. Insecta omnia sua habent

r Berger de respir. p. 34.
Hales veget. stat. c. 9. L. a Capoa delle moffette p. 62. &c. Giorn. de lett. suppl. T. III. p. 113.

s Taglini de aere p. 345.

t Senac T. II. p. 234. *Hist. de l'Acad. 1717. p. 28.*

o Boyle digress. de util. respir.

x Beccher phys. suhter. p. 146.

y Hist. natur. du Senegal pref. L. III. L. IV. & p. 220. &c.

z Lister conch. bivalv. p. 8.

In sepia Swammerdam p. 886.

In mytulo Mery Mem. 1710. p. 425.

*z** Swammerdam bibl. nat. p. 70.

stigmata *a*, per quæ propriæ aereæ arteriæ in ima corpora subeunt, aeremque introducunt universasque corporis partes adeunt. Hinc, oleo oblita *b* intereunt, quo stigmata inviscantur, paucissimis exceptis, quorum vita in aqua *c*, aut in media terebinthina *d* superstes majorem olei patientiam poscere videtur. Etiam chrysalides ab oleo necantur *e*. Sed ne plantæ quidem, & vel simplicissimus situs, absque aere nascuntur *f*, aut crescunt *g*. De polypis utique aliisque animalibus perpetuo sub aqua viventibus, simplicissimis corde destitutis non adfirmavero, spirare, sed vermes, mollusca, insecta, quadripeda, aves respirant, & neque pisces absque renovato aere vivunt.

Exceptiones raræ sunt. Dactylos *h* equidem

a Etiam in pediculis & vermibus aquaticis stigmata vidit p. 22. Reaumur *Memoire* T. I. p. 401. Malpigh. de bombyc. eximius noster Bonetus *insec-* p. 13. Tyson *Phil. Transf.* n. 44 tolog. p. 211. de ephemero.

b Theophrastus *caus. plant.* f Limb tribus annis absque L. VI. c. 5. (nempe oleum fusu fuit, cum aer arceretur gere) Plinius L. XI. c. 53. Boyle *hist. of air* p. 204. *Swenska Wetensk. Acad. Handl.* g Du Hamel *physique des arbres* T. II. 1745. p. 258. de bombycibus.

c Eruca aquatica Viri Nob. h Astruc *hist. natur. du Languedoc* p. 561. conchasque Keisler it. II. p. 845. Arnobius apud Garmann *Oolog.* p. 145. Cardan *Lionnet insecto theolog.* p. 128. variet. p. 176. Pareus apud Astruc l. c. p. 563. Guilandinus (de ranis rubris in saxo rubro Tolosano repertis) de papiro T. VI. p. 393. p. 7. Agricola de animal. subter. p. 72. Plot *natural history of Staffordshire* p. 247. Bremisches *Magazin* T. I. p. 590. leqq. *Extrait des Journaux* 1773. Jan.

d Eruca gallæ pineæ C. de Geer *Mem. sur l'hist. des insectes* p. 482. 483. Vermes in spiritu terebinthinæ 15 minutis super-vivunt Swammerdam p. 659.

e Martinet de respir. insect.

medio in marmore vivere lego : foramina tamen pervia certe habent , quæ ipsa sibi pararunt. De bufonibus constans fama est , repertos esse in ipsis mediis lapidibus aut arboribus *i* , sanos , absque ullo cum aere libero commercio. Demum experimenti causa Cl. *Herissant* bufones in gypsum inclusit , vixerunt duobus mensibus *k*. Res mira , si vera est. Sequitur enim , quod nemo nisi invitissimus verum esse adgnoscat , tantilla animalia absque aere , & alimento , diutissime , 100 & 130 annis vixisse *l* , quod certe tempus ad incrementum quercus requiritur , si ponas eam arborem nascentem animal suo cortice comprehendisse , aut lapidem ex molli luto induuisse , qui primus animal quasi carcere incluserat. Quare de re valde paradoxa liceat ampliasse , usque dum certius constet , in lapidis vel arboris intimis , vere absque aere , absque occulta forte , per quam subiverit , rima , vitalia superfuisse animalia , quorum cæterum manifestus pulmo ostendit , ad aerem respirandum nata esse.

Quare liceat interim ponere , pene omnia animalia nobis nota aere indigere. Sequitur ut ostendamus , quare indigeant , & quæ tantæ sint utilitates , quas aer vitæ animali præstet.

k Bradley *philosoph. account* similis historia existat. *phil. transf.* p. 120. *Plot* l. c. p. 248. *Ray* n. 461.

Wisdom of God p. 323. *hist. de* *k** *Extrait des Journaux* l. c. *l'Acad. des Sciences* 1714. & item *l'Hist. de l'Acad.* 1731. l. c. rum 1731. p. 21. De Scarabeo *Astruc* p. 567.

§. IV. Num aer elasticus sanguini admisceatur.
Argumenta adfirmantium.

Aer in vasis visus.

Præcipua ab omni retro ævo ab *Hippocrate*,
Aristotele & *Galeno* hypothesis fuit, uti aer in
natura fere omnis causa *m* est, neque absque
eo vel ignis subsistere potest *n* aut carbo ignem
retinere, ita etiam aerem ad humores vitales
animalium venire, inque iis id, quod vitam
efficit, sustentare. Creberrimi auctores sunt,
quibus id placuit, quorum fere summos duces
unice nominavero, eosque inter nuperos, qui
ipsum, verum, qualem ore adducimus *o*,
aerem de atmosphæra, in sanguinem venire
scripserunt *p*. Aliter etiam sentiunt, qui ali-

-
- | | |
|--|---|
| <p><i>m</i> Hales l. c.</p> <p><i>n</i> Boyle exp. phys. mech. de aere ac aeris qualitat. occult. Nat. Deor. L. II. p. 603. Spiritalis aer malignus, ut respirationi nocet, ita minus bene ignem sustentat. Candelæ quartæ, & dimidia, etiam parte minus consumuntur, in fodinis, quarum aer ad respirationem ineptus est <i>Hamburg. Magaz. T. 12. p. 46.</i> In aere illo pestilente cryptæ caninæ carbonæ extinguuntur <i>L. a Capoa moffet. T. 12. p. 46.</i> Sed neque in aere non renovato ignis vivit Boyle de aeris qualitat. occult.</p> <p><i>o</i> Mosca l. c. T. II. p. 118.</p> <p><i>p</i> Aristoteles hist. L. I. c. 16. Erasistratus apud Gall. util. resp. Hippocrates peri trophys</p> | <p><i>Aretæus Anat. L. II. c. 3.</i> Cor bibit spiritum expulmone Cicero</p> <p>tus cor movet & arterias <i>Athenæus apud Galenum de differ. puls. L. IV.</i> Porro hic pertinet <i>Rufus L. II. p. 59. Galenus util. part. L. VII. c. 9. &c. Swammerdam de respir. L. tot. Borellus de natur. p. 14. Bellinus de ferment. prop. 37. &c. contra Zerillum Giorn. Letter. IV. Desaguliers T. II. p. 403. 405. Berkley firis p. 114. 116. Bertier l. c. p. 1. 2. &c. Ferrein diff. sæpe cit. D. Bernoulli de respir. Helvetius, Senac T. II. p. 118.</i></p> |
|--|---|

quid unice in sanguinem de aere venire admitterunt, quorum alii subtiliores de sanguine particulas, aut ætherem, alii nitrum aereum, nominarunt. Alii verum quidem aerem, sed in aqua dissolutum, neque nunc elastica sua vi, aut expansurum se, aut passurum compressionem.

Verum audiamus illos numerosos viros, qui verum communemque aerem in sanguinem aiunt venire.

§. V. *Via aeri aperta est ad sanguinem.*

Facillime hanc viam inveniunt in corporibus insectorum. Hic enim a stigmatibus ad ipsum cor propriæ, apertæ, & valvulis protectæ, viæ patent, ut in bombyce *q*, locusta *r*: in ventriculum porro *s*, in intestina *s*^{*}, in uterum *s*^{**}, in ovaria *s*^{***}, ad cerebrum *s*[†], ad medullam spinalem *s*^{††}, ad oculos *s*^{†††}, ad omnia viscera *t*, ad alas *t*^{*}, ad pinguedinem *t*^{**}, ad dentes

q Svenska Wetensk. Acad. Handling. 1745. p. 257.

r Huic ramus bronchi in cor inferitur *Malpighi posthum.* p. 359. Repetit, sed non perinde suæ rei certus, *Zinanni cavallette* p. 7. Porro in ape *Swammerdam bibl. nat.* p. 468. t. 19. in cosso scarabæi *T.* 27. f. 11. 12. in ephemero *T.* 15. f. 4.

s *Swammerdam T.* 36. f. 1. h. p. 575. in papillione. In verme ap. p. 407.

s^{*} In cosso. *Tab.* 27. f. 11. 12.

s^{**} In ape p. 473.

s^{***} In ape ib. a filo p. 693.

pediculo p. 73.

s[†] In pediculo p. 73. scarabæo *T.* 29. f. 8. Vid. p. 429.

s^{††} In pediculo p. 73. acaro p. 206.

s^{†††} In ephemero tab. 19. f. 1. vid. p. 429.

t In musca tabani p. 660. t. 40. f. 1.

t^{*} In ape p. 504. & in scarabæo t. 30. f. 1.

t^{**} *Tab.* 27. f. 9. 10. p. 311. 408. In membranis animalium dari vasa aerea *Senac T.* II. p. 18.

& ossa *t**** : ad omnes omnino corporis partes *t†*.

In animalibus hominis similibus res est difficilior. Proferunt tamen experimenta, a nobis exposita, quæ, aerem ex broncho in cordis sinistras caveas venire, confirmarunt *t††*. Addit Cl. Bertier *v* se aerem in venulam pulmonalem introduxisse, qui, (puto per asperæ arteriæ ramos) prodiit, cum aqua oneraretur. Sed ipse neque in enarrando suo tentamine liquide loquitur, & demum fatetur, teneram esse operationem.

Quare alio modo rem sunt adgressi, ut viam quidem ex broncho in sanguinea vasa non fusciperent ostendere, aerem tamen in vasis vivi animalis verum, in bullas collectum, atmosphaerici similem, producerent. In animalibus frigidis res satis certa est, sæpe a nobis *x* in ranis visa, & a Cl. testibus in testudine *y*, inque locusta *z*. Bullæ sunt grandes, & adprime conspicuæ, multo quam globuli sanguinis majores, quæ cum sanguine per sua vasa feruntur *a*.

In calidis animalibus vivis res difficilior est. Ipse tamen Musschenbroeckius *b*, ad alienam quidem narrationem refert, ex incisa hominis

*t**** p. 429. 577.

t† In eruca p. 577. in heme-robio p. 248.

t†† T. VI. p. 270.

v l. c. p. 27.

x *Memoire sur le mouvement du sang* exp. 3. 9. 17. 198. 214.

y *Redi Giorn. de lett. Suppl.* T. III. p. 86. *Caldesi* p. 64.

Pujati de morb. naron. p. 68.

z *Malpighi posth.* l. c.

a *Memoir.* l. c. Hi globuli

albi Bertier p. 19.

b *Diff.* p. 58.

vena, post anxietatem magnam, cum sibilo bullam aeris erupisse, & similis apud *Cornelium v. Solingen* historia exstat c. In vivo erinaceo aerem vidit in vasis sanguineis *Lanciscus d.* Cl. *Bertier* e vesicam inanem in canis asperam arteriam illigavit, deinde aerem in cruralem venam injecit, ita paulo post ea vesica tumuit, ab aere proculdubio ex vena in pulmonem, hinc in asperam arteriam meante. Idem maculas aereas, quas putaverat se per cor felis motas vidisse, per experimenta posteriora confirmare non potuit f. Aeris in proprio corde strepitum credit Cl. *Samuel Mihles* se percepisse g. In suffocato infante globulos aereos *Roedererus* vidit. In urina phthificæ feminæ flatus h.

Parca hæc in vivo animale calidi sanguinis experimenta sunt, in cadavere frequentia. Commune est, in venis, & cerebri i maxime, aeris spectaculum. Sed etiam aliis in vasis, inque ipso corde hominis per miliarem febrem enecti spumofum & quasi effervescentem sanguinem vidi, inque strangulata femina, alioque etiam in cadavere *Alexius Littre k*, & alii l, variis in

e Operat. p. 344.

d p. 20. 39.

e p. 15. Journ. des Savans 1742. Maj.

f p. 7.

g In Comm. ad nostras pri-
vas lineas.

h Breslauer Samlung. 1726.
p. 118.

i Eph. Nat. Cur. vol. 10.
obs. 36. Roederer Satur. p. 9.

Camerar. apospasm. piæ M. III.

Segner in historia morbi mor-
tisque J. Guilielmi Albrecht,
Eberhard de sanguific. p. 8.

k Hist. de l'Acad. 1704. obs. 2.
& 17. In corde humano aerem
nonnunquam vidit Swammer-
dam p. 852.

l Pechlin L. I. p. 57. post
hæmorrhagiam Behrens Bresl.
Samlung. 1723. Mart.

vasis *m*, aerem viderunt, inque ductu thoracico Vir Cl. *Josephus Antonius Pujati n*, quem nuper amisimus.

§. VI. *Aer in cellulosis telis effusus.*

Addunt, eundem aerem, per propria forte loca *o*, de sanguine in cellulosam telam secedere, certe frequentissime in morbis inprimis acutis *p* in gangræna demum *q* in morbo boum, in renum aliorumque viscerum superficie & intestinorum, in ovarii sacco emphysema nasci, aerem nempe in cellulosa musculorum intervalla effundi, inque iis spatiis in vivo homine deprehendi, suo strepitu conspicuum aerem, & turgida membri convexitate. Subitos etiam tumores variis ex causis passim nasci *r*, quos aereos esse

m Camerar. l. c. *Monroo* l. c. *Frank. Ann.* T. III, p. 417. *Schwenke* p. 25. *Leprotti Comm.* Bonon. vol. 1. *Alefeld de aere in sanguine* p. 6. *Roederer Sat.* p. 13. *Viridet de prim. coct.* n. 5. *Schurig Sialogr.* p. 287. *Eustach.* p. 143. in renibus. In lue boum *Fritsch seltsame Geschichte* T. VI. p. 533. In atrophia venæ sæpe aere plenæ *Lieutaud précis de la medecine pratique* p. 426.

n l. c. p. 115.

o *Senac* T. II. p. 118.

p *Satur. Siles.* VIII. [n. 7. *Mem. de l'Acad.* 1704. p. 8. In boum morbo *Lisle busbandry* T. II. p. 386. *Sauvages malad. des bœufs du Vivarais* p. 12. *Layard de eodem morbo* p. 53. In variolis *Hildanus* obs. 70. *Centur. V. Herelius de*

usu pororum. A suppressis lochiis *Hofmann de aere microsc. facit.* In rachitide *Buchner de rachit.* p. 10. 11.

q *Petit malad. des os* T. II. p. 126. 127. *Saviard* obs. 87. *Waldkirch de emphysem.* p. 22. *Kirkland of gangrens* p. 68. *Phil. Trans.* n. 313. 335. *Müller biga* obs. p. 8.

r Per totum corpus a pluvia tempestate tumor subitus *Herelius* p. 12. In hystericiis *Raulin traité des vapeurs* 220. Tumor flatulentus palpebrarum *Schulze emphys.* p. 18. In scorbuticis *Pringle* p. 428. A lochiis suppressis *Hofmann de aer. microsc. facit.* Per ructus de variis in corpore humano partibus aerem credit exire *Arbuthnot of air* p. 38.

persuadentur. Etiam ex abdominis cavea aer erumpit, qui cum summo armentorum periculo intestina comprimebat *s*, & is morbus tympanites est *t* sæpe & alias visus. In pericardio demum sæpe aer visus est *v*.

Denique post mortem cadavera, ex notissima observatione, intumescunt *x*, & aere turgent, maxime in æstuosis regionibus, in abdominis, in pectoris cavitates effuso. In Persia *y*, intra unicam horam a morte hominum extinctorum corpora mire inflantur, & ad 5. 6. pollices demum turgent *z*. Pia mater ad vesicæ modum distenta visa est *a*, & sub ea flatus. Peculiariter ab aere expanso, de sanguine aut corporum cavernosorum, aut cellulosæ telæ exterioris erumpente, eadem in cadaveribus ad forum novum extinctis phænomena adparuerunt, quæ solent a veneris cupidine succedere *b*.

Emphysemata a pectoris vulneribus, ab intestinorum vitiis, a strumis, huc non oportet excitare, quæ aerem suum manifesto ex broncho *c* habeant. Aerem, quo otides iratæ pellem sub collo inflant, putes ex pectoris cavea eo venire.

s Viridet du bon chyle p. 667.

t Berger disp. p. 11. Cogrossi Saggi di medic. Italian. p. 99.

v Senac T. II. p. 355. Eo in avibus penetrat Parisini in demois. de Numidie.

x Heuermann operat. chirurg. T. II. p. 281. Aer a putredine generatus fecit, ut cyprinus in aqua nataret Gericke L. III. c. 10.

y Thevenot suite du voyage du Levant L. II. c. 4.

z Chardin voyag. T. IX. p. 99.

a Willis de cerebro p. 62.

b Alexander Benedictus L. 24.

19. Similia habent Salmuth Cent. III. obs. 21. 29. 40. Marc. Donat hist. med. mirab. p. 142. Priapismus in cadaveribus superest Lieutaud précis de la medec. prat. p. 229.

c Kramer med. milit. T. II. p. 169.

§. VII. *Aer qui de corpore animali se in spatio inani expedit.*

Iterum aerem animalium indigenam persuadentur viri Cl. dispalescere per experimenta, quæ in spatio fecerunt, ex quo aerem communem eduxerunt. Omnia nempe animalia in ejusmodi inani spatio turgent, quadrupeda *d* pariter, avesque *e*, & serpentes *f*, & pisces *g*. Idem phænomenon in antro lethifero visum est, quod erinaceum enecuerat *h*, nam & in eo creditur vapor aere levior habitare. Eadem animalia reddito aere subsident & comprimuntur *i*. Quare omnia viscera, quæ in aqua fundum solent petere, eadem in spatio vacuo enatant *k*.

Manifestum esse urgent Ill. viri, aerem in animalis habitu fuisse, quem pondus incumbentis atmosphæræ in arctius spatium comprimebat, & qui idem nunc, eo onere levatus, se expandit, inque amplius spatium laxatus, tumorem genuit, quem phænomena ostendunt *l*.

d Musschenbroeck post *Essays de phys.* p. 41. van Sanden l. c. *Guide* obs. 3. Bohn p. 86. Calida magis tument *Guide* ibid. Boyle *Phil. Transf.* n. 62. 63.

e v. Sanden de antl. pneum. *Wolf Versuche* T. III. n. 103.

f Lacertus Hartmann l. c. rana Nollet T. III. p. 271. Bose diss. phys. n. 6. Valisner suppl. ad Giorn. de letter. T. III. p. 141. Camerar. de antl. pneum. p. 3. Boyle exper. phys. mech. p. 114. Vipera Valisner T. I. p. 359. Boyle *Phil. Transf.* n. 62.

g Gerike L. III. c. 16. v. Sanden l. c. Musschenbroeck l. c. s'Gravezande T. II. n. 617. Cimentini p. 108. 109. Idem in aqua nunc natant ibid. Desaguliers T. II. p. 381. tum ranæ *Wolf Versuche* T. III. n. 105. 106. aere vero admissio situm naturalem recuperant Idem n. 106.

h Bel *Phil. Transf.* n. 452.

i *Guide* l. c. Cimentini p. 107.

k Musschenbroeck p. 22.

l s'Gravezande l. c.

Expeditur autem aer elasticus ex omnibus omnino corporis animalis partibus. Abdomen turgēt, hinc compressis intestinis fæces prodeunt *m*, & semen *n* piscium, & de ventriculo devorati cibi *o*, uti perpetuo vidi in cadaveribus fæces & mucum narium elidi, quando multum piscium gluten in cellulosas telas impuleram.

Intumescit una vesica natatoria piscium, ut natent & subsidere nequeant *p*, eademque rupitur sæpe *q*, ut contrario eventu subsideant *r*, & etiam reddito aere natare nequeant *s*.

Perinde & cor *t* & fellis vesicula intumescit *v*, aut urinæ *x*.

Inflatur pulmo, quod toties citavimus *y*, & de ore animalis eminet *z*.

Sed etiam oculi *a* turgent, inque oculis vitreus humor *b*, & aqueus *c*, & lens crystallina *d*.

Exstant equidem nuperrima experimenta Cl. *Darwig*, quibus hæc omnia videntur refutari. Nempe

m Sanden l. c. Bertier phys. des corps animés p. 409.

n p. 285.

o Gerike l. c.

p Desaguliers l. c. conf. not. g. p. prior. & per os exit *v*. Sanden.

q Non semper, nam alias laxatur, & aerem dimittit Cimentini p. 110. 111. Rupta post sesquihoram Birch T. 1. p. 216.

r Birch T. 1. p. 244. Desaguliers l. c. Hofmann tentam. p. 256. Monconis Itin. P. 11.

Sect. 2. p. 49. Borell prop. 112. Cimentini p. 108. 109.

s Nollet T. III. p. 266. Birch l. p. 244.

t Musschenbroeck p. 19.

v Idem p. 8.

x Idem p. 12.

y Wolf l. c. n. 101.

z Berger p. 42. &c.

a v. Sanden l. c. Hofmann demonstr. phys. n. 25.

b Musschenbroeck de aere p. 18. Diebold l. c.

c Idem ibid.

d Idem ibid.

Nempe jugularem venam, & vesiculam felleam sub antlia pneumatica, non intumescere subtracto aere, neque venam cavam sanguine plenam; vesicam urinariam utique *d**. Mira hæc, quæ contra tot alios Cl. viros adoptare vix ausis. Iterum propius ad rem accedunt experimenta, in quibus de partibus corporis animati ipse suis bullis conspicuus aer exit, ut ex vitreo humore *e* oculi, & crySTALLINA lente *f*, tum ex glandula thyreoidea *g*, thymo *h*, pancreate *i*, rene succenturiato *k*, cerebro *l*, nervis *m*, teste ejusque membranis *n*, corde *o*. De aliis partibus firmioribus ignis aerem latentem exigit *p*.

Porro in fluidis partibus animalis, in vacuum spatium effusis, aer conspicuus emergit. Ex lacte recente aer effervet, magnis sed non duraturis bullis *q*. Ex chylo copiosus habetur *r*. Huc ductus thoracici ligati in vacuo tumor, & cisternæ chyli *s*, & vasorum lymphaticorum *t*. Ex medulla *v* & adipe *x* etiam, & ex isto plurimus aer prodit. Ex urina bullæ non diu duraturæ *y* difficiliter emergunt, & in spatio perfec-

*d** *Phil. Trans.* n. 64.
e Bullæ parvæ ex lampetræ oculo Boyle of frost p. 246.
 Adde *Musschenbroeck* *diff. cit.* p. 18. Paucas bullas edit *Diebold*.
f *Diebold*.
g *Idem*.
h *Idem*.
i *Idem*.
k *Idem*.
l *Idem*.
m *Idem*.
n *Musschenbroeck* p. 20.

o *Idem* p. 19.
p *T. VI.* p. 300.
q *Musschenbroeck* p. 8. *Wolf* l. c. n. 192. *v. Senden, Bertier* p. 9.
r *Senac T. II.* 112. 113. *essays in physiq.* p. 577. 578.
s *Musschenbroeck* p. 8.
t *Idem* p. 19.
v *Diebold*.
x *Hales veget. stat. exp.* 49. *Diebold*.
y *Musschenbroeck* p. 12.

tius inanito *z*, exque calente urina *a*. Ex saliva multus aer exit *b*, ut spatium duodecies majus impleat *c*. Ex humore oculi aqueo bullæ magnæ & paucae *d*.

Ex muco multum *e* aeris evolvitur, in diu duraturis vesicis *f*.

Ex albumine ovi calefacto, eadem opera aer educitur *g*; & ex pericardii liquore *h*; & ex gastrico succo *i*; & ex amnii aqua *k*. Ex bile *l* bullæ decies volumine bilis *m* ampliores exeunt, aerisque sui tenaces.

Ex sudore denique aer in eodem artificiose inanito spatio prodit *n*.

Denique, cum de sanguine potissimum quæ-
ratur, etiam de sanguine aer in spatio evacuato
exit. Hinc arteria ligata sub campana intumescit natatque *o*. Idem in venis fit *p*, & jugularis *q* vena in inani spatio tumet, natatque, & aere reddito fundum petit.

Merito arteria tardius tumet, vena citius *r*,

z Boerhaave Chem. T. I. p. 528.

a Wolf n. 150.

b Senac l. c.

c Diebold.

d Musschenbroeck p. 18.

e Senac l. c. Musschenbroeck
diff. p. 7.

f Musschenbroeck ibid.

g v. Sanden, Wolf Versuche
T. I. n. 158.

h Diebold.

i Idem.

k Musschenbroeck p. 6.

l Idem p. 7. Diebold.

m Conf. Senac T. II. p. 112.

113.

n Mery Mem. de l'Acad. des
Sciences 1707.

o Diebold p. 10. Campbell de
aere morbor. causa p. 10. Roebuck
de effectibus quarundam pro-
priet. atmospher. Musschen-
broeck p. 10. Mackenzie hist. of
health p. 344.

p Wolf Versuche T. III.
n. 104. Guide p. 6. 8. Kruger
physiol. n. 107.

q Senguerd rat. & exp. con-
nub. Desaguliers T. II. p. 404.

r Musschenbroeck p. 10.

cum illa durior sit , & aeri intus nitenti magis resistat.

Denique de sanguine *s* & arterioso *t* , & venoso *v* , sub campana ab aere inanita , aer spumæ specie conspicuus prodit , sive hominis fuerit , sive quadrupedis , sive avis , sive piscis *x*. Etiam ex sanguine coacto *y* spuma aerea efflorescit.

Tantum in sanguine aeris est , ut ex uno cubico pollice 33 aeris uncia cubicæ prodeant *z* , etsi , pro aliorum humorum portione Ill. viris paucum dimittere visus est *a* , quod de chylo plurimus in cellulosas telas humoresque alios exiverit *b*. Sunt autem 33 pollices aeris æquales trigessimæ parti sanguinis totius , si aeris , ut satis accedit , pondus facias æquale millesimæ parti ponderis sanguinis *c*.

Sic ex fero sanguinis calefacto *d* , sub campana bullæ aeræ prodeunt , aliquanto tamen minus , quam ex sanguine , uberes *e*. Ex corio etiam pleuritico aer educitur *f*.

s Boyle de conserv. corp. in vacuo. Berger de nat. p. 43. Eph. Nat. Cur. vol. V. p. 191. Musschenbroeck p. 9. 11. qui bullas magnas & tenaces memorat.

t Musschenbroeck.

v Desaguliers l. c. Stuart lect. VII. VIII. Bertier p. 61. de arteria pulmonali : Musschenbroeck, Beccaria in miscell. Taurin. p. 68.

x Tabor p. 90. 91.

y Bertier p. 62, 63.

z Hales l. c. per ignem.

a Senac T. II. p. 112. 113. 120. 121. Musschenbroeck p. 9. 10. Ex 16 unciis sanguinis ovilli uncias 18. sed per putredinem obtinuit.

b Senac T. II. p. 112. 113.

c T III. p. 71. seqq.

d Diebold p. 4.

e Senac T. II. p. 120. 121. & essays de phys. l. c. Musschenbroeck p. 10.

f Senac T. II. l. c.

Addunt denique, se in arterioso sanguine, qui ex pulmone aerem habeat, plus ejus elementi, quam in venoso reperire *g*, & arteriam pulmonalem, quæ venosum sanguinem vehat, in spatio aere atmosphærico exhausto minime intumescere, venam contra cognominem, quæ aerem hauserit, utique turgere *h*.

§. VIII. *Alia argumenta pro aere in sanguinem recepto.*

Hoc loco ea repetunt, quæ jam excitavimus *i*, floridiorem in vena, quam in arteria pulmonali sanguinem esse, eumque ruborem esse ab aere *k*, cum sanguine intime misto *l*, omnino uti etiam in cadavere, ab aere in asperam arteriam inflato, sanguis splendidior in sinistrum sinum veniat *m*. Hinc in animalibus, quæ parce aere utantur, nullum inter arteriosum & *n* venosum sanguinem discrimen esse, phocæque totum sanguinem esse nigerrimum *o*. Hinc in spatio inani sanguinem atrum reddi, & ruborem cum reddito aere recuperari *p*. Denique superficiem sanguinis tunc solum rubere, quando aeri expo-

g Mayow p. 132. Ferrein flux. p. 459. 460. Ferrein diff. cit. sæpe cit.

h Bérrier p. 106. 107.

n Oexmelin hist. des avantur.

i T. III. L. V. p. 12. 13. Ferrein

T. I. p. 86. 87.

diff. cit. Schreiber almag.

o Schelhammer apud Valen-

p. 342. 343. Kuhnbaum l. c.

tin Amphib. T. II. p. 89.

p. 12. sed iste incertior.

Beccaria l. c.

k Schreiber ibid.

p Nebel diff. de reciproc.

l Lister de cochl. p. 108. &c.

aeris &c.

m Bohn de aeris sublim. in-

nitur, & atram manere, quoties oleo injecto ab ejus elementi tactu defenditur *q*, de quibus alias fusius agemus.

Porro potest in Cl. virorum causa dici, sanguinem etiam absque vi vacui spatii, cum tepore rarefieri *r*, conspicuas adeo vires elastici aeris retinere: eandem in chylo, aut lymphæ ductus thoracici naturam esse: totaque hominum corpora æstate, quam hieme, aliquanto esse tumidiora *t*.

Sed etiam in capsulis articulorum manifestum aerem *v* contineri, qui diductis a mutuo contactu ossibus, levibus, viscoso glutine obductis *x*, certe in nonnullorum hominum digitis & animalium *x** pedibus, notissimum strepitum edat; quem etiam chirurgi percipiunt, quando in proprium acetabulum os vitiose dimotum reponunt *y*.

Evidenter porro credunt, aeris in vasis sanguineis præsentiam subtili equidem argumento declarari. Inspirari aerem ad 40 uncias, expirari uncias 220. accessorias illas 180 uncias *y** non posse nisi ab aere esse, qui de vasis sanguineis exhalaverit, atque adeo, in ea vasa fuerit receptus *y***.

q Cl. Cigna misc. Taur. p. 71.
r Stevenson Essays of a Society at Edimb. T. V. p. 866.
s Senac T. II. p. 122.
t Pechlin observ. 43. L. III.
v Hamburg. Magaz. 1757.
T. 18. p. 253. Ingrassias de ossib. p. 278.
x Senac Mem. de 1724.

p. 172. 173.

*x** Rangifero currenti articuli pedum strepent Scheffer Lapon. p. 318.

y Petit malad. des os T. I. p. 47.

*y** Bertier p. 220.

*y*** Contraria quidem horum Nolletus, & plus inspirari aeris, quam expiratur.

Inflatum aerem in lobulorum intervalla viam sibi aperire *z*, atque adeo in vesiculis pulmonis vias esse apertas; sed ex iis intervallis viam in lobulos non patere, siquidem ii collabuntur, quando intervalla intumescunt *a*. Superesse ut aer ex vesiculis in vasa & sanguinem veniat *b*.

Eas præterea vesiculas minime adeo impervias esse, ut sui credant adversarii, per quas etiam plumbum in sanguinem veniat *c*, & venenum contagionis variæ *d*, ipsumque adeo crassum lapidicinarum pulverem per clausas vesicas viam sibi aperire *e*. Aerem autem penetrabile esse elementum, ipsamque aquam, ut subtilitate, ita meabili fluiditate superare *f*, cum præterea ex sua dissolutione naturam oleo, aquæ, & spirituofo liquori similem nactus sit *g*. Ita enim resolutus utique vasa nostra subit *h*.

§. IX. *Qua via aer in sanguinem veniat.*

Plerique scriptores, qui elasticum aerem in sanguinem venire scripserunt, per pulmonem recipi consentiunt *i*, uti insectorum aer certo

z T. VI. p. 282.

a ib. p. 289.

b Bertier p. 29. 30. & in *diff. sur cette question, si l'air de la respiration passe dans le sang.* Burdigalæ an. 1739. coronata.

c Ilsemann *colic. saturn.*

d Bertier p. 5.

e Diemerbroeck p. 206. Linden

physiolog. p. 567.

f Bertier p. 104. 105.

g Mosca T. I. p. 208. id vocat cruciamentum adipisci.

h Hales *hæmast.* p. 141. in cerevisia nempe solutus.

i Veteres pene omnes Bertier, Morgan, *princip.* p. 153. Guidetti *diff.* III. T. I. *Licer* in *diff.* Paris, 1741. defensa.

per earum asperas arterias in humores vitales venit *k*. Subtilius autem Cl. *Bertier* alternam quamdam aeris inhalationem & expirationem statuere conatur, ut pars subtilior aeris per inspirationem in sanguinem resumti ob majorem suum elaterem *l* & densitatem, in vasa & cor veniat *m*: Ejus vero alia pars eaque crassior, de ipso sanguine expulsa per arteriarum pulmonalium poros *n*, in proxima expiratione expellatur *o* in asperam arteriam. Hæc ita fieri existimat, quod amplior ventriculus dexter se in minorem sinistram auriculam nequeat deplere *p*; tum ideo etiam, quia calefactus aer pulmonis, hinc elatere auctus, externum aerem superat *q*. Denique aliam aeris recepti partem, postquam cum sanguine non brevi tempore circumlatus est, credit Vir Cl. per ipsam cutem diffilari *q**. Hanc enim postremam diffilationem, olim a *Johanne Mery* *r* refutatam, manifesto se in aquatica salamandra vidisse, idque animal magnas bullas aeris quidem de ore reddere *s*, per cutis vero poros minores exhalare, addit idem vir Cl.

Lente demum in sanguinem aerem subire, neque magna ubertate admitti, eam nempe copiam, quæ spatia interlobularia replevit, obque frictionem lente se expedit *v*.

k Fanton p. 340. & conf. p. 321.

l Id. *Bertier* Diff. p. 16.

m *Phys. des corps animés* p. 88.

n ib. p. 151.

o ib. p. 88. 113. & diff. p. 33.

p ib. p. 147. 148. 149. 150.

q In diff. p. 33.

*q** l. c. p. 113. seqq.

r *Mery* *Mem. de l'Acad.* 1700. & 1707. *Fanton* p. 344. In chrysalide *A.F. de Reaumur* T. I. mem. 9.

s l. c. p. 117.

t l. c. p. 118. 12. 16.

v Diff. p. 22.

Alii Cl. viri reſorberi equidem per pulmonem aerem docent, ut tamen in aqueo ſucco bronchiorum deliqueſcat *x*.

Neque tamen hac unica via uſi ſunt C. viri. Multi per chylum advenire *y*, alii per cutis poros maluerunt. Sed neque deſunt etiam nuperi auctores *z*, qui per nares in ventriculos cerebri aerem ſubire receperunt, etiam *Galen*i auctoritate freti *a*, unde porro per omnes corporis partes circulum obeat *b*. Spatium duram inter membranam & cranium aere plenum, quod cum diaſtole cerebri & meningum ſe libret, nuper propoſitum eſt *c*.

§.X. *Quem aer in pulmones receptus uſum vitæ præſtet.*

I. *Elatere ſuo.*

Ut continuo ſermone ex hypotheſibus nos expediamus, etiam utilitates proponimus, quas Cl. viri ab aere elaltico in ſanguinem reſumto ſperant. Plurimi certe Cl. viri ipſum elaterem requirunt: machinulas nempe ad motum & evolutionem paratas *d*, quæ in ſanguine ſe

x *Borell* prop. 113. *Ruyſch* epiſt. XVI. *Bouillet* *Hiſt. de l'Acad.* 1743. p. 78. & ſuite des élémens de prat.

y *Schrader* de aeris effect. in corp. hum. n. 14. *Liſter* Exerc. anat. II. p. 132. de humor. p. 28. *Berger* de ſucci nutrit. per nervos tranſitu p. 18. *Georgi* de hom. prop. 37. *Valiſneri* Giorn. de Letter. Suppl. T. 3.

p. 121. *Senac* eſſais de phyſique p. 573. *Kruger* n. 228.

z *Wedel* de tranſpir. p. 17. Per tunicas *Perrault* Eſſais de phyſique T. III. p. 265.

a In aphor. Sect. VII. n. 51.

b *Helmont* paradoxal diſcours. P. II. p. 36 *Cl. Bouillet*.

c *Mofca* T. II. p. 65.

d *Mofca* T. II. p. 16, 113, &c.

explicent *e* , oscillent *f* , globulos cruoris a mutuo contactu dimoveant *g* , ita sanguinis fluiditatem , & intestinum motum *h* , & calorem *i* & raritatem conservent *k* , coagulationem impediant. Addunt , cum atmosphæra se librare aerem , qui in sanguine sit , inque leviori aere expandi , in graviori contrahi *l* , ut nuper Cl. *Cigna*.

Aliqui eum motum , quem aer in sanguine excitat , omnino fermentationem vocant *m* quam ideo in animalibus respirantibus majorem esse adnotant *n*. Alii *actiuitatem* dicunt , quæ ab aere sit *o* & circuitum sustineat *p*. Alii torpidum sanguinem urgeri in pulmone , & in motum agi docent *q*.

Ipsam denique progressivum sanguinis motum manifestius Cl. *Bertier* certe magna pro portione ab aere repetit *r*. Nempe aerem in sanguinem resumptum calefcere & dilatari *s* , ad unam quintam partem *t* : ad eam portionem rarefactum

e *Lieutaud* *physiol.* p. 86.

Sinibald *apoll. bifront.* p. 77.

Fanton *anat.* p. 340.

f *Berkley* *Siris* p. 115. 116.

Borellus *Prop.* 115. 116. *Mistichelli* *dell' apoplessia*.

g *Morgan.* *principi.* p. 247.

248. *Nicolai* *de spissitud. sang.*

h *Dionis* *cours d'anat* p. 446.

Verheyen , *Walther* *de oscit.*

p. 26. *Berger* , *Lister* l. c.

Erklärung der Natur p. 49.

Fanton p. 344. Solvi sanguinem

Targirus p. 153.

i *Morgan.* p. 153. conf. *Bertier*

diff. p. 45. &c.

k *Lister* l. c.

l *Henshaw* p. 123. *Wainwright*

of air p. 62. *Senac*

p. 577. 578e

m *L.* *a Capoa delle moffette*

p. 62. *Bayle* p. 360.

n *Bayle*.

o *Desaguliers* T. II. p. 403.

Sauvages *effets de l'air* p. 22.

p *Sauvages* *ibid.*

q *Baglio.* *fibr. mort. & morb.*

p. 51.

r *Physique des corps animés*

p. 197.

s *ib.* p. 197. 202. *diff.* p. 15.

t *Physique* p. 206.

vim acquirere, quæ 25 libras, nempe sanguinis universam massam, propellere valeat *v*, ea celeritate, ut in minuto secundo pedem emetiatur *x*.

Ut incitari sanguinem isti viri, ita alii, tamquam undam a vento retardari malunt *y*.

§. XI. II. *Vi vitali.*

De elatere silent alii, cæterum particulas aliquas activas *z*, spirituosas *a*, æthereas *b*, nam has voces prestitit retinuisse, de aere in sanguinem venire docent. Deinde propius spiritum vitalem vocant, qui per pulmonem in cor c veniat, & arterias *d*, inque his quidem organis in spiritum vitalem formetur *e*, qui & cor moveat, & arterias *f*, in reticulo vero mirabili cerebri, in animale spiritum abeat *g*. Neque inter nuperos defunt, qui hanc animalium spirituum ex aere generationem tuentur *h*.

Alii non rotunde quidem spiritus ex aere

v Ibid.

x p. 210.

y Sinibaldus l. c.

z Bayle probl. 100. Malpigh. posth. p. 20.

a Spranger enhydrobioi p. 109.

b Cartesiana secta. Etiam Georgi prop. 36. 37.

c Aristoteles hist. anim. L. I. c. 16. Athenæus apud Galen. de differ. puls. L. IV. c. 14. Aretæus acut. L. II. c. 3. Rufus part. appell. L. II. p. 59.

d Cicero natur. deor. L. II. p. 603. Athenæus ibid.

e Oribas. p. 78. conf. Galen.

util. part. L. VII. c. 8. 9.

Columbus p. 223.

f Athenæus, Rufus.

g Oribas. p. 78. conf. Galen. de util. respir. de dissect. instrum. vocis c. 3. de usu part. L. VII. c. 9.

h L. a Capoa delle moffette, Barbieri in libello Bononiæ 1680. 12. edito. Mosca T. I. p. 232. 236. 265. Aerem principium esse sensus & motus is Cl. Vir etiam nostro ævo docet.

i F. M ab Helmont homin. & morb. p. 74. &c.

generari adfirmant, ens *i* tamen aliquod vitale ex aere refumi dicunt, neque ab hac opinione etiam Cl. viri abhorrent *k*, a reliqua illa secta alieni. Id elementum, quodcumque sit, addunt in aere densiori majori copia contineri, hinc lentius in ejusmodi aere respirari *l*. Idem destrui per respirationem, hinc cum eodem aere diu non vivi *m*: mire inde ab aere libero, & in universum nos refici, & hystericas potissimum feminas, atque asthmaticos ægros, & phthisicos *n*. Esse vero id elementum, quod *Drebelius* *o*, aliunde ex invento vero fulgido *scarlati* colore celebris artifex, invenerit, & quo urinatores de eodem aere sub campana viventes diutius sustentaverit. Idem alii elementum pro electrica materie habent.

§. XII. De salino aeris elemento.

Id vitale principium aliqui propius definiverunt, & priori seculo, quo chemicæ theoriæ in medicina viguerunt, falsum quidem vaporem *Malpighius* dixit *p*: spiritum calidum inflammabilem sulphureum *Listerus* *q*: salem volatilem acidum, qui fermentationem illam sanguinis

k Boerh. Elem. Chem. T. I. p. 499l § 00. Mead of poisons p. 289. Bohn de aeris in sublum. influx. p. 448. 449. Sauvages physiol. p. III.

l Mead de peste p. 45. conf. p. 194.

m p. 207.

n Goodall physic. colleg. vindicat. p. 76.

o Boyle de usu respir. digress. Monconis voyag. T. II. p. 75. Derham physico-theol. p. 6.

p De polyp. p. 130. conf. posth. p. 20.

q Exerc. anat. II. p. 221. argumento phosphori.

sustentaret *Vieussenius r* : denique acidum aereum *Bryan Robinson s* , quod sanguinem a putredine conservet & addenset *t* , fibramque animale roboret *v* , unde deducebat , frigido aere , eoque adeo acore ditiori , nos^o refocillari , & in frigore rectius valere. Eo trahebat *Mariotte x* , quod in plantis junioribus sales lixivi , in adultis , de aere multum acoris sibi fumentibus , acidum elementum dominetur.

§. XIII. Nitrum aereum.

Si ad verum sensum nitri aerei hypothesis revocata fuerit , parum utique ab ea differt , quam novissime proposuimus. Nitrum quidem ipsum , incautiores olim physiologi in aere obvolitare scripserunt , & ex pluvia *y* , & nive *z* colligi ; idemque passim ex rupibus efflorescere *a* , exque plantis *b* & stercorebus *c* educi. Id nitrum

r Du cœur p. 122.

s Essays T. II. p. 345.

t Idem ibid. & prop. 24.

v p. 304. Acido ab aere excluso omnia animalia pereunt *Hooke exper.* p. 217.

x De la végétation p. 162.

y Carelsberg om salpeters ymnighet. Sprat ex Henshaw p. 264.

z Bagliv. p. 428.

a Sprat ibid. Major calc. hum.

b Ex horragine & portulaca *Lemory 1717*. Ex fœniculo , & horragine *Marggraf Mem. de Berlin 1747*. p. 79. Ex ni-

cotiana , parietaria *Neumann T. I. P. II.* p. 114. ex chelidonio , geranio robertiano , parietaria *Stahl von Salzen* p. 49. ex parietaria , carduo benedicto , cucumere *Home agricult.* p. 139. & ex aliis numerosis plantarum succis *Leidenfrost de succ. plant.*

c *Fludd. Nieuwetydt* p. 563. 564. *Mayow de nitro aereo toto lib. Lower de corde c. 3. Thru- ston* p. 52. 53. *Besse analyse T. I.* & in lettre en réponse à *M. Helvetius* p. 114.

aiunt in pulmonibus ad sanguinem *c** venire, ab eo ruborem illum elegantem *d*, & fermentationem *e*, & calorem, sanguini accedere, aut vicissim sanguinem condensari *f*, & imminentem putredinem averti *Doffie*.

Eo ipso arcano aliqui testantur a *Drebbelio g* recreari solitos esse homines, qui sub campana urinaria ex aeris defectu languerent. Neque alium falem fuisse, quem in suis ampullis de anima humana *h Bartolettus* colligebat. Etiam dulcem, rubri sanguinis colore, ex nitro medicinam parari *i*.

Nunc quidem facile ostenditur, si de vero nitro prismatico, sex foraminibus perforato *k*, detonante aeremque, dum detonat, generante *l* sermo est, qui ex aereo acore cum urinoso phlogisto, & calce componitur, falsissimam hypothesein esse; siquidem ejusmodi fal in aere neque reperitur, neque reperiri potest, cujus fixa *m* natura sit, calcemque *n* habeat admi-

*c** Boerhaave de viribus medic. p. 271. Pinelli p. 303. 304. Ex transpiratione animalium *Quesnai Essays* T. II. p. 123. In sanguine contineri, cum is in pueris detonet. *Besse anat.* T. I. p. 325. Qui in plantis reperitur, est ex fimo *Neumann* l. c. Neque absque animalibus terram nitrum dare *Lemery* l. c. *d* *Lomer* p. 183. 184. & vid. L. VI. p. 312.

e *Mayow, Thruston, Per-*
rault Eff. T. III. p. 265.

f *Sylvius diss. med.* VII. n. 78.

g *Digby de vegetat. plant.* p. 66. 67.

h *Valisneri oper. omn.* T. III. p. 576.

i *Beccher in tripode.*

k *Baker employment for the microscope* p. 64. *Microscop. Belustig.* tab. 31. et si enim alias ibi crystallos videas, tum apud *Cl. Cappeler, crystallograph.* T. 14. f. 2. 7. alterius tamen generis ii sales sunt.

l *Hales veget. stat. exp.* 102.

m *Stare Phil. Trans.* n. 204. *Wallerius de nitro Boyle hist. of the air.* p. 42.

n *Cartheuser mater. med.* T. I. p. 286. seqq. *Musschenbroeck essays* p. 340. *J. Gottschalk Wallerius* l. c.

itam & plurimum phlogisti, & arti debeatur o, neque a natura purus producatuf ufquam. Neque enim huc debet trahi volatilis indoles spiritus nitri, cujus utique vapores cum proximo aliquo alcali effervescunt: Nam is meraculus acor est, non nitrum p.

Verum, si sensu veriori Cl. virorum dicta fumantur, acidus halitus q utique ad pulmones advenit, qui per aeris universitatem oberrat, nondum quidem nitro proprius r, & ad omnes terras, quæ acori bases præstant, æque favens aptusque. Ejusmodi enim utique nudus spiritus per aerem oberrat, & ad terram putredine plenam, urinosam s, adhærescens, cum calce addita nitrum artificum efficit. Nunquam certe absque libero aere nitrum generatur, neque sub aquis t.

Nam quod nitrum ex nonnullis t* aquis obtinetur, id calce addita in nitrum parari v certum est. Sed neque in animalium succis nitrum offenditur v*.

p Ut ex sale marino, cum fimeti muria, cinere, & stercore columbino nitrum parari possit, vide *Justi Wahrheiten* n. 7. Vulgo ex pingui urinoso, & acido aereo, addita calce paratur.

p *Neumann oper.* T. I. P. II. p. 11.

q Spiritum nitri resorberi *Bayle* p. 367.

r *Henkel rediiv.* p. 147. *Home* l. c. p. 133. seqq. *Wallarius* vitriolicum vocat, sed vide p. 219.

s *Cartheuser* l. c.

t *Anc. Mem. de l'Acad.* T. I. p. 30.

t* Ex superficie aquarum in Brutiis stagnantium *Cornelius Consentinus de sensib.* p. 33. Ex fonte scultensi rhætico *Gesner* ep. p. 85. b. p. 9. ex fontibus & lacubus falsis tartariæ *Gmelin Sammlung. der Reisen* T. VII. p. 670. ex paucis fontibus *Rutty Synops.* p. 49.

v *Quadrio descript. aquar. Trasconiens.* p. 140.

v* *Duodecim. quæstion.* p. 7.

§. XIV. *Alia conjectura.*

Paucis verbis tangimus Cl. *Mosca* sententiam, qui aerem internum corporum omnis generationis x & corruptionis, & fere omnis in rerum natura mutationis, causam facit: aut Cl. *Tabor* y, qui ab eo elemento motum muscularem repetit.

Fixorum elementorum, quæ in cibis sunt, adquisitam in animalibus naturam volatilem, aeri *Helmontius* acceptam refert. Sanguinem ab aere resolvi z plurimi consenserunt, ut etiam ideo in aere non renovato animalia perire crederent, quod satiata parte dissolvente reliqua effeta supersit a. *Robertus Whytt*, vitale quid stimulans in aere suspicatur esse b, quod sanguini commistum in cor operetur.

§. XV. *Aerem elasticum in sanguine esse non videtur.*

Contra hæc doctorum virorum placita nunc, quæ *Præceptor* noster c, alique principes viri dixerunt, sequitur ut proponam. Aerem quidem in sanguinem venire nemo, puto, negat, sed dissolutum d in aqua, & in ea, tamquam sal

x T. I. p. 280. *Idem* aerem causam vitæ facit, etiam si enim alia elementa ad vitam conferant, monet tamen, omnia animalia continuo perire, quando aerem subtraxisti T. II. p. 4.

y p. 223.

z *Blas human.* p. 45.

a *Birch* T. III. p. 454.

b p. 54.

c *J. R. M.* n. 201.

d *Bohn* p. 64. cum crassiori aere neget recipi: *Zerilli Giorn. de Lett.* T. IV. art. 6. *Supplem.* T. III. art. 2. *Camerar. antl. pneum.* p. 12. *Musschenbroeck* diff. cit. *J. de Gorter*

aliquis solet, colliquescentem, ut omnino naturam elasticam non exferat *e*, præter eas, quas diximus, conditiones. Quibus argumentis moti viri Ill. ita maluerint sentire, ex ordine enumerabimus.

Primum ex ea ipsa dissolutione ingeniose, ut solebat, ostendit *Præceptor f*, omnino novum aerem in sanguinem recipi non posse. Si enim saturatus fuerit aere sanguis, nunquam recipiet *g*. Si non saturatus fuerit, recipiet quidem, sed is ipse ex natura elastica in fixam transibit *h*.

Porro præter naturæ analogiam quidem videretur fore, si alia aeris in sanguine dissoluto natura esset, quam est in alio quocunque fere liquore, aqua, oleo, alcohole; præter solas aquas minerales & liquores fermentantes, qui sponte spumescunt, & in quibus aer verus elasticus admixtus neque solutus adest.

Hæc suspicio confirmatur, siquidem omnino in sanguine nulla aut compressio, aut expansio reperitur.

de perspir. p. 154. Schwenke mus auctor *Elem. de physiol.*
 p. 86. J. G. a Bergen in propria p. 287. Hales hæmostat. p. 244.
 oratione; Highmor p. 711. Diebold diff. cit. Felice in *Ar-*
Diemerbroeck p. 314. Needham buthnot of air. p. 166.
de form. fetu c. 6. A. Pitcarne de e *Musschenbroeck* p. 22. *Sau-*
mole qua sanguis n. 8. Lister de vages, Diebold, Senac *essais*
cocbl. p. 51. Cokburne animal. p. 566. 569. Hinlopen in diff.
æconomy p. 120. Michelotti l. c. utrum aer cum sanguine per
 p. 16. J. Lang *physiolog.* p. 159. *pulmones transeunte misceatur*
 Boerhaave ubique, & *Elem.* Traject. 1755. Hoadley p. 61.
Chem. T. 1. p. 525. Stephenson 64. 65. & priores omnes.
mechan. practice. Bulfinger f Boerhaave *prælect.* p. 210.
Comm. Acad. Petrop. Ill. p. 235. 211.
Sauvages Assembl. de Montpel. g p. 183.
 1743. Hamberger *physiol.* p. 164. h p. 183. 184.
 Kruger *dietet.* p. 194. Anony-

reperitur. Nam ab aere gelido aut tantum ad $\frac{1}{400}$, ut in tubulo hiemali sub aeris frigore nullo visibili spatio subsederit *i*, aut ad $\frac{1}{600}$ *k* sanguis addensatur, aut nihil quidquam *l*: ab embolo autem omnino in minus spatium reduci non potest, cum aer possit *m*. Si vero omnino aliquantum a calore sanguis rarefit, id quidem cum omnibus certissime aeris elastici expertibus humoribus, & ipsa cum aqua commune habet *n*. Oleum calore corporis humani a 40 ad 39. densitatis gradus rarefit, & a 15 ad 14 a calore aquæ ebullientis *o*. Ipso calore sanguinis sanguis a 96 ad 120 gradum dilatatur, ut volumen ejus $\frac{1}{517}$ augeatur *o**. Aliquantum sanguinem comprimi posse non miraberis, cum nuper demum compertum sit & aquam & spiritum vini, & olea aliquantum comprimi posse, ut tamen ea ratio exigua sit, & 44. 48 atque 66. per millionem divisio *o***.

Porro viam in pulmones, qua aer possit vasa aerea subire, accuratissime scrutatus est Cl. *Bulfingerus p*, & cum bullas utique vidisset in sinistras cordis caveas venire, studiose inquisivit, num ex potius a compresso sanguine, quam ab admissa aere venirent. Multoque procul dubio major vis est, qua in teneræ bestiolæ vasa

i Aurivillius diff. cit. p. 52.

53. *k* Sauvages physiolog. p. 106.

l Idem effets de l'air p. 48. de glaciali frigore.

m Idem effets de l'air p. 21.

n Musschenbroeck n. 980.

o Robinson operat. of medic. p. 35.

*o** Falconer bathwaters T. II.

*o*** Phil. Trans. V. LIV.

p In toto commentario, quem ex actis Petropol. excitavimus.

a viribus humanæ expirationis pellitur, quam aeris est, in legitima inspiratione in pulmonem nitentis. Potuerunt a nimia violentia impulsus spiritus rupta fuisse *q*. Quam enim immeabilis sit, & quam facile ab humidis membranis *r* excludatur, dudum ostendimus *s*, & quanta vis mucæ vesiculas obducatur *t*, in quo diutissime aer retinetur *v*.

Addebat *Boerhaavius*, neque dum inspirat *x* animal, aerem in pulmonis sanguinem recipi posse, tunc enim venas super vesiculas tenfas arctari: neque in expiratione *y*, tunc enim aerem exprimi *z*.

Qui aer bullarum specie in vivorum animalium sanguine visus est, is per vulnera subiit *a*, neque in iis animalibus reperitur, in quibus cautum est, ne vasa violarentur. Hinc nulla unquam, tot in experimentis, aeris bulla visa *Leeuwenhoeckio b*.

Cl. *Bertier* experimenta ne Cl. quidem auctori satis firma visa sunt *c*.

Qui aer in cadaverum venis adparet, is putredinis effectus esse potest, quæ aut a morte accesserit, aut in ipsa jam vita *d* ceperit nasci, aut

q *Mem. avant* 1699. T. II. p. 207.

r *Sauvages Mem. de la Soc. de Montpel.* 1743.

s T. VI. p. 294.

t *ib.* p. 245. 246.

v *Musschenbroeck* p. 31.

x J. R. M. l. c. *Musschenbroeck* p. 34.

y Ita *Targirus* p. 150. 151.

z p. 35.

a *Memoir. sur le mouvement du sang exp.* 17. p. 188.

b *Phil. Transf.* n. 145. & oper. T. II. p. 214. 270.

c p. 322.

d G. v. *Swieten* T. II. p. 234. *Huxham* *sore throat*, p. 60. 61.

demum , ad nostros enim fines perinde est , ad fermentationem pertinet , quæ putredinem præcedit. In morbis enim acutis , dum vivunt homines , sanguinem computrescere *e* , & spargere odorem cadaverum , quem ipsi funesto omine ægri percipiant , & ipse vidi , & alias citavi *f*. Hinc hieme non adeo frequenter , æstate perpetuo *g* is aer adparet. Hinc bullas illas spumeas in corde nunquam nisi manifestis cum signis putridæ corruptionis vidi.

Emphysemata gangrænosa manifesto a putredine sunt *b*. Putredo inter eas causas est , a quibus aer generatur , nempe ex fixo habitu in elasticum restituitur. In tympanite conspicuus redditur ; qui enim cavea intestinorum continebatur *i* , is nunc expansus in cellulosam telam viam sibi aperuit *k* , ut in aliis etiam membranaceis sacculis solet , eaque tela rupta & ipse in cavum abdomen erupit.

Quæ experimenta in vacuo spatio facta sunt , non plus ostendunt , quam dissolutum aerem in humoribus nostris reperiri , qui expediatur , dum externi aeris pressio removetur , qualis omnino aer in omnibus humoribus est , & in ipsa aqua. Sed etiam iste aer multum pro nostra sententia facit , siquidem sibi relictus sanguis , cum sua

e Cl. Gaber in *miscell. Societ. Taurin.* 85.

f T. III. p. 147.

g Klanke de usu venarum p. 28. conf. Heuermann oper. T. II. p. 281.

h Kirkland of gangrens p. 68.

Heuermann p. 280. Sauvages *maladie des bœufs* p. 13. Duntze exp. I.

i Ant. de Haen rat. med. T. V. p. 78. seqq.

k Vesicula fellis *Musschenbroeck* p. 8. arteria carotis p. 10.

arteria , qua gravior est , & fundum petit *l* : idemque sub inani spatio natat. Si enim in vitali humore elasticus fuisset aer & expansus , etiam tunc arteria sanguine plena innatallet aquæ , dum animal vivebat , aut certe cadaver a putredine liberum supererat. Elaterem nunc possidet aer , sed per mutationem , quæ cum vita animalis nequit consistere.

Nam aer , quando elaterem recuperat , tanta cum violentia se expedit , ut membranas dissolvat , vasa perrumpat , & hæc inprimis causa sit , cur in spatio ab aere communi libero animalia pereant *m*.

Diversitates illas sanguinis venosi & arteriosi alias refutavimus , quæ a colore sumuntur *n*. Sed etiam ante respirationem , in colore sanguinis arteriosi & venosi diversitatem apparere ostendi , in pullo incubato *o* , & in ranis , non nostro modo spirantibus , colorem sanguinis alium esse & alium *p* : inque testudine *q* : & etiam in vacuo spatio grumi inversio colorem elevat *r*. In antro lethifero extinctarum avium sanguis *s* non mutatur. Aerem ex sanguine eductum quod attinet , hæcenus meliõra experimenta dissentiunt , quod aliquanto tardius ex

l *Musschenbroeck* p. 10.

m *Nollet* T. III. p. 268. 271.

Camerar. antl. p. 3.

n T. III. p. 16. seqq. conf.

Cheselæen p. 179. & *Cl. Evers*

p. 5. &c.

o *Mem. sur le poulet* T. II.

p. 37. 38.

p *Sur le mouvement du sang* Sect. II.

q Sanguinem in arteriis rubrum , in venis atrum huic animali esse *Memoir. avant* 1699. T. II. p. 211.

r *C.A. a Bergen áimatopskopia* p. 6.

s *Connor antr. lethif.* p. 52.

venoso sanguine aer se expediat *t*, ut sensim tamen plures bullæ emergant *v*. Ex arterioso sanguine aliquanto promptius aerem dicunt exsolvi *x*. Et tamen in venis inprimis aerem vidi *y*, & alii ante me viri *z* viderunt, & in dextro cordis *a* ventriculo. Ut omnino nihil hic firmi, aut satis exquisitis, & pro rei dignitate repetitis experimentis, evicti adversarii proferant. Qui enim hanc aeris in venis pulmonalibus majorem copiam proposuerunt, non videntur machinis ad educendum aerem idoneis unquam usi esse *b*. Discrimen nullum invenit Cl. Diebold *c*.

Si vero omnino aer ad ruborem requiritur, ut lux ad colores herbarum producendos; si credere oportet *d* non certe infirmis Cl. viri J. Francisci Cignæ *e* experimentis, erit hic aliqua aeris utilitas, cujus veritatem experimenta evincunt, agendi modum non pervidemus. Certe ea summam speciem habent veri. Nam aeris solus contactus sanguini ruborem conciliat *f*, & ex ordine tot laminas *g* cruoris rubras reddit, quot aeri deinceps exponuntur. Inde, dum sanguis in spatio inani expanditur, sanguinis rubedo augetur *h*, educto vero aere

t Camerar. antl. pneum. p. 3.

Diebold p. 4. Pitcarne p. 47.

Boerhaave Prælect. p. 202.

v Musschenbroeck diss. p. 9.

x Musschenbroeck l. c. Diebold.

y p. 155. 156.

z ib.

a Behrens l. c.

b Mayow, Ferrein.

c l. c.

d Cl. Bertr.

e Miscell. Taurin. T. 1.

f p. 71.

g p. 72.

h p. 68.

denigratur *i* idem. Et oleo olivarum imposito sanguis *k*, uti ab aere arcetur, ita nigricat, etiam in illa suprema superficie, quæ alioquin florido solet esse colore. Viscera ipsa & sanguis in cadavere, qua aer contingit, florida rubescunt. Oricellæ etiam tincturæ & purpuræ muricinæ aer demum ruborem impertit. Sed hæc dudum expendimus.

Per omnes humorum inhalantium vias ad sanguinem aeri viam patere, certum est, qui in iis humoribus dissolutus pariter factus sit penetrabilis. Ergo cum vapore, quem de aere pulmo habet, advenit aer, & cum chylo, & cum cutanea inhalatione, cæterum ad penetrandam cutem parum idoneus *l*. Sed ne in infectis quidem verum est, aerem per cutem exhalare *m*. Cum vapore pulmonali eo facilius reorbetur, quod idem ab animali exhalatione quacunque elaterem amittat, fixumque in statum redeat. Aer acido vapore sulphuris inquinatus, in abdomen & thoracem animalis impulsus, dolorem fecit, & respirationem difficilem. Eodem reorbito, intra biduum animal ad se rediit *n*: Sed etiam vulnera pectoris, quæ aerem admitterunt, adeo facilia sanatu sunt *o*, ut aliquoties eam felicitatem admiratus sim, & in juvene potissimum, cui ensis interius quam sinistra papilla pectus transverberaverat, ut ex dorso

i ib.

k p. 71.

l *Musschenbroeck* p. 40. 41.

m *Bonnet Phil. Trans.* n. 487.

n *B. Langrish physc. exper.*

4. 5. 6.

o *Heuermann oper.* T. II. p. 232.

prodiret, non absque hæmoptoe, cui nulla nisi simplicissima medicatio chirurgica adhibita fuit. In ejusmodi sanatione necesse est aerem, qui thorace receptus est, vim suam elasticam depōnere, qua alioquin pulmones comprimeret *p*. Eodem modo per cellulosam telam dispersus aer resorbetur. Si elaterem in sanguine non retinet, de ejus efficacia non oportet quærere.

Quin cum humore per venas pulmonis resorbto aliquid acoris, per aerem natantis, ad sanguinem veniat, non recusamus. Id vero parum est *q*, neque vere nitrosum, neque effectum memorabilem edit. Siquidem, etiam cum ea acoris de aere accessione, tamen sanguis totus ad urinosam naturam inclinatur.

Liceat breviter hic errorem refutasse, qui passim recurrit, & etiam in physiologiam recipitur. Nitrum peculiariter frigus facere, & in aere boreali ventisque adfinibus majori copia contineri *r**. Neutrum firmum est. Cum nitrum ex animalium excrementis potissimum generetur, & urinosam naturam pro fundamento positam desideret, calidarum potissimum regionum partus est. In Africana terra *s* tantum est nitri, ut ex centum terræ libris sex uncias extrahant. In æere Quitensi *t*, sub ipso fere Æquatore, nitrum vulgo reperitur. In Ægypto *v* ex terra copiosissimum coquitur. Quod in Europa ad

p Conf. p. 131.

q Cockburne æcon. anim.
p. 120.

r T. III. p. 144.

*r** Home l. c. p. 145.

s Shaw travels p. 228.

t Bouguer p. 64.

v Journal des Savans 1685.

detestabilem illum militum usum adhibetur, ex Indostania potissimum advenit. In frigidis regionibus putredo rarior est & lentior, & minus velox circuitus, quo de terra plantæ & insecta formantur, inque terram vicissim redeunt.

In parando frigore nitrum nihil peculiare habet. Omnes sales medii in aqua dissoluti frigus faciunt, & sal ammoniacus, & marinus, & iste quidem, quam nitrum potentius: & ipsum denique nitrum ob salem marinum, quem plurimum admistum habet, fere refrigerat, longeque debilius frigus facit, quando purissimum est x.

Conjecturas refutasse vanus labor fuerit, quo possimus superfedere.

In avibus merito in caveas pectoris, abdominis, etiam in cellulosas cavernulas, aer recipitur, cujus manifesta sit utilitas, qua corpus volucrum leve reddit, quo possit per levissimum elementum natare. In pelicano y ave, quæ altissima quæque petit, aer in universi corporis cellulosum textum exit, & de otide diximus, quæ pellem inflat. Sed etiam ad tantum ea magna vis aeris forte congeritur.

§. XVI. *An aer sanguinem refrigeret.*

Antiquissima hæc, etiam ante *Aristotelem*

x *Reaumur mem. de 1734.*
p. 171. &c.

y *Memoir. avant 1699. T. X.*
& in ave *Noëtho Tachard voy.*

de Siam T. II. p. 246. in struthiocamelo Valisneri T. II. p. 416
Peculiares ad usus eadem est
facultas Chamæleonti *Idem ib.*

nata z, & communissima fuit theoria, sanguinis calorem in pulmonibus contemperari a. Ipsum simplicissimum experimentum ad eam opinionem invitavit, ex quo constat, nimium calorem aeris, ignis, motus muscularis, febrisve intolerabili nos molestia b adficere, quam frigidi aeris respiratio cum summa voluptate sublevet; neque fere instinctum fallere, qui nos frigidam auram captare jubet, quoties supra modum incaluisse. Accessit hypotheseos necessitas, cujus summa potestas est, postquam in corde ignem aliquem vitalem habitare, a primis fere medicinæ conditoribus creditum est c. Cor pulmonem exurit, ita in eo viscere facit desiderium aeris frigidi, apud *Areteum* d.

Cum *Cartesius* eundem in corde focum aleret e, etiam proprium ab aere refrigerium f renovavit: ut erat autem physices peritior, frigusque norat omnia corpora addensare g, ita etiam sanguinem in pulmone in minorem molem cogi docuit. Utramque hypothesein ejus viri schola tenuit.

z Vide ejus L. de spiritu c. 3.

a Aristoteles l. c. de vit. & morte c. 21. de respirat. c. 16.

b Helvetius Mem. de 1718. p. 244. Stevenson Essays of a Societ. at Edimb. T. V. p. 832.

c Hinc apud Galenum summa utilitas respirationis est conservatio caloris naturalis per refrigerium de usu part. L. 7. c. 9. de util. respir. c. 3. de dissect. instr. vocal. c. 3. & Harveyi exerc. de circ. sang. III.

p. 233. Solus is usus necessarius est H. Fabricius de respir. L. 1. fin.

d De caus. & sign. acut. L. II. c. 1.

e T. IV. p. 217. 218.

f Form. fet. p. 201. de homine c. 5. Sylvius diss. VII. n. 57. Swammerdam de respir. p. 96.

g De form. fetu p. 201. Sylvius diss. VII. n. 78. Swammerdam l. c. Diemerbroeck p. 313.

Cum tamen post contrarias egregiorum viro-
rum demonstrationes, labasceret & refrigerii fides
& condensationis, hanc potissimum *J. Claudius
Adrianus Helvetius* *b*, utramque vero *Georgius
Erhardus Hamberger* *i* defendendam suscepit,
novaque protulit argumenta, quem multi clari
viri secuti sunt *k*. Frigus autem & densitatem
evidentius quam *Helvetius* conjungit.

Helvetius quidem venarum pulmonalium par-
vitatem potissimum urfit *l*, earumque lumen,
quam sodalium arteriarum minus. Manifesto
inde adparere persuadebatur, sanguinem arte-
riarum pulmonalium in minus volumen com-
pressum fuisse, qui in minora vasa recipi
potuerit. Vere autem utique, venæ pulmonales
sinus sinister, & ejus nominis ventriculus, dex-
tro sodali, dextra aure, & arteria pulmonea
minorem habent aream *m*.

Ideo sanguinem arteriosum, venoso densiorem
esse pergunt, quoties animal respiravit in ratione
 $108 \frac{1}{5}$ ad $106 \frac{1}{5}$ *n* & 482 ad $464 \frac{4}{5}$ *o*. Sed
etiam, cum canem pene strangulasset vir Cl.
densitatem arteriosi sanguinis ad venosi sanguinis

b *Mem. de 1718. p. 222. seqq.*
& in *Eclaircissement* p. 22. quæ
seorsim prodierunt: *le Cat mem.*
sur le mouvement des muscles.

i *Physiol. c. 5. p. 117. seqq.*
de respirat. n. 66.

k *Sauvages de inflamm. p. 244.*
Kruger physiol. n. 204. Schaar-
schmid Berlin. Nachr. T. VI.
p. 152. 153. physiol. T. I. p. 213.
599. &c. Gumprechts in Cl.

Loesche mat. med. p. 409. Ita
sentit extra Cl. viri scholam
Cl. Douglas on the generation of
heat p. 88. & J. Shebbeare p. 138.
& Bryan Robinson Prop. 22. 23.
& Cl. Mosca T. I. p. 270.

l p. 167. 168. 169.

m p. 169.

n *Hamberger physiolog. p. 73.*
in cane.

o *ibid.*

densitatem saltem reperit , ut 413 : 407. cum autem libere respiraret , aucta densitate , ut 417 ad 407 *p.*

A solo autem aeris contactu sanguinem & rubicondiorem fieri , & densiorem *q* , sed cum densitate fluiditatem augeri *r* pergunt.

Hanc addensationem omnino summæ necessitatis esse , cum sanguis in corporis universi venis rarefiat *s* , non transiturus per pulmonis venas , nisi in pulmone legitimam densitatem recuperasset *t*.

Frigus a densitate alioquin difficulter separari potest. Si enim ab aeris in glacie evoluti rarefactione recesseris , per universam naturam omnia densantur a frigore , & a calore rarescunt. Refrigerari vero in pulmone sanguinem , manifestum videtur , cum in amplissima superficie *v* , calens ad 96 gradus sanguis aeri exponatur , non supra 76 gradum in Europæ umbrosis facile calenti , frequentius verò , & passim incredibili ratione frigidiori , ad 80 *x* & 125 fere infra primum glacialis frigoris gradum *y*.

Inter eum calidum sanguinem , & frigidum aerem , tenuissima membranula est *z* , millesima , ex clari viri calculis , parte pollicis non crassior.

p Idem *p.* 2.

q *Helvetius* *p.* 233. seqq.

r *Eclairciss.* *p.* 50.

s *Helvetius* *p.* 240. 241. &c. *Hamberger* *p.* 110.

t *p.* 243. 244.

v Refrigeratio sanguinis est in ratione superficierum contingentium *Robinson Prop.*

22. Superficies æstimata est pollicum 20000.

x Eo se extendere frigus summum *Reaumur Mem. de l'Acad.* 1736. *p.* 486. nempe 38. gradus infra congelationis punctum.

y *T. VI. p.* 313. *Maty Journ. Brit.* Aug. 1750.

z *Hales hæmest.* *p.* 97.

Ergo ex sanguine tantum in aerem transit caloris, ut aer, qui paulo post de broncho exspiratur, omnino ad 96 gradum caleat. Existimant autem Cl. viri tantum de sanguine decedere caloris, quantum ab aere acquiritur. Si ergo aer atmosphæræ *a* ad 10. sanguis ad 64 gradum caluerit, adscendere credunt halitus calorem ad 46. & ut adeo omnino 36 graduum caloris fuerit discrimen, quos aer acquirit retentis mensuris *Stephani Hales*.

Quare sola abstinentiâ a respiratione nos vehementer intalescere *b*, & incredibili molestia adfici monent, quando aer frigidus nobis negatur *c*. Esse qui in calido aere pereunt *d*, & ex hominum genere & animalium, & quæ non pereunt, ea tamen molestias maximas pati *e*. Sed a frigore continuo refocillari *f* eos homines, & bestias.

Non valde nunc interest, in tam parva aeris a sanguine distantia, num omnino in sanguinem malis aeris nitrum ducere, num unice calorem

a *Idem* ibid. p. 98. alio tamen aeris posito calore.

b a 64. gr. ad $65\frac{1}{4}$ p. 102. inde ad 69. 96.

c *Stevenson* *Ess. of a Soc. at Edimb.* T. V. p. 831.

d *Lininghs* *Phil. Transf.* n. 487. aere calente ad gr. 126. *Douglass* *Hist. of new England* T. II. p. 215.

e *Helvetius* p. 242. Vide & *Boerhaavii* experimenta & Cl. *Dantzii*. Imprimis respirationem amittit animal, & computrescit exp. 1. 2. 3. & perit in

gradu fahrenheitiano 113. 115.

122. *Idem* ibid. In thermis Carolinis æstus tolerari nequit *Springsfeld vom Carlsbade* p. 262

neque 40 gradus *Reaumurii* le *Monnier* mem. de 1747. aut

$38\frac{1}{4}$ circa Senega fl. *Mem. de*

1738. p. 402. Sed ne 100. quidem fahrenheitianos gradus

Plancus ferebat bagni de *Pisa* p. 40. Pulsus inde celerrimus,

debilis, irregularis *Mem. de* 1752. p. 637.

f *Duntze* &c.

ex sanguine in aerem malis migrare , non admisto elemento g.

§. XVII. *Ad propositam opinionem animadversiones.*

Pulmo ad refrigerium non est factus.

Primo quidem certum est , aliquo gradu in pulmone sanguinem refrigerari *b*. Cum enim aer in pulmonem receptus a sanguinis contactu incalescat , non potest non sanguis , dum aerem calefacit , hactenus aliquid de suo calore amisisse. Et amittit non unice in ratione densitatum , nempe posita mole utriusque fluidi æquali millesimam partem sui caloris , quæ diversitas pene nulla foret , sed in ratione molium utriusque fluidi *i* , quæ ratio refrigerio favet. Aeris recepti si viginti uncias posueris , sanguinis simul in pulmone existentis non multo plus ponere licebit , cum totius visceris pondus exiguum sit , multumque habeat membranarum.

Non ideo refrigeratio sanguinis naturæ pulmonem creantis finis esse potuit *k* , neque ea est pulmonis efficacia. Tum demum recte diceretur sanguis in pulmone refrigerari , si calidior in venis & in arteria pulmonali adveniret ,

g Quæ opinio *Helvetii* fuit *Douglas of animal heat* p. 87. p. 231. 238. Sed iste dimidium omnino calorem ait perire.

b Schreiber Almagest. p. 340. *i Boerhaave Elem. Chem.* 341. *Hales* p. 105. *Boerhaave* J. R. M. n. 202. *E. Barry* ill. T. I. p. 269.

viri discipulus *Diseases of the* *k Schreiber* l. c. Non esse *lungs* p. 134. *Shebbeare* p. 138. *Albinus nat. hom.* p. 50.

frigidior inde in sinistro corde, inque arteriis reperiretur. Nunc ejusmodi nihil, ne per conjecturam quidem dictum est unquam. Sinistri enim cordis, & arteriosi sanguinis *l* idem est, qui dextri ventriculi venosique sanguinis calor, non ergo sanguis in pulmone refrigeratur. Idem denique pulmonis cum reliquo corpore calor est.

Simplicissimi argumenti *m* vim miror Cl. viros non sensitisse. Cl. *Hambergeri n*, quam a densitate sanguinis arteriosi excusationem repetit, eam continuo tollemus, neque enim id quidem verum est, sanguinem arteriosum ulla certa fide venoso densiorem esse.

Porro, si sanguis in pulmone ab aeris contactu aliquantum refrigerii patitur, & tamen in sinistro ventriculo non est frigidior, sequitur ex ipsa pulmonis natura calorem generari in sanguine, qui hoc refrigerium compenset, atque adeo pulmonem adeo non refrigerando sanguini paratum esse, ut illum potius calefaciat. Accurate id ostendit Cl. *Hales o* & mensuram dedit ejus caloris, qui in sanguine per pulmones circumeunte generatur: quem æstimat in duobus minutis *p* ad pene unum gradum adscendere eorum, quorum 64 faciunt calorem sanguinis, & ad sesquigradum ergo fahrenheitianum: atque adeo intra dimidiam horam ad paulo plusquam $\frac{5}{4}$ gradus *q* sui, sive ad gradus fahrenheit. $\frac{15}{8}$, & pene duos.

l Plerique majorem faciunt
Elem. de physiol. p. 298. *Arbuth-*
not of air p. 49.

m *Daoustenc de respir.* n. 42.

n p. 124.

o *Hæmastat.* a p. 98. ad 102.

p p. 102.

q *Ibid.*

Quibus ex calculis adparet, quam parum ab aere, etiam insigniter frigido *r*, sanguis refrigeretur. Tantum enim utique sanguis ab aere refrigeratur, quantum absque aere incallescere.

Sed ea omnia nimia esse ostendimus, quæ dicuntur de intolerabili aeris calore, quando humani sanguinis calorem æquat. Vivitur in aere æque calido, quam est sanguis, a quo adeo nullum refrigerium sperari potest: vivitur in aere, qui sanguinis calorem superat. Vivit nempe embryo, & fetus in materno utero, quando nullum, nisi a sanguine matris fotuque calorem habet: vivit in ovo pullus, quando calorem incubationis experitur, multo eo calore majorem, quem suo corde generat, cum a gallina remotus, sibi suisque circuitus viribus relictus continuo frigescat. Sed in aere immensum suo sanguine calidiori pisces vivunt *s*. Non minus enim eget aut piscis, aut fetus sanguis, condensatione illa a frigido aere nata, siquidem rarefactio vitiosa fabricæ venosæ tribuitur, quam piscis cum calido, fetus cum adulto animale communem *t* habet. Vivunt demum & homines, & animalia, in aere adeo calido, ut thermometrum ex libero aere sub alas *v* remotum descendat. Absque ergo refrigerio vivi potest, quod ab aere advenit.

r Aerem ponit calentem 10 gradibus, quorum in sanguine sunt 64.

s T. III. p. 58. In thermis Pisanis, quarum calor ad calorem corporis humani se ha-

bet uti 30 ad 26. tamen locis liberis ranæ vivunt *Cocchi bagni di Pisa* p. 59.

t *Hamberger* n. 185. *Helvetius* p. 240.

v T. III. p. 62.

Addi possunt aliorum Cl. virorum experimenta x.

§. XVIII. *De addensatione sanguinis in pulmone dubitatur.*

Addensationem sanguinis, quæ ab aere fit, ex communi quidem frigoris natura deduxerunt viri Cl. quod corpora quæcunque pariter densat, uti a calore rarefcunt. Quam parum vero ab ea causa sperari possit, jam ostensum est, cum ab ipso gelu sanguis vix mutetur, & in temperato aere sanguinis addensatio, etiam a Cl. *Hambergeri* amico, non supra $\frac{1}{910}$ æstimata sit, & denique in pulmone omnino sanguis non refrigeretur y, neque arteriosus sanguis ulla certa fide venoso sit densior z.

Sequitur ut ostendatur, cur ergo venæ pulmonales suis arteriis adeo raro exemplo arctiores sint, siquidem sanguis in pulmone non addensatur. Primum multo major est diversitas diametrorum in utroque vasorum genere, quam quidem ullo modo a minima illa in pulmone refrigeratione expectari possit, etiamsi non compensaretur, & frigus ab aere acceptum in sanguine venæ pulmonalis maneret, ut quidem certo non manet. Nam integra duodecima parte
minor

x *Strack de respir.* Erfurt 1748. *Borellus prop.* 96. *Boerhaave J. R. M.* n. 202. In congelatione cruor minus, quam aqua dilatatur *Diebold* p. 22.

y *Sauvages physiolog.* p. 106. z T. III. p. 14. 15.

minor est *a* diameter venarum pulmonearum, cum diametro fociarum arteriarum comparata. Sanguinis vero densatio pene millesimæ, si ulla est.

Quare alii clari viri crediderunt, sanguinem per venas pulmonales celerius ferri posse *b*, atque ita fieri, ut per angustiores canalem plus sanguinis, & tantundem transeat, quantum per canalem latiore, lentiori motu transit. Non veram solutionem esse quæstionis, recte ostendit *Helvetius c*, cum etiam ventriculus sinister dextro major sit, non possit autem per eum ventriculum velocius, quam per dextrum sanguis fluere, quorum uterque intra idem tempus evacuatur.

Satis accedit altera *Ill. Mekelii* conjectura, venas pulmonis angustiores esse, quod facilius in ampliorem sinum se inaniant *d*, quam in minimas nascentes venulas arteriæ.

Contra *Helvetianam* porro condensationem dictum est, in fetu sanguinem venæ cavæ *e* omnem in aorta multo minori contineri, neque tamen aliquem eo tempore fuisse pulmonem, qui venosum sanguinem in minus volumen cogeret: objectum est, nihil ex diversis venarum & arteriarum pulmonalium diametris sequi, cum etiam auricula dextra suo ventriculo major

a T. VI. p. 274.

b *Santorin.* p. 148. *P. A. Michelottus Epist. ad Font.* p. 30. 32. *Pujati de morb. Naron* p. 98. *Senac* p. 352. *Rationes* addit *Michelottus*, *carnea-*
Tom. VII.

rum fibrarum numerum, situm declivem &c.

c *Eclairciss.* p. 30.

d *Memoir. de Berlin* T. 12. p. 55. & 1750. p. 177.

e *Michelotti Epist.* p. 44.

fit *f*, & tamen in ea auricula sanguis non condensetur. Ab aliis Ill. viris dextrum ventriculum sinistro ampliorem esse, scriptum est, quod non penitus evacuetur *g*, & quod non totus repleatur, sinister vero perfectius sanguine suo plenus sit *h*.

Nobis hic summa videtur esse naturæ simplicitas. Sæpe contemplatus in cadaveribus diversas venarum amplitudines, modo sponte naturæ eas venas enormiter crassiores factas fuisse vidi *i*, alias ab arte & injectione anatomica *k* mire turgidas reperi. Satis inde manifesto cognovi, venas adeo tenues, mirum in modum dilatari, siue plus in eas humoris veniat, siue minus expedite is effluat, quem receperunt. In pulmonis exemplo facile vidi venas cavas, & auriculam dextram, ampliores esse, quam pro aortæ portione videtur necesse, quod in plurimis corporis humani conditionibus, in nixu, aliisque sanguinis per pulmones manaturi retardandi causis, hæ venæ sanguinem a corporis universitate recipiant, sed expedire non possint *l*. Nihil ergo simplicius, quam eas venas intumescere paulatim, & lumine augeri, uti in animalis pulmone minus expedita via fuerit: omnino uti ostendimus, auriculam dextram *m*, ejus lateris ventriculum *n*, sinum sinistrum *o*, & demum

f Besse replique à M. Helvetius p. 149.

g Senac traité du cœur p. 349. 350.

h Michelotti Epist. p. 35. Senac p. 346. 347.

i L. VI. p. 311. 312.

k L. II. p. 241.

l p. 118.

m L. IV. p. 270. 271.

n Ibid. p. 280.

o Ibid. p. 288.

ventriculum ejus lateris *p* ampliores fuisse, quoties aliqua harum cavearum difficilius se inaniebat. Etiam hoc probabile, ad futura per pulmonem impedimenta *Naturam* providam respexisse *q*, quando dextras cordis caveas ampliores fecit. Id consilium demonstrationi proximum omnino est, cum etiam nostris magis vasta spatia in venis *Eadem* in iis animalibus præparaverit, quibus longior sub aquis mora, ad vitam sustentandam necessario requiritur, ut phocæ *r* aliisque amphibiiis. Si vero in venis cavis, & in auricula dextra, ob pulmonis obstacula sanguis retardatur, perinde idem in ventriculo dextro morabitur, inque arteria pulmonali, & perinde debilem aliunde ventriculum distendet *s*, facilemque extensu arteriam *t*.

Porro conjecturam nostram confirmavit egregie Ill. *Mekelius*, quando vasa cordis sani hominis cum iisdem vasis hominis comparavit, cui sanguinis circuitus impeditus fuerit. Aorta nempe in sano homine aliquanto, quam arteria pulmonalis amplior est, in ratione 12 & 11 $\frac{1}{2}$ ad 11 v. Verum cum aorta perangusta foret in ipso abdomine, & in aditu ex corde diametro esset 8 x unice linearum: cum adeo cor sinistrum maligne se inaniret, inversæ omnes sunt rationes priores, & arteria quidem pulmonalis

p Ibid. p. 292.

q Conjectura est *J. Dominici Santorini* p. 149. tum nostra, & *Sam. Aurivillii* l. c.

r Eam historiam Ill. *Mekelio* debemus.

s *Mekel* T. 12. p. 55.

t *Idem* p. 53. 54. 55. A diametro 11 ad diametrum 15 lin.

u p. 258.

x *Mem. de l'Acad. de Berlin* 1750. p. 167.

solito major 13 lin. habuit diametrum, & tamen venæ pulmonales, quam arteria ampliores fuerunt, in ratione 169 ad 152.

In alio exemplo, cum valvulæ venosæ sinistræ duriores essent, & venosum ostium sinistri ventriculi non ad naturæ modum pateret, sinus sinister multo quam prius latior, & ventriculo sinistro duplo amplior fuit *y*, & arteria pulmonalis fuit 11 linearum, & demum distenta lin. 15. cum aorta haberet lineas octo.

Iterum in alio exemplo arteria aorta perangusta, & inanis, ad $\frac{1}{10}$ pollicis crassa fuit, lata decimas linearum 7. 2. Una ventriculus sinister amplior erat, & debilis *z*, & valvulæ aorticæ laceræ, arteria vero pulmonalis amplior, & 12 lin.

Iterum in alio exemplo aorta crassa, intus scabiosa, tuberculosa fuit, cum petrosis laminis, & una ad 9 lineas arctata. In eo cadavere ventriculus sinister crassus erat, arteria pulmonalis vero 12 lineas lata *a*. In morbis etiam ostendimus perpetuo latiore fuisse cordis ventriculum, qui difficulter se suo sanguine liberabat.

Adparet, quoties obstaculum aliquod evacuationi receptaculi obstat, toties & id receptaculum intumescere, & ea vasa, quæ in id receptaculum se inaniunt.

Altera pars nostræ theoriæ erat, etiam absque dilatatione dextrarum cavearum cordis, ab ipsa

y *Mém. de l'Acad. de Berlin*
T. 12. p. 55.

z *Ibid.* p. 61. 62.

a *Ibid.* p. 62. 63.

Natura dextra receptacula sinistris ampliora parata fuisse. Id utique manifestum est. Nam auricula dextra in fetu omnem omnino de toto corpore sanguinem accepit, cum sinistra eo omni privaretur, quem arteriosus ductus de sanguine in pulmonem tendente avehit. Merito ergo ea auricula, quam sinistra, amplior est. Iterum arteria pulmonalis recipit eum sanguinem, quem ductus arteriosus amandat, & qui venas pulmonis præterlabitur. Merito ergo & ipsa suis venis major est. Denique ventriculus dexter non accipit equidem sanguinem, qui per foramen ovale meat, & quem sinister ventriculus habet; sed jactura sanguinis per ductum arteriosum aufugientis major est, quam accessio sanguinis per foramen ovale transeuntis, cum is ductus hoc foramine multo sit amplior *b*. Quare etiam in fetu ventriculus dexter sinistro major est.

Vides in ipso fetu jam ea omnia esse discrimina dextrarum cavearum a sinistris, quæ in adulto homine supersunt, & illas istis ampliores esse, prius omnino, quam aer ullus ad embryonis in suo utero contenti sanguinem accessum inveni-
nerit, præparatumque esse a *Natura* ad futuros vitæ usus, quodcunque a cruoris aucta densitate nostri repetunt. Eam autem in dextro latere laxitatem, etiam post clausum foramen ovale, & obstructum arteriosum ductum, homo adolescens conservat, quod & frequentes causæ

b Conf. programm. de foram. ovali in *fascic. Icon. anat. IV.*

recurrant , quæ sanguinem in pulmone retineant *c* & sinistra receptacula robusta sint, hinc sanguinis vi dilatanti melius resistent , & ipsis dextris vasis se depleturis sint pro obstaculo. Vicissim dextra vasa, auricula *d*, ventriculus *e*, arteria *f* pulmonalis, magna ratione tenuiora sanguini distendenti facilius obediunt.

Huc referri potest eorum sententia, qui pulmones pro sanguinis diverticulo habuerunt, in quod superfluous sanguis *g*, certe in quibusdam vitæ conditionibus, nixu, cursu *h* se recipiat.

Est etiam Ill. *Aurivillii* conjectura, venas pulmonales angustiores factas esse, ut sanguis celerius fluat, & majori stimulo cor sinistrum irriteret *i*.

Nondum de condensatione sanguinis *Boerhaaviana* dicimus, quæ absque frigoris vi per pulmonis fit fabricam.

§. XIX. *Vera pulmonis utilitates.*

Inhalatio.

Si neque elasticus aer sanguinem subit, neque aer frigore suo cruorem in eo viscere addensat, non ideo nihil ab aere habemus. Uti in omnes

c In omni clamore, nixu, cursu, labore nimio & tot aliis causis quas enarravimus.

d L. IV. p. 123. 124.

e Habet se ad dextrum ut 4 ad 1. *Mekel* T. 12. p. 55.

f Robora sunt ut 74 ad 55. p. 158.

g *Lister de humorib.* p. 2. de *tochl.* p. 56.

h *Sauvages effets de l'air* p. 46. 47.

i n. 31.

cellulosas caveas venæ bibulæ *k* suis osculis hiant, ita & in hanc nobilissimam, sed ejusdem fabricæ, cellularum congeriem, similes venulæ aperiuntur. Perinde enim injectus humor tenuior de vena pulmonea in universum visceris habitum facillime se diffundit *l*, & demum per asperam arteriam multo cum aere exit, spumofus, ne colore quidem deposito, si ex plantarum succis is mutuatus fuerit. Eandem viam & aquam *m* de aere sequi probabile fit, etiam in catarrhis, & vapores, quibus resorbtis obstructa vasa sanguinea pulmonis efficacissime nonnunquam solvimus, quale exemplum in gravissima peripneumonia vidi, quando vapore exhalantis aceti ad *Severini n*, & *Præceptoris Boerhaavi* consilium sumpta, suavissimum nostrum ante triginta annos amicum *Johannem Gesnerum*, optimæ tunc spei juvenem, nunc summum botanicum, naturæque cultorem, optimumque virum vidi convaluisse. Eandem viam etiam subtilis vis terebinthinæ *o* sequitur, quæ per aerem obvolitans, & respirando absorpta, ipsum lotium suo tingit odore. Similes viæ sunt, quæ in ulceribus dorsi, & pulmonis, terebinthinam a chirurgo adhibitam resumunt, ut etiam saporem suum in ore repræsentet, & suas per notas manifesta exscreetur *p*.

k Boerhaave, Bouillet assemblée de 1743.

l T. VI. p. 268. seqq.

m J. de Gorter de perspir.

p. 154. Kruger diætet. p. 94.

n Chirurg. effc. p. 182. conf.

Barthol. L. IV. hist. 88. de vaporum in morbis pectoris usu.

o Conf. Mem. de l'Acad.

1707. p. 167.

p Journ. de Medec. Dec. 1757.

Eph. Nat. Cur. vol. X. obs. 40.

Eandem forte pestilentia contagia *q*, & variorum virus legunt: certius autem ipse aer. Istud enim elementum, in pulmone naturam elasticam amittit *r*, adeoque in aqua & vapore facile fit resolubile, tantaque copia cum in nostris sit humoribus, cumque adeo proximum ex vesiculis aere plenis in venulas resorbentes iter sit, hac etiam potissimum via in sanguinem venire videtur. Cum *Hippocrates* aerem inter nutrimenta corporis numeraverit *s*, & cum solidissimæ quæque partes animalis plurimum contineant aeris *t*, eumque emittant, dum dissolvuntur *v*, inque sua elementa dilabuntur, valde probabile fit, glutinis loco aerem esse, quod elementa terrea uniat *x*.

Quin etiam aliæ de aere cum aqua & vapore miscibiles particulæ ad sanguinem veniant, minime dubitaverim, etsi de earum natura nihil constet. Electricum ignem cum lente recipiat aer & lente dimittat *y*, num per hanc viam resorbeamus, non dixerim, non vero repugno.

Latam pulmonis superficiem aquulam de pectoris cavea forbere, non dubium est. Nam & injecta venis ejus visceris aqua per commune velamentum exsudat *z*, & vulnerarii medica-

q Schreiber de peste obs. 9. ut ne quidem per vulnera, vasa cutis, aut lac resorbeatur obs. 8. 10.

r T. VI. p. 338.

s Peri trophys.

t T. VI. p. 298, 299. Hales ve-

get. stat. exp. 119. Plus aeris dat cornu quam sanguis.

v T. VI. p. 300. 301.

x Hales^o ibid. Desaguliers T. II. p. 403.

y Beccaria lett. sull' elettricismo.

z Boyle poros. corp. p. 44.

menti in cavum pectus effusi sapor & odor in ore percipitur *a*.

§. XX. *Exhalatio pulmonalis.*

Inconspicua est pulmonum vis bibula, exhalatio manifesta *b*, quam continuo in aere densari, nubisque in modum de ore hominis adscendere videmus, quando aeris calor ad 40 aut 43 fahr. gradus subsedit *c*. In cuniculis subterraneis, cum aer densior esset, & argentum vivum ad integram unciam in barometro adscenderet, in temperie tamen 53 graduum fahr. & pulmonalem exhalationem vidi, & cutaneam, quæ vix alio modo sub sensus potest revocari. Manifesta copia *d* est, mensura aliquanto difficilius definitur. In minuto primo horæ guttam, & si ea fuerit unius grani, 24 drachmas, sive uncias tres in 24 horis ex anima collegit *Johannes Floyer e*. Ad selibram intra 24 horas æstimavit *Sanctorius f*; aliquanto majorem commentator fecit *g*, dimidiam totius expirationis *Car. Aug. a Bergen h*, majorem *Cl. Stephenson i*. *Cl. Hales* halitum in calidissimos cineres *k* recepit, ita pondus dimetitus est, quo cineres a recepto

a Idem ibid.

b Altero tanto plus expiramus, quam inspiramus *Glisson hepat. hist. c. 39. p. 270.*

c *Hanow Seltenheit. T. I. p. 584. T. II p. 808. conf. Kaaw n. 114. seqq.*

d Brevi ex proprio habitu unciam unam collegi *seconde*

lettre de Verheyen p. 80.

e *Pulsewatch T. II. p. 336.*

f Sect. I. n. 5.

g *Lister ibid.*

h *Perspirat. viscer. p. 4.*

i *Mechan. pract. p. 31.*

k *Hæmastat. append. exp. 6.*

vapore increfcerent , reperit 17 granorum in 50 expirationibus , atque adeo , relato in calculos numero respirationum , intra 24 horas non minor erit exhalatio , quam libræ cum $\frac{32}{100}$ l. Ad 23 uncias æstimat Cl. *Home l**. Eo major autem vis est expirationis , quo vehementiori motu animal concaluerit , aut febre , in cane maxima *m* , quod ea bestia parum per cutem difflet *n*.

Naturam si requiris ejus , quod exhalat , imprimis aqua est. Aqua fuit , quam credulus alchemista o de sua anima , in amplissima vasa emissa , sensim collegit : aqua quam maximis etiam crystallinis sphaëris excepit *Bartholettus p* , & quam facile in speculum frigidum halando in guttas facias coire. Aquam etiam *Verheyenius q* vocat , aliique *r*.

Non ideo mera aqua fuerit : sed qualem humores nostri exhalant s. Oleoso volatili halitu prægnans , neque salis experts. Ejusmodi sale in crystallos t ex anima sua figuratum , etiam nitrosæ naturæ fuisse lego , etsi nitrum v ex mero halitu , absque unguine putredinoso , parari

l p. 329.

*l** *Medical. fact.* p. 238.

m *Quincy statiks* p. 46.

n *Floyer T. II.* p. 348. *Heucher oper.* p. 470. *Mead of poisons* p. 138. *Duntze* p. 20.

o *Santorius n.* 5. *Boerhaave de fabric. gland.* p. 6.

p *De respir. diffic.* p. 391.

q l. c.

r *Loescher anthropol. exper.*

p. 28. Pars aquea sanguinis & chyli *Hotdley* p. 40.

s L. V. p. 67, 68.

t *Bartholettus* l. c. apud *Bartholinum de pulmon.* Sect. V. p. 97. *Garmanus Epist.* 16. Eum sale alii ventriculi vaporibus , aut pulmonis alicui vitio tribuerunt.

v *Valisneri T. III.* p. 576.

posse minus probabile fit. Odoratum certe est, quod diffamur, nobis ingratum, canibus sagacibus notissimum, & proculdubio inprimis ejus vitii reum, quod aer contrahit, quando turba hominum in angustius spatium stipatur x.

Particulæ per pulmonem putrescentes potissimum diffantur, cum ad eam degenerationem humores nostri sponte inclinent x*. Hæ etsi etiam de cute cum perspiratione *Sanctoriana* perspirant, tamen per pulmonem copiosius aufugere videntur x** : Multo enim uberior hæc est exhalatio, quæ modico in frigore oculis conspicua reddatur, non perinde respiratio cutanea, quam demum in aere multo densiori fodinarum Clausthaliensum pariter de digitis fumantem vidi. Magis etiam odorata est anima.

Una aufugiunt particulæ alcalæscences x*** foetidæ, seu eadem fuerint cum putridis, ut vulgo putatur, seu conjunctæ.

Demum phlogiston superfluum ea via dissipatur x† adeo manifesto, ut homo in camera paulo accuratius clausa a pastu obambulans phlogisti portionem in aere ejus cameræ tertia parte augeat x††.

Non ideo sanguis refrigeratur, cum in sinistro corde non sit frigidior x†††; cavetur tamen ne nimium phlogisti in animale coacervetur summo cum ejus periculo.

x T. VI. p. 341.

x* L. V. p. 143. seqq.

x** *Hofman* qui eum finem faciendi pulmonis præcipuum fuisse putat.

x*** *Landriani*.

x† *Idem* p. 29.

x†† *Idem* p. 43.

x††† p. 190.

Hi nunc oleosi , & fætidī vapores sunt illæ *Veterum fuligines* , quas in foco illo cordis perpetuo generari , perque venam pulmonalem , ad eum finem duabus de industria valvulis , non tribus , clausam , & aliquantum hiantem , exhalare *Galenus* y docuit , habuitque pro primaria respirationis utilitate z , cumque *Galeno* tota schola. Neque nuperiores medici hic antiquitatem deseruerunt , neque res sua caret veritate. Utique enim ejusmodi acres & odoras particulas male retineri , vel ipsa earum venenata indoles demonstrat , quam collectæ exferunt. In verum enim venenum vapor abiit , quem de ergastulo tubus ventilatoris extraxit a. Quare nuperrime *Ill. Cigna* noxii humoris de sanguine secessionem pro præcipua utilitate habet , quam respiratio animali præstet.

Aerem denique dicit *Cl. Stephenson* , qui nimis diu in corpore animali circulum obierit , & sanguinem supra modum excalefaciat , atque in pulmone de sanguine exhalet b.

§. XXI. Pulmonis vis motrix.

In universo corpore humano cor quidem præcipua motus causa est c , accedit arteriarum

y *De usu part.* L. VI. c. 16.
L. VII. c. 9. de util. respir.

z *Idem* ibid.

a *Sylvius* diss. 7. n. 57. fere *Galenī* verbis. Materiem inflammabilem vocat *Swammerdam* p. 96. vaporem excrementitium *Hoadley* p. 64. fuligines

Sievers de circul. Perspirationem occultam *Lister de cochl. & de humorib.* p. 8.

b *Mechanical practice.* Aerem etiam ex levi arteria in asperam exhalare dicebat *J. Mery* *Mém. de l'Acad.* 1700.

c L. IV. p. 356.

contractio , & vis muscutorum , aliæque causæ minus efficaces , quas alibi enumeravimus *d.* Solus pulmo suum proprium habet motum , quo sanguinem promovet : aliter se autem habet ad sanguinem pulmones , aliter ad eundem vitalem in abdomine humorem.

Pulmonis quidem in mutando sanguinis circuitu efficacia potissimum est in laxitate vasorum , quam inspiratio facit , & in compressione , quæ est in expiratione. In priori quidem stadio vasa pulmonis undique in longitudinem majorem educuntur *e* , & pariter omnes diametri augentur , cum pectoris diametri omnes una incrementum accipiunt. Ita sanguis in spatium perpetuo laxius se effundit , facilitate majori , quam in ulla alia corporis parte facile sit nasci ; non alibi enim vasa sanguinem vehentia , in spatium levissimo elemento plenum educuntur , quod continuo amplius fiat , & minorem perpetim resistantiam motui sanguinis opponat. Aliis in arteriis sanguis in vasa perinde minima transit ; sed ea neque machinam propriam habent , a qua exporrigantur , neque pressio partium circumpositarum demitur , a quibus undique urgentur. Si resistantiæ subtrahuntur , superest , ut sanguis de dextro ventriculo in arteriam pulmoneam celerius se effundat , quam absque quidem aerea fabrica se effundere possit *f.*

Ita perinde pulmoni propria vis est , qua parietes pectoris in expiratione arctati *g* pul-

d L. VI. p. 79. seqq.
e p. 29 & 30.

f Ibid. p. 31. 32.
g p. 93. *Ferrein* l. c.

monem comprimunt, venasque pulmonales in sinum sinistrum evacuant, estque hæc vis quasi auctarium contractionis, quam arteriæ in sanguinem reliqui corporis animalis exercent.

Perpetuo variari eam pressionem certum est, ut per subsequentes gradus alternis vicibus & magis magisque laxetur arteria pulmonalis, & vicissim magis magisque urgeatur. Erunt hæc exigua in sana respiratione, majora in respiratione, quæ cum contentione fit, in clamore, nixu, anhelitu.

Effectus in sanguinem erunt, quos diximus, quando efficaciam descripsimus motus sanguinis, qui per arterias fit. Frictio *b*, e contrario concursus *i*, fluiditas *k*, dissolutio molecularum in minores *l* massulas, sive globulorum formatio *m*, singularum addensatio, rubor *n*, calor *o*: easque dotes sanguis & in arteria & in vena induet, cum aliis in corporis partibus potissimum in arteriis solis obtineantur.

In arteria præterea pulmonea separatio particularum dissimilium *p*, in vena miscela diversorum humorum *q*, frictio vero eo major locum habet, quo venæ lumen minus est *r*, & puncta contactus frequentiora. Cumque chylus nuper a vena cava & auricula dextra in ventriculum dextrum effusus fuerit *s*, utique hic

b L. VI. p. 191.

i ib. p. 204.

k ib. p. 209.

l ib. p. 197.

m ib. p. 257.

n ib. p. 258. seqq.

o ib. p. 215. seqq.

p ib. p. 276.

q ib. p. 340. *Hoadley* p. 45.

46. 61.

r Conf. etiam *Pujati* p. 101.

s L. V. p. 25.

primum, in minimis vasculis inter arterias venasque pulmonis positis, cum sanguine teretur, & miscēbitur *t*.

Hæc omnia in pulmonibus aliquanto, quam in corpore reliquo majora esse, vulgo creditur, cum ea viscera & cordis vim habeant, & arteriarum contractionem, cum reliquo corpore communes, & præterea proprias sibi, quas enarravi, alternas laxationis vices & compressionis.

Addunt vel ideo esse majora, quod circuitus sanguinis in pulmone celerior sit *v*: atque expectari possit, quadruplo auctam velocitatem sanguinis quadruplos effectus edere eorum, quos alibi in corporis animati arteriis sanguinem pati ostendimus. Neque quadruplo solum, sed decuplo *x*, 25^{ies} *y*, & quadragesies ter *z* demum sanguinem in pulmone, quam in muscutorum arteriis celerius ferri, cum venarum & arteriarum laxiores *a* sint anastomoses, & vis pre-mens peculiaris. Id ipso oculorum in ranis testimonio itur confirmatum.

Non celeriores esse motum, per venam pulmonalem monuit *Cl. Bussiere b* & nuper *Ill. Senac c* objecit, quod eodem tempore ea vena non plus

t Thruston p. 64. Borell. Shebbeare p. 138. Coqui chylum in pulmone Barry p. 70. 71.

v In vena pulmonali celerius, quam in cava, sanguinem fluere Lancisius p. 58. Rapiditatem summam esse in salamandræ aquaticæ pulmone Molyneux apud Birch T. IV. p. 305.

x Henshaw.

y Daoustenc l. c. n. 40. argumento usus, quod pulmo non superet $\frac{1}{25}$ corporis, non firmo certe.

z Hales hæmastat. p. 68.

a Phil. Transf. n. 280.

b Lettre à Mery p. 27. 28. 29.

c Traité du cœur T. II. p. 161.

sanguinis ad sinistrum ventriculum vehat, quam ad dextrum cava.

Deinde *Vienussenius d*, & nuper vir ex elegantibus animi dotibus celebris, præmatura vero morte extinctus *J. Gottlob Kruger e*, omnino non solum non majorem celeritatem sanguinis in pulmone circumeuntis esse maluit, ut esset minor. Cum enim vasa pulmonis multo quam reliqui universi corporis vasa breviora sint, & cum totidem semper undas, easque æquales, sanguinis in dato tempore pulmo transmittat, quot universi corporis vasa, tanto moveri per pulmones lentius sanguinem aiunt *Cl. viri*, quanto pulmo universo corpore brevior est. Esse enim celeritates proculdubio, ut spatia in eodem tempore percurfa. Sed & *Jurinus* celeritatem sanguinis in vena cava eam fecit, ut duodecim libræ in minuto secundo per unciam moverentur, in pulmone tres libræ tantum *f*.

Mihi quidem videtur satis æquam pulmonis & reliqui corporis causam esse. Celeritatis princeps causa cor est. Sed dexter ventriculus triplo *g* & quadruplo sinistro debilior est. Retardat etiam pulmonis sanguinem, cæteris positis æqualibus, densitas venarum pulmonalium, & parvitas. Tanto enim lentius per arteriam sanguis movetur, quanto difficilius ex arteriâ se evacuat *i*. Ipsâ demum contractio arteriæ pulmonalis, quam aortæ

d Ibid. p. 97.

e *Physiolog.* n. 210. 213.

f *l. c.* p. 47. 48. 49.

g *L. IV.* p. 161.

i *L. VI.* p. 125, 126.

aortæ debilior est , ut ipsa arteria multo , etiam absque accuratiori mensura , tenuior sit *k*.

Contra brevior est via per pulmonem , resistentia vasis minoribus objecta minor , & inspirantibus minima : divisionum in vasis numerus *l* minor , minor ratio luminum *m* conjunctorum ramorum ad pulmonalis arteriæ truncum , accedit demum vis peculiaris pectoris collabentis.

Non adeo multum *n* crediderim in pulmone sanguinis velocitatem differre & in universo corpore , & tantum omnino , quanto venarum pulmonalium conjuncta lumina venarum cavarum luminibus minora sunt. Et in vivorum animalium microscopicis speculationibus non conspicua mihi pulmonem inter & alia corporis vasa *o* differentia adparuit. Sed neque nuper *Cl. Spalanzano* , qui in pulmone sanguinem celerius quam in mesenterio fluere vidit , quam in palato vero lentius. Parem in pulmonis arteria & in aorta celeritatem fecit *Cl. Boissier p* , facilitatem in illa majorem.

Laxitas illa anastomosium nihil habet firmi. Mihi in rene etiam major visa est , & in liene *Cowpero q*.

Summam vero virium pulmonis cum summa virium totius corporis comparari posse non crediderim , cum tanto numerosiores arteriæ &

k Crediderim rationem 148. *n.* 45. 46. *Francisc. Boissier*
ad 110. nimis parvam esse conf. *hæmæstat.* p. 73.

p. 158.

l L. VI. p. 26.

m Ibid.

n Conf. etiam *Aurivillius l.c.*

o *Mem. sur le mouvement du sang* p. 102.

p In *hæmæstatiks* p. 73.

q *Phil. Trans.* n. 280.

denfiores, a cordis robustiori ventriculo celeritate majori perfluantur.

Aeris preffioni *r* parum tribuo, quæ fit 20 & 40 demum pollicum ejus levissimi elementi *s*. Et absque eo elemento in pulmonem recepto perinde certe sanguis, sanguisque pulcherrimus & optimus, in pullo paratur. Neque crediderim ullo modo quemque globulum, adeoque sanguinem universum, ab aere eam preffionem pati, quæ sit æqualis $\frac{2}{7}$ *s** sui ponderis, qui millies aere se comprimente gravior sit: & toties celerius moveatur *t*.

Bronchum inter duo vasa pulmonis sanguinea medium ea comprimere, & circuitum promovere theoria est, quæ elementum etiam in broncho gravius supponit *v*.

§. XXII. *Hypotheses variae, quæ plus tribuunt pulmoni.*

Quæ priori numero enarravimus, plerique scriptores etiam habent, ut tamen peculiarem hic pulmonis virtutem admittant, qua plus, quam universum arteriarum systema, præstet. Accelerando sanguinis motui natum esse dictum est *x*. Dissolvi quidem hic imprimis sanguinem,

r Torcular vocat Borellus Hoadley p. 31. Helvetius prop. 129. éclairciss. p. 13. 33.

s p. 32.

*s** Jurin l. c. p. 45.

t Nobiscum Lister p. 16. *x* Henshaw.

v Bidloo Exerc. anat. IV. f. 2.

Señ. V. DE UTIL. PULM. AL. HYPOTH. 211

atque comminui in minores globulos , recepta est opinio *y*.

Misceri vicissim diversas sanguinis particulas, *Malpighius* auctor fuit *z* , & tuetur in venis *Boerhaavius a*.

Densari sanguinem plurimi docent *b* , ut peculiariter hic ea densitas nascatur , quæ sanguini sani animalis propria est : eo etiam usi argumento , quod bonis cum corporis viribus , solo pulmone vitato, sanguis in hominibus phthificis in liquamen dissolvatur , quod per sudoris poros amitti aptum sit *c*. Addit *Cl. Quelmatz d* ; arteriam pulmonalem angustiozem densando sanguini aptiozem factam *e* videri.

Globulos , & omne genus tenuiorum humorum hic inprimis figurari , suumque accipere modulum *f* , alii autumant.

Ruborem in pulmone primario oriri *g* , ex ea ipsa condensatione , & ex aeris viribus credunt *h* , cum in vena cava musculorum vires

y *Borellus* prop. 129. *Hoadley* p. 45. 46. 61. *Keil Secret. anim.* p. 29. *Wainewright* p. 57. *Michelotti* Epist. p. 28. *Cockburne* p. 122. *Pujati* p. 107. *Lieutaud physiol.* p. 101. 108. *Berner mechan.* p. 244. *Ferrein. Boerhaave* n. 201.

z *Posth.* p. 15. Fuisse se contra *Borelinum* tuetur. Habet etiam *Hoadley* p. 45. 46. 61.

a l. c.

b *Boerhaave* ibid. *Schreiber* p. 341. *Barry* p. 70. 71.

c *Boerhaave aphor. pract.* n. 1210. *Sydenham &c.*

d *Progr. ad disp. Bossi* 1748.

e Vide contra *Whytt on vit. mot. Sauvages assembl. de Montp.* p. 1743.

f *Boerhaave* l. c. *Ferrein, Barry tr. on a consumption of the lungs* 1727. 8. *Hoadley* p. 64. juvari ab aere qui adtractionem augeat.

g *Boerhaave &c.* Infra vesiculas pulmonales magis rubescere quam supra *Cl. Bertier physique des corps animés* p. 64. Augeri certe in pulmone ruborem *Ill. Senac T. II.* p. 87.

h *Quelmatz* l. c. *Lieutaud physiol.* p. 107. 108.

passus sanguis tamen nigricet, & in vena pulmonali sit rubicondior *i* & in arteriis *k*.

Cum densitate tamen incallescere plerique docent, & *Boerhaavius*, atque nuper *Buffonus*, qui pulmonem pro foliis habet, quorum motu vitalis ignis excitatur, etsi repugnat valde *Hambergerus*, qui a calore omnia corpora rarefcere, a frigore addensari, non absque veri specie objicit *l*. Sed in piscibus, & ranis, & testudinibus, valido cum motu, calorem in sanguine non generari *m* monent.

Hæc omnia vera quidem sunt hætenus. Cum reliquis enim arteriis, per quas sanguis circumit, hanc efficaciam communem *n* pulmo habet. Non propriam, cum causis careat potentioribus, & nihil sit in celeritate sanguinis pulmones perfluentis præcipui *o*, aut cum musculorum vehemente motu comparabile. Sed etiam animalia frigida *p*, & pullus in ovo, sanguinem rubrum, & densum, & fluidum, & globulis compositum, tunc parant, quando pulmonem incredibilis parvitas *q*, & quietum, aut nullum habent. Sanguinis resolutio ab omni pariter ulcere eadem succedit, etiam remoti alicujus ossis, cum pulmone integerrimo.

i *Lower* p. 183.

k *Michelotti* p. 22. 23.

l *Maurocordat* c. 17. *Thruston* p. 52. 53. *Stahl theor. med.* p. 288. & de *diff. pulsus celer. & freq.* Ab a. 1684. suum inventum esse *Idem* adseverat. Sic etiam *Boerhaave* n. 201. *Hales* p. 100. seqq. *Arbuthnot* p. 49. *Schreiber ulmag.* p. 341. *Stracke*

de *respir.* Erfurt. 1748. *Verryft*

l. c. p. 48.

m *Phil. Trans.* n. 27.

n Ita nobiscum *Cl. Kaaw* n. 327.

o p. 209.

p *Conf. l. VI.* p. 261. &c.

q *Mem. sur le poulet T. II.* p. 38.

Addit nuper Cl. J. Nepomucenus Cranz , non videri ejusmodi condensationem naturam aquæ incompressilem admittere, cujus portio in sanguine pulmonali fere dimidia sit *q**.

§. XXIII. *Efficacia respirationis in abdominis sanguinem & viscera.*

Quæ de compressione sanguinis abdominalis diximus *r* , ea quidem pertinent ad utilitatem , quam vitæ humanæ respiratio præstat. Et primo quidem solum diaphragma in qualibet inspiratione descendit, atque ventriculum , intestina, hepar, lienem, renes deorsum premit *s*. Deinde plenissimum abdomen inter descendens diaphragma, & musculos, qui ab eo ventre nomen habent, & vertebrae comprimuntur, ita in contentiosa maxime respiratione, & in nixu *t*, potentissime urgentur, quæcunque in abdominis cavea sunt. Sanguinem venarum hepatis, lienis, mesenterii, renum etiam, & venæ sine pari, portarum, & cavæ, universum systema, ut simplicior sit sermo, tanquam unicum tubum contempler, qui cingulo undique circumducto, totus quasi eliditur. Itaque is tubus per medium in duas columnas dividitur. Earum superior in respiratione a ramis in truncos pellitur: inferior a truncis in ramos reprimuntur, cum valvulæ iter sanguinis determinaturæ a toto fere abdomine

*q** In propria Thesi a 1759. proposita.

r T. VI. p. 140.

s ibid.

t 116. seqq.

absint. Etsi nunc hac ratione parum prospectum esse videri possit celeritati circuitus sanguinis, cum sanguinis legitimus circuitus pariter retardari videatur, uti acceleratus fuit, vera tamen inde vitæ animalis commoda accedunt. Nam & sanguis in laxis venis, & ad perpendiculum adscendentibus, ubicumque resederit, in motum reducitur, ubicumque coagula nata fuerint, ibi ea quassantur & subiguntur.

Deinde etiam ductus sanguinis venosi tamen a respiratione non turbatur. Columna quidem prior, quam diximus ad cor reprimi, ea iter suum per hepar, aliasque suas vias ad cor accelerat, atque corde recepta porro promovetur, non relapsura. Quæ altera columna versus venarum fines videtur retrolabi, eo paulo post in remissione proxima, laxato prelo diaphragmatis & musculorum abdominis, in columnæ superioris vasa novissime evacuata, nunc adeo ramorum sanguini minus resistantia, facillime succedit. Omnino, uti toties vidi, quando epididymidem argento vivo replebam, non alia ratione facilius per angustissimorum vasculorum ambages, fluidum metallum urgeri, quam stricto sursum deferente ductu, & spatio parato, in quod proxima & inferior columna mercurii facilitate nova succederet, tamquam in spatium inane.

Respiratio adeo vis est accessoria, quæ sanguinem abdominis quatit, subigit, ex suis visceribus expedit x, & cordi celerius remittit. De venoso

x Hanc principem respirationis utilitatem facit *Johannes Floyer* l. c. T. II. p. 337.

sanguine fere dico, in aortam enim diaphragmati multo minor est potentia.

Hinc, ut brevissimus sim, nulla alia causa potentius stagnationi sanguinis in liene *y*, in hepate resistit, quibus in visceribus stagnat facillime. Ab eadem vi sanguis de imo intestino sursum versus cor, ad perpendiculum urgetur, neque suæ, ad distendendas venas ano viciniores, propensione permittitur. In omni ergo hypochondriaco morbo, nihil incitata respiratione aptius est. Vasa *mesenterica* intestinorum inspirantibus tument, expirantibus valide constringuntur *z*.

Uti sanguinis reditus ab incumbente diaphragmatis prelo adjuvatur, ita bilis, per suos canales, & ex hepate inque intestinum iter expeditur *a*. Hæc causa est, quare vomitus, sive fortissima expiratio, in periodicis doloribus, quos calculi vesiculæ felleæ excitant, paroxysmo fere semper finem imponat, & certe ad aliquot septimanas ægros in apathiam restituat *b*.

In renibus, & calculorum itinere promovendo, in comprimendis intestinis cum suis, quos vehunt cibis, in urgenda vesicula chyli *c*, & ductibus, qui eum succum vehunt, pressio utraque abdominis & diaphragmatis adjumento esse potest. Et hætenus certe magni viri *d* hypothesis potest

y *Leeuwenhoek Phil. Transf.*
n. 307.

z *Heuermann physiolog. T. III.*
p. 739.

a *Memoir. sur la respirat.*
exp. 55. p. 30, *Seger de bile cyst.*

b *Conf. Comm. ad Boerhaav.*
Instit. Med. T. III. p. 166.

c *Pecquet p. 82.*

d *Ill. Senaci Mem. de l'Acad.*
1724.

recipi, quod in pressione vehementi, maxime expirationis, evacuatus ductus chylifer, paulo post, succedenti liquori minorem opponat resistentiam, eumque recipiat facilius *e*.

Sed etiam ventriculus ante septum transversum descendit *f*, dum inspiramus, & una in animale vivo a musculis abdominis versus dorsum urgetur. Ita, & potentius quam a fibris ipsis ventriculi, certe humani, quatitur ventriculus, premitur, subiguntur cibi, & denique saccus ipse evacuatur *g*. Sæpe enim in homine sum admiratus, id viscus a victus erroribus fere in chartæ tenuitatem reductum, tamen suos cibos potuisse promovere, neque causam hujus constantiæ detexissim, nisi diaphragmatis adjutricem vim cognovissim.

Vesica fellea a solo fere diaphragmate evacuari potest, cum fibræ ejus receptaculi musculosæ ne quidem a Cl. anatomicis admittantur *h*.

Vesica urinaria manifestissime a viribus conjunctis transversæ septi & abdominis musculorum inanitur: neque fere unquam incipit depleri *i*, absque nixu. Semel quando fluere cepit lotium, porro utique ex propriis suæ vesicæ viribus pergit evacuari *k*.

Intestinum rectum a viribus respirationis depletur, neque in sano homine absque ea vi unquam fæces emittit *l*, quam stimulus distenti intestini excitat.

e Pressio peritonæi & diaphragmatis est præcipua causa motus chyli *Bertier* l. c. p. 403.

f T. VI. p. 144. seqq.

g Etiam ad vomitum usque p. 141.

h Cl. *Casseholm*.

i *Comm. in Boerb. T. III.* p. 271.

k *Mem. sur les parties irritables & sensibles.*

l *Prælect. Boerb. T. I. p. 539.*

Uterus suo se fetu per eandem vim liberat, quo nixu non alius enormior est *m*. Etsi enim nolim excludere uteri vires, minus tamen est quod ab iis speres, cum uterum contra fetum, in plenissimo abdomine, ita vires respirationis urgeant, ut undique applicatus vix possit effectum exferere, quem cum nixus viribus compares. Animalia demum volucra omnino musculofo utero destituta, solis incitatis respirationis viribus ova deponunt.

Diaphragmatis in constringenda vena cava inferiori efficacia peculiarem utilitatem habere videtur. Cum enim inter inspirandum sanguinem repellat, cavet, ne alioquin ex superioribus venis confluens in pulmone sanguis viscus nimis obruat.

Aerem inspiratio ad nares ducit *n*, & una particulas de aere volatiles adtrahit, quæ absque eo aeris excitato torrente nullum sui sensum imprimerent. Sola enim respiratione cohibita fortissimos odores excludimus: neque ipse canis sagire potest, qui per vulnus asperæ arteriæ spiritum ducit *o*.

Non quidem, rebus rite pensitatis, crediderim, aerem in ventriculum per inspirationem deduci. Nam & gula inter inspirandum a musculis diaphragmatis urgetur *p*, & ipse ventriculus comprimitur. Suctio vero *q*, potissimum respirationis munus est, atque adeo nascens animal prima alimenta hujus functionis beneficio debet.

m Ibid. T. V. P. II.

n Oribas. p. 48. *Prælect.*
Boerb. T. IV. p. 69. 70.

o Perrault *Essais de physique*

T. III. p. 29.

p T. VI. p. 144. *Sproegel*
p. 26. 28. *Schwartz* n. 10.

q p. 114.

Aerem in ventriculum refectum cibum resolvere non repugno : sed erit huic speculationi suus locus.

Esse animalibus de serpentum genere eum pulmonis etiam usum non repugno , ut pro varia vi aeris , quam in pulmonem recipiunt , aut vicissim emittunt , vel enatare possint , vel subsidere. Haftenus in eo genere pulmo cum vesica natatoria *r* convenit , quæ & ipsa aere se replet , & animal in aquis sublevat , quoties opus est , vicissimque sinit mergi , quando inanitur *s*.

Peculiare insectis est , expandi eorum partes ab aere , aque eo elemento incrementum pendere. Alarum apum nervi sunt aeræ fistulæ *s**. Ab eo aere explicantur alæ animalis , quas animal complicatas ex chrysalide profert *s***.

Manifestus tamen respirationis effectus vox est *t* ut olim *Radulphus Bathurst* vidit. Sæpe sum meditatatus utilitates hujus actionis , & eo fere redii , ut huic inter certas & evictas respirationis utilitates primum darem locum , neque fere me abstineo , quin pulmones factos esse suspicer , ut animal vocale sit. Quæ animalia pulmonem habent , ea etiam vocalia sunt ; quæ pulmone

r *Derham physico theol.* c. 6. *aquis subsident Rai* l. c. Qui ea
Rai phil. transf. n. 115. & 225. destituuntur in fundo maris
Redi de anim. vivent. p. 105. repunt , neque summas aquas
 Etiam cochlea aquatica com- petunt *Idem & Anderson Be-*
 presso aere se in aquam demer- *schreibung von Groenland* p. 93.
 git *Swammerdam bibl. natur.* *s** *Swammerdam* p. 504.
 p. 165. Musculo proprio pulmo- *s*** *ibid.* p. 417. 425.
 nem dilatat mytilus ut natet , *t* Animalia , quibus nulli
 contrahit ut mergatur *Mery* pulmones , iis neque aures
Mem. de l'Acad. 1710. p. 425. sunt *Grego Cosmolog. sacr.* p. 29.
s Ea vesica rupta animalia in & obtusior auditus.

carent, ea muta esse reperio. Neque enim crediderim, huic adfirmationi quidquam obesse, quod nonnulla quadrupeda aut raro vocem edant, aut edant humilem & parum limpidam: edere sufficit posse, qualem animalis opportunitates postulant, ad dolores suos & terrores, & iras testandas, ad vocandam feminam, ad blandiendum, aut terrendum. Deinde, si alis suis aliquæ muscæ, aut mobili tympano cicada, aut ore labiisque adductis & remissis, pisces nonnulli sonum edunt, non ideo is sonus vocis habet flexionem & varietatem. Avium abdomen aereum ad sonos musicos comparatum esse, dudum ab aliis dictum est v.

Hæc ita dicta volo, non ut aliam aliquam efficaciam ad vitæ radices profundius penetrantem, in respiratione esse negem: id volo de ejus ignotæ utilitatis natura, quam etiam animalibus in testis habitantibus & infectis aer in intimis præstet mihi nondum liquere.

§. XXIV. *Aliæ respirationis utilitates quæ ex hypothesis repetuntur.*

Clarissimi la Case dignitatem diaphragmati imputatam parum hætenus liquide potui comprehendere. Primam esse causam determinantem exercitium functionum animalium y: Omnes cum eo nervos consentire, cellulofas telas omnes z: Peritonæum elevari exspirantibus a, pleuram

v Needham de form. & fetu p. 124.

c. 17.

z ib. p. 148.

y Idée de l'homme physique

a ib. p. 149.

descendere inspirantibus, cum his membranis universum cellulofum genus communicare: In omni celluloso systemate itaque oscillationem *b* perpetuam sustentari: Sed id systema cellulofum nervis multis percurri *c*, & magno robore partes corporis plerasque adtrahere: Ad caput ipsum per cellulofas telas se vires phrenicas extendere *d*, esseque inter caput & eas vires æquilibrium, quod ab omnibus aliis partibus organicis conservetur *e*; & inde repeti omnium in corpore animali scaturiginem *f*. Ita antagonismum esse diaphragma inter & pleuram atque peritonæum, quas membranas cum suis cellulosis telis diaphragma alternis vicibus distrahat *f**. Demum, nam eadem est secta, sensationum gratarum, & ingratarum sedem in diaphragmate esse *g*, ibique manifesto percipi *h* non in cerebro. Plura legant, qui in istis me clarius vident. Tantas autem laudes non sibi adrogat musculorum nobilissimus, cum absque diaphragmatis usu quadrupedum fetus, & avium *i* universitas, & pisces *k* recte vivant. Sed etiam cellulosæ telæ ad motum producendum lentæ sunt, neque ullus mortalium earum unquam motum vidit, nimis lentum, nimis inconspicuum, quam qui ad circuitum sanguinis adeo rapidum proximi aliquid conferat.

b ibid. p. 153.

c ibid. p. 143.

d ibid. p. 324.

e ibid. p. 247.

f Ibid.

*f**Bordeu tissu muq. p. 77. &c.

g Buffon *histor. natur.* &c.
T. VII. p. 10. 11.

h ib. p. 12.

i L. VIII. p. 122.

k Ibid.

LIBER NONUS.

VOX ET LOQUELA.

§. I. LARYNX, IN UNIVERSUM.

T aer ex pulmone per expirationem pulsus vocem producat, necesse est *k** exire per laryngis rimulam: ut ea vox in vocabula dearticuletur, linguam oportet varie ad oris parietes adlidi. Accuratus laryngem, linguam orisque parietes & nares hactenus indicabimus, ut simus memores, propriis locis accuratius esse exponendas.

Larynx nostris perpetuo, olim enim *k*** ea vox cum pharynge fere eandem, & promiscuam significationem habuit, cava quasi pixis est, quæ ante vertebrae sub ore, & supra jugulum suspenditur, homini cum quadrupedibus calidis communis *l*: similis, aut analoga certe fabrica in

*k** In vulneribus asperæ arteriæ nulla vox *G. la Motte Chir. compl. T. II. obs. 212.* Sed ea repetentur diligentius.

*k*** Verus nobis larynx est, qui pharynx dicitur *Hipp. peri arxaias iatrikæ.* Promiscue usurpari pharyngos & laryngos nomen *Galenus us. part. L. VIII.* Ita *Guidot Prolegom. p. 12. 13.*

In *Rusi* scriptis, pharynx pro larynge sumitur *L. II. p. 57.*

Masculino cum sexu o pharynx Laryngem significat *Suidas T. III. p. 582. Goræus:* feminino fauces *Suidas ibid.*

l Etiam marinis *Tyson* in turstone p. 32. *Hartmann* in phoca.

avibus *m* reperitur. In serpentum genere pisciumque glottis tamen est, cum duabus cartilaginibus *n*.

In universum homini cavus est larynx, ad tubi modum *o*, qui & superne in os patet faucesve, & inferne ad asperam arteriam. Anteriorius prominet, longior *p*, magisque clausus. Posterior brevior *q* pars est, quæ tubum facit. Superne late patet.

Ex cartilaginibus musculisque, & ligamentis & membranis componitur, ut totus quidem in continuam, simulque eidem motui obsequentem machinam consentiat, quæ suam firmitatem in sano homine habeat, ut tamen nonnunquam mutuo nexu per aliquam violentiam solutæ cartilagine quæ laryngem componunt, in diversum iverint *r*.

Viro quam feminae pene triplo amplior Larynx est, atque major, tum glottis: & eminentia scutiformis magis prominet *s*, unde illæ populares fabellæ. Ita certo vidi.

m Nempe glottidis duæ cartilagine fimbriatæ *Bresl. Saml.* 1726. p. 203. *Anderson* p. 151. & cricoidea *Parisini* in *Struthio-*cam. T. II. P. II. p. 142. & ave numidica T. III. P. II. p. 21. Nulla avibus epiglottis.

n *Bremond Mem. de l'Acad.* 1739. in rana, *Parisini* in chamaeleonte T. III. P. I. p. 54. In vipera *Phil. Traus.* n. 144. In testudine addunt etiam anularem *Parisini* T. III. P. II. p. 191. ut avium similis sit.

o *Tarin Chondrogr.* T. 35. f. 1.

p *Conf. Tarin* f. 1. cum 3.

q *Ibid.* f. 3.

r A voce acuta scutiformis cartilago divulsa *Barthol. de pulm. Schreiber Almagest.* p. 353. A strangulatione anularis cartilago ab aspera arteria separata *Weiss progr. V.* p. 14.

s *Riolan.* p. 176. *Tarin* T. XXXV. A. & T. XXXV. B. Esse tamen aliquando feminis æque magnum laryngem *Heuermanni Physiolog.* T. II. p. 3.

§. II. *Cartilago anularis.*

Vera totius laryngis basis, durior, crassior *t*, etfi minor quam thyreoidea, sola cum aspera arteria conjungitur, & arytaenoideas cartilagines sibi gerit impositas. Innominata *v* olim, dudum a similitudine *anuli* *x* nomen fert, quali Turcæ *y* & Persæ *z* in arcu tendendo utuntur, & qui hinc altior est, inde media parte brevior

Firmior undique sodalibus; in senio plerumque osseam *a* naturam induit, tuncque cellulas habet *b*, rubris membranis vasisque pictas *c* & medulla. Vidi in parte media posteriori osseam fuisse. Descripsit has cellulas J. G. Duvernoy *d*, zonamque quasi cavernosam.

Anterius brevis *e*, crassa, convexa, sub thyreoidea cartilagine laryngem perficit, & ante asperæ arteriæ principium eminet.

Inde lineis utrinque adscendentibus retrorsum elevatur, & ea sede longior est *f*, neque tamen

t Bertin T. IV. p. 279.

v Suidas l. c.

x Vox *krikoeidys* apud Galenum reperitur de dissect. organ. vocis c. 4. conf. Vesal. L. 1. c. 38. Minorem vocat Oribasius p. 56. 58.

y Bellon singularités p. 330.

z Chardin voyag. T. IV. p. 125.

a Fabricius de voce L. 3. c. 5.

Morgagnus Adv. I. p. 29.

Winslow n. 461. Weszpremi

obss. Bertin p. 284. Genga anat.

Chir. p. 93. De toto larynge

Vater catal. mus. p. 19. n. 42.

Plott natur. hist. of Staffordsh.

Bartholinus dom. anat. p. 42.

Fallop. de part. simil. c. 7. Offi-

bus totum laryngem adnume-

ravit Columbus p. 100.

b Bertin p. 288.

c Mem. sur les os p. 262.

d Comm. Acad. Petrop.

T. VII. p. 220.

e Eustach. f. 7. 8. Tarin f. 1.

2. C. &c.

f Eustach. T. 42. f. 1. 7. 8.

Casser T. 15. f. 9. 10. 11. Albin.

1c. off. fet. f. 156. 157. Bertin

p. 279. 281. Tarin f. 9.

par altitudini cartilaginis scutiformis *g*. Eam latiore faciem pharyngi obvertit, ipsa vero lateribus cartilaginis scutiformis comprehenditur *h*. Inferius latior, sursum angustatur *i*.

Eminentem ea sede lineam habet *k*, a qua in duos mediocriter cavos sinus dividitur *l*.

Oblique ponitur, ut superiori sua parte ad pharyngem inclinetur *m*.

Huic quasi fundamento & arytænoideæ insident cartilagine, & scuti similis altera. Illæ quidem suis cotylis late tument utrinque colliculo *n* anularis cartilaginis insident.

Hæc in parte inferiori, & externa laterali nostræ cartilaginis minora pariter convexa o tubercula invenit, quæ sinum utrinque leviter cavum thyreoideæ cartilaginis fuscipiunt.

Anulo primo asperæ arteriæ nonnunquam anularis cartilago insidet *p*. Sed etiam vidi, difformem ex parte sua posteriori, & laterali processum demisisse, qui in duos primos asperæ arteriæ anulos se divisit.

Partem aliquam imamque tubuli aerei sola perficit, partem superiorem cum thyreoidea *q*.
Inferior

g Eustach. T. 42. f. 1.

h Eustach. l. c. f. 1. 2.

i Eustach. f. 10. Bertin p. 283.

k Eustach. T. 42. f. 2. 10. Santorin. tab. 3. f. 1. Winslow T. IV. n. 427.

l Santorin. ibid. Winslow.

m Gunz mem. des Savans étrangers T. 1. p. 285.

n Oribasius l. c. Morgagn.

adv. I. tab. 2. f. 6. Tarin f. 9. 10. 11. *g. g.* Winslow n. 427.

o Avicenna p. 14. Santorin. tab. 3. f. 11. cum 1. Eustach. f. 1. comp. cum. 2. Tarin f. 10. 1. & f. 1. XXXV. B. 1. Winslow n. 482.

p Bertin p. 283.

q Oribas. p. 56.

Inferior adeo pars hujus tubuli rotunda : superior, ob figuram thyreoideæ cartilaginis difformis est, & utrinque compressa *r*.

§. III. *Cartilago scutiformis.*

Cartilago Thyreoides s, aut *scutiformis* a figura dicta, earum maxima est, quæ laryngem constituunt. Eadem crebro omnino, perinde ut prior, ossescit, etiam ut medullam contineat *t*, ut nempe cellulas suas *v* rubris vasis pictas durasque contineat. Addit junior *Duverneyus*, in viris, quam in feminis, frequentius ossescere *x*. Vidi cartilagineam naturam mansisse, ut tamen super marginem inferiorem pars ossæa foret; vidi ossæam naturam induisse, cum anularis non degenerasset.

Figura fere duorum planorumque parallelogrammorum *y* est, quæ ad planum angulum, obtusum, antèrius conveniunt, cujus suprema pars incisa *z*

- | | |
|---|---|
| <i>r</i> Gunz l. c. | earum cellulas latefcere docet |
| <i>s</i> Suidas l. c. Oribas p. 56. | <i>Morgagn. adv. VI. p. 529.</i> |
| <i>Thyreon</i> scutum. | <i>x</i> <i>Myotomolog. p. 142.</i> |
| <i>t</i> <i>Weszpemi, Bertin, Wins-</i> | <i>y</i> <i>Eustach. T. 41. f. 8. 11. 12.</i> |
| <i>lom. Rudimentis ossæis adspersa</i> | <i>T. 42. f. 1. Casser T. 1. f. 5. 6.</i> |
| <i>Pechlin obs. L. II. n. 40. Ma-</i> | <i>T. 13. f. 5. T. 15. f. 4. 5.</i> |
| <i>ximè antèrius & ad latera, per-</i> | <i>Albin f. 155. Tarin T. 35. A. f.</i> |
| <i>petuo ossescit Genga p. 92. Ma-</i> | <i>7. 8. T. 35. B. f. 1.</i> |
| <i>xima parte ossæa Vater catal.</i> | <i>z</i> <i>Eustach. T. 41. f. 8. 11. 12.</i> |
| <i>mus. p. 19 20. De toto larynge</i> | <i>Casser T. 1. f. 1 -- 6. T. 13. f. 1.</i> |
| <i>vide p. 223.</i> | <i>T. 15. f. 4. 5. 6. Albin. f. 155.</i> |
| <i>v</i> Eas descripsit Cl. <i>Duvernoi</i> | <i>Tarin l. c. A. T. 35. B. f. 2.</i> |
| <i>l. c. p. 221. Morgagn. T. 2. f. 2.</i> | <i>Bertin p. 271. Comper myotom.</i> |
| <i>Bertin p. 276. Recte per ætatem</i> | <i>T. 30. f. 1. 3.</i> |

de collo eminet *a*, in viris tamen magis *b*.

Eadem a conjunctione sua retrorsum discedunt, & anularem cartilaginem comprehendunt *c*, atque margine fere recto terminantur.

Non absque exemplo est, etsi rarius, in his tabulis superius, anterieus, non longe ab angulo plano, foramen fuisse *d*, per quod arteria & nervus ad interiora laryngis fertur *e*.

Ex omnibus angulis liberis ejusdem cartilaginis processus prodeunt, superiores duo, totidem inferiores.

Illi quidem sursum, retrorsum inclinati *f*, curvuli *g*, obtuso fine, quasi clava terminantur *h*.

Inferiora, breviora *i* cornua perinde clavato fine terminata *k* oblique introrsum descendunt, & ad latera cartilaginis anularis se adplicant, & leni sinu ad facieculas articulares committuntur, quas diximus; firmo quidem, & valde stabili nexu, ob brevem solidamque cellulofam telam, qua utraque cartilago conjungitur.

a Eustach. T. 41. f. 8. 11. 12.

Casser ibid. T. 1. f. 5. T. 13. f. 1.

T. 15. f. 1. Tarin T. 35. A. f. 7.

Bertin p. 270. Bonhomme cepha-

lotomie T. 20. f. 2. Courcelles

musc. cap. T. 8. 6. Comper l. c.

b Conf. Tarin T. 35. A. f. 7.

8. cum T. 35. B. f. 2.

c Eustach. T. 42. f. 1. 2. &c.

Comper ap. Busch de organo

vocis.

d Lieutaud p. 186. Albin.

osteogr. f. 155. In bove Casserius

T. XI. f. 5.

e Fascic. III. p. 4.

f Eustach. T. 42. f. 1. 2. 9. 11.

Casser. T. 1. f. 4. 5. 6. 8. 9.

Comper l. c. f. 2.

g Comper app. ad Bidl. f. 20.

h Casser. T. 13. f. 2. 3. 4. 5.

Morgagni T. 11. f. 12. Santorin

T. 3. f. 1. 2. Winslow n. 424.

Comper app. ad Bidl. f. 20.

i Eustach. T. 42. f. 1. 2. 9. San-

torin T. 3. f. 12. Tarin f. 7. 8.

Comper T. 30. l. c. Bonhomme

l. c. f. 3.

k Winslow n. 424.

Aliquanto interius & antèrius margo inferior hujus cartilaginis aliud habet tuberculum, quod musculi Cricothyreoidei infertionem dividit *l*: id modo brevius est, modo longius eminet.

§. IV. *Cartilagines arytænoideæ.*

Arytænoideæ a figura gutturnii *m* dicuntur duæ utique cartilagines, etsi non purgatæ a musculis & membranis, integro in cadavere, unicum, bicipitem colliculum *n* referunt, & pro unica cartilagine tertia *o* a vetustate sunt habitæ. Correxìt errorem *Jacobus Berengarius*, & dubius primum *p*, deinde firmitus *q*, duas esse pronuntiavit. Eam emendationem plerique seculi sedecimi anatomici *r* secuti sunt, ut tamen in *Riolani s* animo plus potuerit patrum reverentia, inque *Caspari Hofmanni* mente *t* quam præfens naturæ testimonium. In parte posteriori superiori laryngis ponuntur, posterius pharyngi obversæ, antèrius caveam laryngis, & thyreoideam eminus cartilaginem respiciunt.

Eædem legitime purgatæ, in duas particulas secedunt. Inferior, major, modice cavo *v*,

l *Eustach.* T. 42. f. 9. *Casser.* T. 1. f. 5. 6. *Tarin* ad f. 1. sed lenius, & *Courcelles* ad *mi*.

m *Arutænæ* & æquales *Lucilio Satyr.* L. I. p. m. 267.

n *Casser.* T. 1. f. 7. *G. T.* 13. f. 3. *Bertin* p. 294.

o *Galenus de usu part.* L. VII. c. 11. 17. de voc. instrum. dissect.

c. 4. *Oribas.* p. 58. *Suidas* l. c. *p* *Isagoge* p. 49.

q In *Mundinum* p. 393.

r *Vesalius* L. I. c. 36. *Columbus* p. 44. *Fabricius* P. I. c. 6. *Laurentius* p. 106. *Spigelius* L. III. c. 3. *Casserius* c. 10.

s In *C. Baub.* p. 727. *Laurent.* p. 636. *Enchirid.* p. 316.

t *Apolog.* *Galen.* p. 134.

v *Oribas.* p. 58. *Morgagni Adv.* I. T. 2. f. 6. *Bonhomme* T. 17. f. 5. *Tarin* f. 15. *h.*

ovali, sinu oblique introrsum respiciente, insidet cricoideæ cartilaginis tuberculis, quæ memoravimus, mobili omnino articulo, ut facillime & dextra ad sinistram inclinetur, & utraque aut versus caveam laryngis curvetur, aut in pharyngem. In ea dearticulatione lacinia mucosa, glandularum *Haversii* x similis, in angulo interiori est: Neque ea harum cartilaginum basis offescit y, etsi frequenter suas cellulas intus habet z. Ex ea basi duo quasi processus educuntur, exterior alter, qui dearticulationem cum cricoide terminat a, alter interior & anterior, qui glottidem separat, & oram inferiorem ventriculi sustinet b. Eadem cartilago utcunque triquetrae pyramidi similis c sursum se effert, & dum adscendit, crassitie minuitur.

Posterior hedra cava d musculos recipit, quos dicemus.

Anterior convexa e sedes portionem coni refert, caveam laryngis respicit, & tribus fulcibus f effoditur, quos multa acinorum glandulorum congeries replet.

Interiori plana regione dextra cartilago sinistram respicit g.

- x *Morgagn. Adv. I. T. 2. p. 188. Runge p. 10.*
 f. 6. p. 15. *Bertin p. 295.* c *Casser. T. 15. f. 13 -- 16.*
 y Vidit tamen totas in osseam naturam degenerasse *Bertin* d *Weitbrecht f. 81. e. c. leviter concavam Bertin, Albin.*
 p. 291. Negat totas ossificari f. 159. *Winslow n. 429.*
Morgagnus. e *Albin. f. 158. Winslow*
 z *Duvernoi Comm. Acad. n. 429.*
Petrop. T. VII. p. 220. f *Morgagn. T. II. f. 6. ab e*
 a *Weitbrecht f. Bertin p. 290.* ad f.
Santorin. f. 1. c. Winslow n. 430. g *Leviter convexam vocat*
Eustach. T. 42. f. 2. *Bertin p. 289. rectiorem & planam p. 293.*
 b *Bertin p. 290. Santorin.*
 T. 3. f. 3. d. *Lieutaud Essais*

Superiori pyramidali termino infidet alia, certe mobili articulo, vulgari gutturnio imposita cartilago, fere ovata, cum acumine *h*, antrorsum convexa, leniter excavata, quam summus anatomicus *J. Dominicus Santorinus* i pro sexta & septima laryngis cartilagine numeravit, minime præter rem, nisi exiguitas particulæ novi nominis auctoritati noceret. Hæc cornicula retrorsum, ad pharyngem curvantur *k*. Perpetua reperio, alii *Cl. viri* aut omnino cum cartilagine arytænoidea uniunt *l*, aut aliquando, neque semper, distinguunt *m*.

Pars inferior cartilaginis arytænoideæ multis fibris musculosis cum sodali conjungitur, quas paulo post dicemus: In parte superiori dissident, & intervallum relinquunt, quod equidem veræ glottidi, pene normale, continuatur, non recte tamen passim pro glottide dictum est *n*.

§. V. Epiglottis.

Epiglottis o equidem nihil facit ad vocem, cum ea nata sit & perfecta, quam primum aer ex glottidis rima prodiit: & absque o* epiglottide

h Santorin. l. c. a.
i p. 97. Habet etiam *Weitbrecht* f. 81. Processus superior est *J. Antonini v. d. Linden. med. physiol.* p. 577.
k *Casser.* T. I. f. 2. D. D. *Winslow* n. 430.
l *Eustach.* T. 42. f. 12.
m *Bertin* p. 290. *Winslow* ib.
n Quando glottis inter cartilagine arytænoideas ponitur, ut apud *Dom. de Marchett.*

p. 86. Est obliqua pars glottidis *Morgagn.* p. 16.
o *Epiglossis Aretæo, Polluci* p. 207. *Epiglottis Rufo* L. I. p. 49. L. II. p. 56. *Polluci* p. 211. *Lingula Celsi* L. IV. c. I.
*o** *Casserius* p. 108. *Valisneri notom. d'un struzzo* p. 249. *Phil. Coll.* 1682. *Parisini* ubique. Nulla etiam serpentibus *Cotter* p. 126.

aves suavissime canant *p*. Adparebit alias, ob deglutitionis pericula unice hoc a natura tutamen laryngi esse additum, ne facillime *q*, dum bolus, potusve, super laryngis ostium in pharyngem posteriorem transit, aliquid de iis, quæ ventriculo destinantur, in asperam arteriam illabatur. Ergo solis quadrupedibus, & puto omnibus etiam cetis data est hæc *lingula*, nam elephantum *r*, quem aiunt aliqui epiglottide carere, per meliores incisiones *s* constat habere. Neque facile crediderim homini defuisse *t*, etiam absque deglutitionis vitio *v*, neque vicissim credo ad vocem harmonicam *x*, aut sonorum diversitatem facere *y*. Noluimus tamen hanc a larynge historiam separare: etsi enim eam cum hujus cartilaginibus antiquitas non connumeravit *z*, vulgo tamen eo refertur, cumque thyreoidea glandula potissimum connectitur, aque larynge suas fibras musculorum similes accipit.

Ergo ex facie posteriori anguli plani cartilaginis thyreoideæ *a*, inter ventriculos, super glottidem, sub hilo, quem diximus, firmum ligamentum *b* exit, quod petiolum *c* gracilem

p Nulla avibus *Plinius* L. XI. p. m. 624.

q *Aristot. hist. anim.* L. I. c. 16. *Oribas.* p. 64.

r *Ray Wisdom of God* p. 331.

s *Parisini Mem. sur l'histoire des animaux.* T. III. P. 3.

t *Guilielmini de morbofor. cadaver judic.* p. 22. *Targioni observ.* p. 137.

v *Targioni* *ibid.*

x *Tauroy* p. 368.

y *Santorini* p. 107.

z Quæ tribus non plures car-

tilagines numerat *Galenus* de *voc. instrum. dissect.* c. 4.

a *Tarin* f. 3. 4. *Bonhomme* T. 20. f. 4. Nullam fuisse *Duvernoi Comm. Petrop.* T. VII. p. 218.

b *Fabricius de larynge* f. 10. *Walther de deglut.* p. 6. de *obes. & vorac.* n. 2. *Bertin* p. 296. *Winslow* n. 431.

c Angustam partem habet *Rufus* L. II. p. 56. *Winslow* n. 431. Pingit *Casseri* T. 13. f. 17. *Petrus Tarin* T. 35. A.

sustinet, sursum erectum, aliquando ex tribus quasi articulis compositum, quem duæ exiguæ cavitates separant.

Hic petiolus in cartilaginem ovalem *d* utcumque dilatatur, quæ sursum ad perpendiculum retro linguam & uvulam surgit *e*, ad eam convexa *f*, ad laryngem cava *g*. Amat sine suo antrorsum reflecti *h*.

Tota fere perforata est, & ipsa imprimis inferior, & petiolus, crebris diversi diametri foraminibus *i*. Alii majores sinus perinde & patent, & replentur *k* carunculis rubris, quæ ex dorso convexo in cavam faciem producuntur.

Mobilissima cæterum Epiglottis, quæ solo ligamento nitatur, facillime a linguæ retrocedente dorso inclinatur *l*, ut ostium laryngis, quantum

- f. 16. 17. *Verbeyen* T. 4. Nostra T. 2. f. 1. *Tarin* f. 3. *Bonhomme* l. c. observatione potius breviorẽ hanc icones faciunt. Melius fere *Bonhomme* l. c. Hæc est *langnette*. *Theoph. de Borden Recherches sur les glandes* p. 85. Nuper descripsit *Duvernoi* T. VII. p. 218.
- d* *Eustach.* T. 42. f. 2. *Casser.* T. 13. f. 3. 5. 6. 11. 17. T. 15. f. 17. 18. *Tarin* l. c. *Bonhomme* l. c.
- e* *Rufus* p. 27. 49. *Stephanus* L. I. c. 25. *Bonhomme*, *Santorin* l. c. *Eustachius* l. c. *Casserius* T. 1. f. 7. T. 13. f. 3. *Weitbrecht* f. 81. *Tarin* l. c.
- f* *Casserius* T. 1. f. 6. T. 15. f. 18. *Tarin* f. 1.
- g* *Eustach.* f. 2. *Casser.* T. 1. f. 7. 8. 9. T. 13. f. 3. *Morgagn.* T. 2. f. 1. *Tarin* f. 3. *Bonhomme* l. c. *h* *Bertin* p. 296. *Santorin* p. 107. Dudum ita descripsi *Comm. ad Boerb.* T. 1. p. 216. & habent icones *Tarini* T. 35. A. f. 2. 4. *Morgagni* f. 5. *Comper* T. 30. f. 4.
- i* *Weitbrecht* f. 81. *Tarin* f. 4. 16. 17. *Morgagn.* f. 5. Illa foramina majuscula sunt. Minutissima habet *Santorin.* T. 3. f. 1. 2. *Bianchi* ad *Mangeti theatr.* p. 263. Minuta *Bertin* p. 297. *Winslow* n. 431.
- k* *Morgagn.* f. 5. Scissuras vocat *Winslow* n. 440. Eos sinus negat adesse *Bianchi* l. c. sed utique vidi.
- l* *Eustachius* f. 1. *Tarin* ibid. f. 2. 4. *Comper* T. 30. f. 3.

ipsam inter epiglottidem & artynæoideas cartilagineas patet, totum ampliter protegat, quod miror potuisse nonneminem negari; sed hanc functionem alibi rectius dicemus.

Elastica cartilago est & sponte resilit, seque erigit. In fetu membranæ naturam habet *m*. Et ipsa vitiose induratur *n*, ossilem factam negat *Morgagnus* se vidisse.

§. VI. Ligamenta laryngis. Glottis.

Pone epiglottidem primum est laryngis ostium & amplius *o*, quod anterius longiori parte tubuli perficitur, posterius brevius patet. Id ostium inter epiglottidem anteriorem, cartilagineas arytenoideas posteriores, & epiglottidem, cum membranis ad arytenoideas cartilagineas tendentibus ad latera circumpositis intercipitur. Etiam hoc ostium non bene pro glottide sumitur *p*.

Duo porro ligamentorum paria a cartilaginibus arytenoideis in thyreoideæ faciem posteriorem concavam tendunt. *Superiora q* quidem, & exteriora, minus tendinea, minus elastica, exeunt a cartilaginum arytenoidearum parte

m Mediam inter cartilagineam & membranam *Massa* facit *p*. 65.

a *Barbarette* apud *Bonetum* *sepulchret. anat.* T. II. p. 31.

o *Casser.* T. 1. f. 7. inter *F. & G. Santorini* T. 2. f. 3. ad *D. Comper myotom.* ed. 1724. T. 30. f. 2. *Morgagni* T. 2. f. 1. inter

F. & ee. dd. Weitbrecht f. 81.

p *Littre Mem. de* 1718. p. 299.

q *Fabricius de laryng.* L. II.

absque litteris. *Casser.* T. 13.

f. 11. DD. obvoluta membranis:

Winslow n. 436. *Walther de*

obes. & voracib. p. 3. *Mor-*

gagni T. 2. f. 2. f. f. & p. 16.

Weitbrecht f. 82. d.

supra mediam , & in scutiformis cartilaginis partem superiorem mediam se immittunt.

Inferiora *r* , pariter transversa , robusta , elastica , fibris facta tendineis *s* & elasticis *t* , quas membrana laryngis obvelat , ex cartilaginum arytænoidearum parte infra mediam , multo supra basin *v* exeunt , inque angulum planum thyreoideæ cartilaginis supra mediam sedem *x* se immittunt , in meis experimentis. Veteribus videntur pro unica particula habita esse , quam dixerunt *glottidem* *y* , satisque diu etiam apud *Riolanum* *z* vetustus error hæsit. Musculosas autem fibras qui fecerunt *a* , necessitati hypotheseos quidem obtemperarunt. Posterius latiora , anterius angustiora sunt *a**.

Vidi cadavera , etiam adularum feminarum , in quibus hæc ligamenta fere membranacea & absque elatere fuerunt. Tendi possunt , aut arytænoideis cartilaginibus deorsum ductis *b* aut adscendente larynge , & cartilagine thyreoidea antrorsum tracta *c*.

r *Arantius* c. 31. *Morgagni* T. 2. f. 2. gg. & p. 16. *Casser.* l.c. EE. membranis obvoluta : *Fabricius* l. c. absque literis *Le ruban* Cl. *Ferrenii* Mem. 1741. p. 420. Habet *Weitbrecht* f. 82. e.

s *Fatente* *Dodarto* *Memoir.* de 1700. p. 282. 1706. p. 398. *Walther* p. 3.

t *Lettre à M. D. sur le nouveau système de la voix* p. 9.

v *A Basi* *Winslow* n. 435. *Morgagni* p. 16.]

x *Mediam* *Winslow* n. 435. *y* *Lingula fistulæ similis* , princeps organum vocis *Oribasius* p. 60.

z In *C. Bauhinum* p. 727. in *Laurentium* p. 636. *Enchirid.* p. 316. &c.

a *Dodart* *Mem.* 1700. p. 261. 1706. p. 398.

*a** *Walther* l. c. p. 3.

b *Ferrein* p. 425.

c *Idem* *ibid.* *Lettres sur le nouveau système* &c. p. 13.

Inter hæc ligamenta rima est, quæ in cadavere antè quidem angusta, & postè in medio latescit, & quæ ex faucium cavea, summoque laryngis aditu, retro epiglottidem patente in caveam asperæ arteriæ ducit. Ea rima *Glottis d* vera est, præcipuum, ut dicitur, vocis organum. Feminis, ut larynx minor, ita angustior esse dicitur *e glottis*.

Eadem adductis cartilaginibus arytænoideis clauditur, adeo accurate *f* in animalibus, maxime avibus, & frigidis quadrupedibus, ut nihil possit aeris aut ex ore in laryngem subire, aut vicissim ex aspera arteria in os erumpere. Hac eadem rima clausa ranæ *g* pulmones inflatos tenent, eademque in animalibus urinantibus *h* arcet aquam, ne in pulmonem subeat, dum sub aqua degunt.

Pariter eadem & elevato larynge & antrorsum ducto & detracto diducitur.

In avibus horum ligamentorum loco aliæ aut cartilagines *i* sunt, aut ossæ conchæ, quæ se accurate contingunt *k*, & quas suo loco dicemus.

d Casser. f. 10. *k*. Arantius c. 31.

e Riolan p. 176.

f Dodart Mem. de 1700. p. 267. 1706. p. 408. & c. Swammerdam p. 120. Lettres sur un nouveau système p. 13. & olim Oribas. p. 62.

g Rana Fabric. P. 2. c. 11. de Bremond l. c. p. 477. Testu-

do Parisini T. III. P. 2. p. 291. Angusta serpenti rima Phil. Trans. n. 144.

h Phoca Parisini l. c. Manati Steller Nov. Comm. Petrop. T. II. p. 314.

i Casserius p. 97. Montagnat éclaircissimens p. 69.

k Lettres sur le nouveau système de la voix p. 42.

§. VII. *Laryngis Ventriculi.*

Inter hæc duo ligamenta supra glottidem membrana laryngem vestiens descendit, in se ipsam depulsa, atque in sinum *l* deprimitur, varia altitudine, ut modo semicirculo terminetur, modo parabola *l**. In ejus ventriculi fundo multi cellulosi sinus *l*** mucosi patent. Ostium *l**** semper apertum est, ellipticum, & toto sinu latius, atque longius, & transversum a cartilaginibus arytxænoideis ad epiglottidem protenditur. Exterior adjacet musculus thyreoarytxænoideus lateralis *m*. In animalibus valde vocalibus *n* amplior sinus est. In valde teneris infantibus nullam caveam reperi. Res ipsa vetusta o,

l *Ventriculi laryngis Morgagni. Sinus du larynx Winslow* n. 436. Habet *Heisterus Eph. Nat. Cur.* vol. 1. obs. 179.

*l** *Morg.* l. c. f. 4.

*l*** Foramina mucosa *Morgagni.* p. 17. Habet *Heister* l. c.

*l**** Habet *Eustachius* T. 42. f. 11. *Morgagni. Adv. I. T. 2.* f. 2. 3. *Weitbrecht* f. 82. Ex illo clanculum *Bonhomme* T. 17.

m *Morgagni* p. 16. & *Ep. ad Valsalvam VIII.* n. 4. *Waltther* l. c.

n Porcis *Casseri*, *Fabricius*, *Morgagnus*, *Herissant Mem. de l'Acad.* 1753. p. 288. Equis *Fabricius*, *Casseri*, *Morgagnus*. Simile quid habent mares ranarum viridum arborearum *Roefel*. Ab ove & bove absunt *Morgagni.* p. 18.

o Ventriculus non parvus in quam aer efflatus subit, quoties

clausa epiglottide viam non invenit *Galen. de util. part.* L. 7. c. 13. *Oribasius* p. 62. Ab obstructis ventriculis vocis vitium *Nemesius*. Obscure ventriculos nominavit *C. Stephanus* L. II. c. 42. *Eustachius* obiter exprefit, *Valverdu* nominavit p. 225. *Laurentius* pro re nova reddidit L. IX. c. 16. tum *Severinus Pinæus Præfat. ad L. de virginis.* notis p. 28. In porco descripsit *Fabricius* L. 3. c. 12. & in equis ibid. *Casseri* contra *Vesalium* vindicavit L. I. c. 15. p. 98. & depinxit ex cane T. 9. f. 10. porco T. 10. f. 9. & equo T. 19. f. 4. & 11. D. D. *C. Baubinus* eosdem describit, cibosque credit illabi *theatr. anat.* p. 538. *Riolanus* non æquus, ab omnibus anatomicis dictos esse *Baubino* exprobrat in *C. Baub.* p. 727.

Galeno dicta & Oribasio, non ignorata *C. Stephano & Eustachio*, pro re nova a *Severino Pinsau dicta*, aque *Laurentio*, ab Ill. tamen *Morgagno* p post seculi fere XVII, non tamen integram, oblivionem restituta est: in eo ipso nempe seculo non defuerunt q, quibus verum innouit, *Bartholinus* utique, *C. Baubinus*, *Drelincourtius* & pro nova iterum re *Schelhammer*. Varietatem cum magnitudine minime dissimulavit Ill. *Instaurator* r, ut non esset, cur ejus iconem *Bianchus* s reprehenderet.

Muci sunt receptacula fatis adfinia valvularum, quas in muliebri pudendo dicemus.

§. VIII. *Ligamenta alia.*

Etsi minus nobilia glottidis illis tæniis, minime tamen debent negligi, reliqua, quæ laryngis cartilagine conjungunt, vincula. Eorum alia veri nominis sunt, splendidisque fibris constant tensisque: alia membranacea, solent tamen a claris viris recenseri, quod in magni usus organo nihil vile videatur.

p In *Advers. I.* Vindicavit in *Advers. V.* Auxit in *Epist. anat. VIII.*

q *C. Barthol. Instit. anat. p. 233.* *Thomas Caspari F. anat. p. 443.* ex *Baubino* *Drelincourtius* glottidis limbos cum valvulis mitralibus cordis non inepte comparavit *Prælect. p. 182.* Valvulas inferiores laryngis, pro nova re dixit *G. Schelham-*

mer Programm. valedict. p. 6. & apud *Valentinum Amphiteatr. Zootom. T. II. p. 88.* *Amatus Bourdon* fere ex *C. Baubino* repetiit *descript. anat. p. 183.* & *Keilius anat. abr. p. 151.* & *P. Dionis cours d'anat. p. 480.* Alveolos ad latus glottidis dixit *Sidobre de variolis.* r *Adv. V. p. 67.* s In *Mang. theatr. p. 262.*

Totus ergo larynx de osse hyoide, quod continuo dicetur, suspenditur non uno velamento. De ultimo adeo crassiori fine superioris cornu cartilaginis scutiformis adscendit, teres *t*, robustumque vinculum, in quo minime raro nodulus *v* callosus, cartilagineus, & denique osseus reperitur, & a me pariter visus est. Id ad cornu ossis hyoidis extremum pertinet, inque idem fortiter se immittit.

Aliud robustum, planum ligamentum *x* a media ossis bicornis basi ad supremam partem convenientium planorum quadrangulorum ejusdem scutiformis cartilaginis, rectum descendit.

Membranaceum totum est, quod a cornubus *y* ossis hyoidis ad processus thyreoideæ cartilaginis superiores extenditur.

Epiglottis etiam pariter membranaceo vinculo sustinetur, quod a margine inferiori, posteriori baseos ejus ossis & a basi ipsa duplex *z* utrinque oritur. Ei continua pars membranæ faucibus communis, convergit utrinque, & pone ligamentum linguale in epiglottidis dorsum venit.

Iterum velamentum linguæ ab ejus dorso *a*

t Casser. T. 1. f. 4. 5. 6. 7. *x* Casser. T. 1. f. 5. Bonhomme T. 24. f. 7. 8. Comperme T. 17. f. 1. T. 20. f. 2. F. append. f. 20. myot. T. 30. f. 2. Winslow n. 433. 438.
 Bonhomme T. 17. f. 1. 2. 12. *y* Santorin. p. 199. 200. Bertio p. 262. 274. Casserius T. 1. f. 4. D.
 Weitbrecht f. 81. Winslow n. 432. Bertin p. 275.
v Fabricius l. c. f. 9. D. D. *z* Morgagn. Adv. I. p. 3. T. 1. e. Bertin p. 262. 299.
 P. III. c. 4. Morgagn. Adv. I. p. 38. Bonhomme l. c. & p. 200. *a* Eustach. T. 42. f. 5. Morgagn. Adv. I. tab. 1. c. p. 19. Adv. VI. anim. 92. p. 119. 120. Weitbrecht f. 80. p. 215.
 Vinculum cartilagineum & nerveum dixit Oribasius p. 58.

undique quidem ad epiglottidem venit, media tamen in parte & linguæ, & epiglottidis, robustius, deorsum latefcens, fibras cellulofas & albas *b* habet, inter quas carneæ etiam fibræ, alias repetendæ, nonnunquam reperiuntur. Ad latera hujus vinculi membranacea amplitudo a fede tonsillarum ad epiglottidem advenit *c*. Inter linguam autem, & laryngis operculum, modica vallecule deprimitur, quam ligamentum medium dividit, de quo continuo diximus.

Quæ laryngis inter fe uniunt cartilaginea ligamenta, ea nunc fequuntur. Ergo ex cartilaginis fcutiformis margine imo, & una pene medio, ad latera anguli plani, duo robusta, brevia *d*, firma, ligamenta introrfum defcendunt, quæ convergunt, & in vertice anguli, quem comprehendunt, in maxime anteriorem partem, mediamque, cartilaginis anularis inter cricothyreoideos mufculos fe immittunt. Eorum ligamentorum lacerti rimis *e* nonnullis feperantur, per quas vafa tranfeunt. Hæc ut maxima, ita notiffima funt *f*.

Aliud *g* ligamentum, utrinque, ex ima infe-

b Membranaceum eft Winslow n. 439.

c Weithrecht f. 80. e. p. 215. Winslow n. 439.

d Facies exterior Caffer. T. I. f. 5. 6. Cowper T. 30. f. 1. Facies interior five posterior Weithrecht f. 81. *g*. Pro unico habet Bonhomme T. 20. f. 2. 3. T. 17. f. 1. G.

e Cowper l. c.

f Oribafio p. 58. Jac. Beren-

gario p. 395. *b*. Carolo Stephano L. II. c. 43. Santorino primum p. 99. Ligament fort Winslow n. 434. Weithrecht p. 217. Thyrocricoidien Bertin p. 275. inférieurs p. 285. Verheyen T. 22. f. 1. fupra G.

g Santorini. p. 99. fecundum. Winslow videtur dixiffe n. 432. 434. Thyrobyoidiens posterieurs Bertin p. 275. 285. Forte & Berengario nota fuerunt l. c.

riori appendice ejusdem cartilaginis scutiformis descendit, & in partem superiorem, lateralem, cartilaginis anularis terminatur, atque inter fasciculum posteriorem, & lateralem muscoli cricothyreoidei se immittit.

Ligamenta glottidis, quæ sint ex scutiformi cartilagine, ea non repetimus *h*.

Cartilago porro scutiformis ex eminentia propria emittit teres *i* utrinque ligamentum, quod ad latera interiora cartilaginum arytænoidearum adscendit, & sub corniculis terminatur *k*.

Aliud teres vinculum ex eadem cartilagine anulari, ejusque summo dorso, in summum corniculum arytænoides ire dicitur *l*. Mihi a proxime priori non videtur differre.

Demum membrana, neque enim ligamenti similes fibras habet, conjungit cartilagines arytænoideas, per longitudinem suam fere totam ab apice ad basin *m*, & cum summa cartilaginis scutiformis fede colligat.

Membranaceum ligamentum ab epiglottide ad capitula cartilaginum arytænoidearum abit, in quo, in animalibus subinde duæ cartilagines obliquæ reperiuntur *m*^{*}.

Articulationes laryngis capsulas suas habent, quas breves, & cellulofarum similes fibræ confirmant. Ejusmodi ligamentula etiam corniculum arytænoideum ad suam cartilaginem revinciunt *n*.

h p. 232.

i Weitbrecht p. 219. Santorin. p. 99. An Winslow n. 435.

k Weitbrecht f. 81. i. i.

l Santorin. p. 97.

m Weitbrecht p. 218. T. 81. h.

Santorin. p. 99.

m^{*} Camper ap. Busch de mechanism. organi vocis hominis 1770. 4.

n Bertin p. 293. 292. 290.

§. IX. *Mobilitas laryngis.*

Quin totus larynx conjunctus & elevari possit, & deprimi, id quidem dubium non est. Sed num omnes cartilagine laryngis ipsius motum aliquem admittant, dum tota machina quiescit, a nonnullis quidem dubitatur.

Arytænoideæ quidem cartilagine, & epiglottis mobilissimæ sunt. Cum is vero thyreoideæ cartilaginis motus ad litē *Ferrenianam* pertineat, eo magis etiam sollicite de ea re disquisitum est.

Nempe cartilaginē thyreoideam antrorsum duci, dum cartilagine arytænoideæ retrorsum eunt, ita ligamenta tendi, quæ glottidem faciunt, *Ferrenius* auctor est *o*: eumque motum etiam tactu percipi addit, digito sub cartilaginē *p* scutiformem dato. Eundem motum *Cl.* viri discipulus confirmat *q*: eoque posset referri, ad eandem hypothesin, ejus cartilaginis in sono nimis acuto, jam citata divulsio *r*.

Sed etiam ante *Fabricium* fuerunt *s*, qui eandem cartilaginē, & adtolli, & vicissim in cavitatem laryngis aliquantum deprimi posse scripserunt. Adtolli vero hic sonat, quod *Ferrenius* voluit, antrorsum nempe duci. Nam elevationem cum toto pharynge, paulo post *Fabricius* distinguit, & eum quidem motum admittit. Aliquantum diverso

o *Mem. de 1741. p. 425. & in duodecim quæstionib.*

p *Ibid. p. 426.*

q *Eclaircissemens en forme de lettres p. 81.*

r *p. 222.*

s *P. I. c. 4.*

diverso modo *Cl. Santorinus* ^t thyreoideam cartilaginem super firmiorem anularem, a cricothyreoideis musculis aliquantum deprimi putat. Porro eandem iterum non quidem a fociis cartilaginibus dimoveri, comprimi tamen posse, ut vox inde quasi rugiens oriatur, *Gunzius* olim proposuit ^v.

Ego quidem non facile video, a musculis os hyoides, & cartilaginem scutiformem antrorsum ducentibus; hanc ipsam cartilaginem produci posse; quin una sequatur anularis cartilago, cum qua nimis brevibus ligamentis, & ad cornua maxime inferiora; arctissima capsula colligetur; videoque paria mecum sentire *Santorinum* ^x; & olim *Fabricium* ^y.

Digitis etiam ad jugulum datis, dum elevatur cartilago scutiformis & antrorsum ducitur, nimis manifesto percipio, totam laryngis machinam sequi, & una proferri. Neque hic ab Ill. viro *Josepho Exuperio Bertini* ^z dissideo.

Comprimi posse a musculis sternohyoideis crassam, & summi elateris cartilaginem vix probabile est. Vitium subesse posse, & cartilaginem thyreoideam morbose mobilem fuisse, non negaverim ^a.

Santorini sententia plus habet speciei, cum in *Ferreniana* cornu thyreoideæ ab immobili cricoide

^t p. 102.

^v *De oscitat.* p. 20. n. 8.

^x p. 101.

^y l. c.

^z *Lettres sur le nouveau*

système de la voix p. 12. 31.

^a *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 8. obs. 33. Addunt, lamina plumbea fuisse confirmatam.

recedere oporteret, in ista modice antrorsum inclinari: & cum præsto musculus, neque is debilissimus sit, a quo vix possis aliud officium expectare *b*. Si verò deprimitur, æquum est vicissim elevari & restitui.

III. *Camperus* tensionem ligamentorum minutius exponit *b**. Basin ossis hyoidis sibi relictæ in statu naturali cartilagini thyreoideæ incumbere; in voce vero acuta reddenda os hyoides per suas vires antrorsum duci, ut ejus ossis basis ultra cartilaginem thyreoideam producat, & simul larynx pone basin ossis hyoidis elevetur: ita & ipse sursum it & os hyoides antrorsum. Dum nunc cartilago thyreoidea adscendit, tendi ligamenta glottidis necesse est; dum enim ea cartilago sursum it, arytenoideæ cartilagines immotæ perstant: dum interim (forte) aspera arteria diducta & una cricoideam abducit, sic ut sola thyreoidea sursum eat. Porro ab ossæ hyoide thyreoidea in priora trahitur, cricoidea actione cricothyreoidei postici retrorsum. Ita ligamentis tensis vox acuta producit.

Contra in gravi voce cricoidea cartilago antrorsum ducitur, ita ejus distantia a cricoidea nulla fit. Cricoarytenoidei postici muscoli cartilagines ejus nominis deorsum & ad latera trahunt, processus anteriores ad se invicem adducunt, ita bases earum cartilaginum deducuntur, glottis fere clauditur, sola pars postrema rimæ dilatatur.

b Admittit etiam *Bertinus* p. 12. 31.

*b** Apud *Busch* l. c.

§. X. *Musculi laryngis.*

Sternothyreoidei.

Quem motum admittunt cartilaginum firmitas, & natura articulationum hactenus expendimus: nunc vires enarrare oportet, quibus aut totus larynx moveatur, aut aliqua ejus particula. Earum virium expositio requirit offis hyoidis descriptionem, quod ita sit cum larynge connexum, ut eo elevato necesse sit laryngem adscendere, & demitti detracto.

Laryngem ergo universum movet, maximus laryngis musculorum *sternothyreoideus*. Lata origine & a sterni parte *c* suprema, & postica, nascitur tendineus *d*, sed fibris continuo carneis; & a costæ primæ proxima sede *e*, nonnunquam & a secunda *f*; & a clavicula secundum Cl. viros *g*. Adscendit, contrahitur in angustiore diametrum, & *h* sequitur latera asperæ arteriæ, cujus magnam partem tegit, pariterque glandulam thyreoideam *i*.

Non rarum est linea tendinea distingui *k*, non ita longe supra sternum inscripta.

Finis est multiplex, etsi multo quam reliquus

c Oribasius p. 202. Albinus Winslow n. 446. Ray myolog. p. 203. T. XI. a. b. & T. III. p. 54. Tassin p. 232.
Eustach. T. 33. Winslow n. 446. *b* Eustach. T. 41. f. 5. Albin.
d Casser. T. I. f. 3. T. III.
e Albinus ibid. T. XI. b. c. & *i* Winslow n. 445. 446. Bid-
d. e. T. III. Eustach. l. c. loo T. 15. f. 3.
f Winslow n. 446. Gunz l. c. *k* Albin. p. 204. Casser. T. I.
g Albin. p. 204. Douglas p. 37. f. 2. 3. Gunz Mem. des Savans
g Morgagn. Adv. II. p. 32. étrangers.

musculus angustior. Primarius equidem fasciculus immittit se in lineam asperam inferius supra eminentem oram cartilaginis scutiformis positam *l*.

Sed aut alius fasciculus, aut ora musculi exterior altius adscendit in tuberculum, quod superiori loco de cartilagine eminet *m*.

Aliquæ fibræ ad thyreopharyngeum musculum fere perpetuo se adfociant *n*, aliæque ad hyothyreoideum *o*.

Denique non est absque exemplo, ad os hyoides *p* usque fasciculum adscendisse.

Primaria actio est detrahere laryngem univsum, & una paulum retrorsum ducere, quo ipso ex motu ostendemus, glottidis rimam laxari. Una pharyngem, os hyoides, linguam, maxillam inferiorem, hætenus deprimit, & denique caput univsum antrorsum flectit *q*. In glandula thyreoidea exprimenda debiliter operatur, cum secundum eam pene parallelus descendat.

Si solus dexter ageret, aut sinister, duceret utique cartilaginem ad suum latus.

§. XI. Hyothyreoidei.

Sive hoc nomine appelles *s*, sive *thyreohyoidei*,

- | | |
|---|---|
| <i>l</i> Eustach. T. 41. f. 12. Albin. p. 203. T. XI. f. 9. & T. III. f. 1. | <i>o</i> Albin. ibid. Cowper T. 30. f. 1. |
| Courcelles. T. V. T. Cowper T. 30. f. 1. Bonhomme T. 20. f. 2. D.D. Morgagn. Adv. I. T. 1. Casser. l. c. f. 2. 3. | <i>p</i> Albin. ibid. Courcelles, Eustach. l. c. Douglas p. 37. |
| Winslow n. 446. Berti p. 273. <i>m</i> Albin. p. 204. T. XI. i. | <i>q</i> Si interim maxilla non cesserit, neque descenderit |
| Morgagn. ad b. & p. 3. Winslow l. c. Cowper l. c. | Monro Essays of a Societ. at Edimb. T. 1. p. 146. |
| <i>n</i> Albin. p. 204. Santorin. p. 103. 104. | <i>r</i> Albin. p. 204. |
| | <i>s</i> Vulgatus est musculus, & ipsis antiquis viris dictus Galeno, & Oribasio p. 262. 274. |

ut *Boerhaavius* *t* vocare amabat, musculus brevis, carneus, oblonge quadratus est, quo quadrata *v* pariter pars thyreoideæ cartilaginis, præter medium angulum eminentem, operitur. Finis superior est in ossis hyoidis basi, ad latus & ad inferiora, ex propria cava fede, tum ad dimidiam *x* & ultra partem continuati cornu. Descendit ante membranam, quæ os hyoides cum cartilagine scutiformi conjungit *y*. Finis inferior in imum cartilaginis marginem *z*, inde in lineam asperam inferitur *a*, quæ sternothyreoideum recipit, & primo transversim, deinde retrorsum adscendit, e regione sternothyreoidei, in quem nostri fibræ & intimæ *b*, & exteriores continuantur. Aliquando etiam fibræ intimæ hujus musculi, cartilaginem anularem prætervectæ, in velamenta partis superioris glandulæ thyreoideæ terminantur; alias ad cartilaginem anularem *c* se immittunt. Denique fibras aliquas cum thyropharyngeo confundit *d*.

Os hyoides & cartilaginem scuti similem ad se adducit mutuo, ut quisque finis ad alterum in ratione firmitudinum inversa accedat.

Quando nihil aliunde mutatum est, facile adparet, os hyoides obsequi, & cum lingua

t J. R. M. n. 71.

v Courcelles, Morgagni, Albin. T. 3. II.

x Albin. p. 206. T. XI. c. 6.

Nimis parvam partem habet D. C. de Courcelles tab. 8. &

Bonhomme T. 20. f. 2.

y Courcelles l. c.

z Aliquando Albinus l. c.

perpetuo Winslow n. 447.

a Albin. l. c. & in ic. Morgagni. T. I. Courcelles l. c.

Cowper T. 30. f. 1.

b Eustach. T. 41. f. 5.

c Videtur habere Courcelles inter n. & 8.

d Winslow l. c.

descendere. Quando vero id os per suas vires firmatur; tunc utique poterit fieri, ut ad eum solidiorem finem cartilago thyreoidea elevetur. Tum glottidem arctat, & una epiglottidem impellit, ut retrorsum super aditum laryngis inclinetur *e*. Alteruter oblique os hyoides suum ad latus deprimeret, si ageret seorsim.

Alius nonnunquam triangularis musculus, ex summo margine cartilaginis scutiformis prope superiora cornua nascitur, & in extrema cornua hyoidea se immittit, communicatis tamen cum sternothyreoideo fibris. Eum, manifestum est, nimis mobilia cornua hyoidea potius deprimere, quam suam levare cartilaginem. Semel eum vidi, semel Ill. *Morgagnus f*.

§. XII. *Stylopharyngei. Thyreopalatini.*

Hos quidem musculos nolim aut a deglutitionis intricata historia avulsos hoc loco describere, aut vicissim nauseosæ repetitionis censuram incurrere. Quare sufficiat interim monuisse, stylopharyngei quidem fibras late super membranam laryngis dispergi, & fibris intimis inter os hyoides & cartilaginem scutiformem *f*^{*}, fibris vero exterioribus, ad epiglottidem usque protendi *g*; præterea vero ad oram superiorem *b*

e Santorin. p. 103.

f *Epist. Anat. XI.* n. 43. p. 362.

f^{*} *Albin.* p. 215.

g *Walther de deglutit.* n. 6.

Albin. f. 28. nn. 00. f. 29. ff.

e e.

b *Morgagn. Ep. XI.* n. 6. 7.

Santorin. p. 125.

thyreoideæ cartilaginis & ad oram lateralem ejus cartilaginis sub cornu superiori ad inferius usque *i*, & ad ejus cornu superioris principium adhærescere. Ergo etiam si malis ita describere, ut membranis potius, quam cartilagini, fibræ hujus musculi inserantur, tamen hanc cartilaginem & elevabit *k*, & retrorsum ducet, hætenus iis viribus adversus, quæ laryngem fursum quidem, sed præterea antrorsum trahunt.

Cum præterea minime rarum sit, duos musculos stylopharyngeos esse, fit etiam, ut alter hyoidi ossi & thyreoideæ cartilagini unice destinetur *l*, etsi insertionem in os hyoides *m* non memini me reperisse, neque eam quam in linguam dixit *Fallop* *n*; neque peritissimus *Albinus* ejusmodi insertiones adjecit ultimis tabulis, uti quidem insertionem addit ad Epiglottidem.

Sic thyreopalatinus magnam quidem partem suarum fibrarum in gulæ longitudinem demittit. Multæ tamen pariter fibræ, & superficiei, quam stylopharyngeus, propiores, & retro eum musculum, & sub eo ad totam oram lateralem cartilaginis scutiformis *o* ita adhærent, ut potius

<i>i</i> <i>Albin</i> . T. 12. f. 27. efg	<i>m</i> <i>Morgagn</i> . Adv. I. p. 4.
f. 28. f. 29. d. d. f. 30. g. h.	II. p. 34. Epist. VIII. n. 5.
T. 10. f. 9. w x y. f. 10. r. s.	XI. n. 6. 7. 9. <i>Fallop</i> . p. 75. b.
r. s. f. 11. m. n. m. n. & p. 215.	Rejicit <i>Santorinus</i> p. 125. omit-
<i>Morgagn</i> . Advers. I. p. 4.	tit <i>Albinus</i> .
II. p. 34. Epist. XI. n. 6. 10.	<i>n</i> p. 75. b. Rejicit <i>Santorinus</i>
VIII. n. 5. <i>Fallop</i> . p. 75. b.	p. 125. 126.
<i>Santorin</i> . p. 125. <i>Courcelles</i>	<i>o</i> Conf. <i>Albin</i> . p. 237. c. d.
Tab. V. tau. <i>Winslow</i> n. 477.	c. d. f. 29. T. 10. f. 12. b. b.
<i>Eustach</i> . T. 42. f. 6. T. 41. f. 5.	f. 13. w. w. f. 14. x. x. f. 15. s. s.
8. 11. <i>Nicolaus Habicot</i> diei VI.	<i>Douglas</i> c. 16. p. 45. <i>Morgagn</i> .
c. XI.	Adv. I. p. 4. Exp. X. n. 14.
<i>k</i> <i>Morgagn</i> . Exp. VIII. n. 5.	VIII. n. 4. <i>Santorin</i> . c. 7. n. 12.
<i>l</i> <i>Morgagn</i> . Exp. XI. n. 4. 9.	

tamen in membranis finiantur, quam in cartilagine: aliquæ etiam ad epiglottidis oram fibræ accedant *p*.

Hujus musculi cum firma ab ossibus quidem palati *q*, nonnunquam, & pterygoideo corniculo plerumque, & a tendinea densa expansione *r* ejus veli origo sit, poterit certe etiam thyreoideam cartilaginem, a suis depressoribus interimptiantibus omissam, sursum ducere & retrorsum.

§. XIII. *Cricothyreoidei.*

Qui sequuntur musculi, laryngi proprii sunt, exque ejus aliqua cartilagine nati, in aliam se immittunt. Hic primus, pene duplex *s* musculus est, ut omnino duos sint *t* qui fecerint, & alium anteriorem vocaverint, interiorem alium.

Brevis est & carneus, tumidus *v*; oritur ex media & angustiori *x* parte cartilaginis anularis, tum ab angulo anteriori, cricoarytænoideo laterali musculo tectus, & a fovea utrinque adjecta. Inde extrorsum adscendit & anteriori fasciculo se immittit in oram mediam & lateralem *y*

p Albin. f. 29. e e. ff.

q Albin p. 236. Morgagn. Adv. II. p. 35. Ep. VIII. n. 4. Valsalva ibid. X. n. 16. Hic est procul dubio musculus laryngem elevans, a radice processus pterygoidei natus Nicolaj Habicot D. VI. lect. XI.

r Albin. T. 12. f. 29. b. p. 327.

s Albin. p. 250. Winslow n. 449. Gunz Mejn. des Savans étrangers p. 287. Cheselden Ed. VI. p. 80.

t Galenus de voc. instrum. c. 5.

Verdier abrégé p. 218. Tassin p. 233. Bonhomme p. 261.

v Casserius T. 13. f. 1. T. 1. f. 3. 4. 5. 8. Courcelles.

w Casser. T. 1. f. 2. &c.

y Albin. p. 250. Courcelles T. 8. Winslow n. 488. Eustach. T. 41. f. 8. 11. Casserius fere in omnibus figuris, imprimis T. 1. f. 5. Bonhomme T. 20. f. 2. 5. O. f. 3. F. Albin. T. 11. f. 46. 47. b. T. 10. f. 1.

cartilaginis scutiformis , e regione muscoli hyothyreoidei , inter medium angulum planum & tuberculum.

Alia vero parte , tectus sternothyreoideo , replet sinum & cartilaginis scutiformis , qui est inter cornu inferius , & ejus tuberculum , & inferitur oræ toti cartilaginis thyreoideæ , inter tuberculum & cornu inferius *a* , atque adeo toti interiori oræ cartilaginis scutiformis , quæ versus ejus cornu inferius descendit , ipsique cornu *b*.

Fibræ hujus musculi inferiores manifesto pharyngem adeunt *c*.

Cartilagines , quibus se immittit , propius ad se adducit invicem , & glottidem , dum thyreoideam deducit , potius laxat , imprimis fibris suis posterioribus *c**. Si vero thyreoidea cartilago alia a causa eodem tempore antrorsum it , cricoideam ipse retrorsum ducit , & glottidem tendit *c***.

Membranam laryngis , cui incumbit , dum tumet , urget , & retrorsum premit *d*.

§. XIV. Cricoarytenoidei postici : Laterales.

Musculorum laryngi propriorum *Posticus* aut *maximus* est , aut certe evidentior.

z *Albin.* p. 250. *Courcelles* l. c. *chius* l. c. E.
a *Casseri* T. 13. f. 4. T. 1. *c** *Camper* apud *Busch*.
5. 6. 8. Bonhomme f. 3. *Albin.* *c*** *Tendere* *Ol. Sabatier II.*
T. II f. 46. 47. 48. c. c. d. d. p. 93. ejus sententiæ argu-
b *Courcelles* ibid. *Bonhomme* menta nunc non possum in præ-
f. 3. Albin. T. II. f. 47. 48. sente larynge expendere.
c Videtur exprimere *Eustachii* *d* *Gunz* l. c.

Replet foveam *e*, quæ est utrinque ad latus lineæ asperæ, a qua facies posterior & longior cartilaginis anularis bipartitur, aque ea fovea & a linea aspera media. Fibris suis extrorsum divergentibus immittit se in faciem posteriorem & anteriorem baseos, & tuberculum eo loco situm *f* cartilaginum guttaliū *g*, quas diducit; & rimam perpendicularem, ipsamque pariter glottidem dilatat *h*: guttales etiam cartilagines hæcenus vertit, ut baseos finem anteriorem ad anteriora convertat, posteriorem ad posteriora.

Cricothyreoideus lateralis neque mihi, neque aliis Cl. viris satis a thyreoarytænoideo *i* diversus videtur. Non adeo *k* utrinque longe, oritur a parte cartilaginis anularis recondita, quam amplexa scutiformis occultat, pene suprema; inde sursum, uti ad interiora declinat *l*: & a ligamento cricothyreoideo *m*.

Fibris suis introrsum adscendentibus se in cartilagines guttales immittit, imo sine conjunctus cum thyreoarytænoideo, deinde a principio fere ad mediam partem crassiorem earum cartilaginum.

Eas diducit, & rimam perpendicularem dilatat,

e Eustach. T. 42. f. 1. 2. *i* Conf. Cheselden p. 80.
 Casser. T. 1. f. 8. 9. T. 13. f. 2. *k* Valde parvum pingit Eustachius, sed diductis cartilaginibus paulo amplior est.
 Cowper append. f. 20. 22. myotom. T. 30. f. 2. 3. Albin. T. 10. f. 13. T. 12. f. 2. 4. p. 252. *l* Eustach. T. 42. f. 1. Casser. T. 13. f. 4. Albin. T. 12. f. 5. p. 257. Cowper T. 30. f. 3.
 Bonhomme T. 20. f. 3. 4. *m* Albin. l. c. conf. p. 378.
f Albin. p. 253.
g Morgagn. Adv. II. p. 34.
h Albin. l. c. Camper l. c.

& veram glottidem *n*. Contra *Camperus* eum capitula quidem cartilaginum arytænoidearum ad se invicem adducere sed bases diducere, rimam posteriorem dilatare, glottidem claudere docet. Nondum quidem hic a sententia recedo, cum præterea musculus, de quo scribo, cum thyreoarytænoideo idem sit, qui ipso *Campero* consentiente, ligamenta glottidis relaxat.

Aliæ fibræ adscendentes omnino in thyreoarytænoideum se immiscent.

§. XV. *Thyreoarytænoidei.*

Impeditus situs, quem conjunctio thyreoideæ & cricoideæ cartilaginis abscondit, hunc musculum reddit difficiliorem.

Late nascitur a posteriori, concava parte cartilaginis thyreoideæ *o*, paulo exterius quam ea pars est, qua antè in angulum eminet, initio infra hilum factò, inde per totam fere ejus cartilaginis longitudinem: tum ab inferiori margine cartilaginis scutiformis prope ligamenta cricothyreoidea media, ab iis ligamentis *p*. Inde adscendit latus, & se contrahit *q*. Fibræ inferiores margini superiori exteriori cartilaginis arytænoideæ *r* partim supra cricoarytænoideum

n *Casser.* p. 12. *Camper.*
o *Bonhomme* T. 20. f. 4.
Casser. T. 13. f. 4. *Eustach.*
T. 42. f. 1.
p *Albin* p. 259. *Santorin.*
p. 105. *Fabric. de laryng.* P. I.
c. 8.

q Hic musculus nomen præcipuum retinet *Winslow* n. 452
Albino p. 260. T. 12. f. 3. 4. 7.
Walther de obes. & vorac. p. 3.
Santorina T. 3. K. L. Pars prima & media.
r *Winslow* n. 452.

lateralem , partim eo musculo tectæ , ad curvaturam usque inferuntur s. Pars fibrarum cum obliquo alterni lateris t arytenoideo confunditur.

Mediæ fibræ , non paucæ , per membranam , lacunar superius & laterale ventriculorum facientem adscendunt , ut alias fibras non possis ultra internam laryngis membranam sequi , aliæ vero ad epiglottidem usque nonnunquam possint produci.

Is fasciculus est *Thyreoepiglottideus* v , olim *Jacobo Berengario* x *Carpensi* dictus , tum multis nuperorum y.

Supremæ denique fibræ , natæ z a parte superiori cartilaginis scutiformis , superius ventriculo adjacent , & prope insertionem ligamenti hyothyreoidei introrsum potius , & retrorsum descendunt , & prioribus socias se adiungunt , inque cartilaginis arytenoideæ oram se immittunt.

Adeoque hi muscoli maximam partem ventriculorum laryngis exterius tegunt. Cartilagines guttales antrorsum ducunt , glottidem dilatant , ligamentorum glottidis tensionem minuunt. Cum

s *Albin.* p. 260. *Santorin.* f. 3.
Bonhomme l. c. *Casseri* l. c.
Eustach. l. c.

t *Albin.* p. 260. T. 12. f. 3.
v *Thyreoepiglottideus major*
Santorin. n. 14. T. 3. f. 2. N.
f. 1. f. *Nicholls* p. 32. *Walther*
de muscul. p. 596. edit. nostr.
Thyreoepiglottideus Winslow
n. 456. 457. *Albin.* T. 12. f. 3. 7.
Disdier p. 234. seqq.

x In *Murdinum* p. 396. b.

y *Douglas* p. 39. *Walther*
l. c. *de muscul.* p. 597. ed. meæ,
Albin. p. 260. An depressores
epiglottidis *Littre* *Memoir.* de
l' *Acad.* 1718. p. 300.

z Aliquoties &c. *Albin.* p. 260.
Thyreoararytenoideus minor Idem
T. 12. f. 6. 7. Superior portio
Santorin. T. cit. f. 1. 9. f. 2. Q.

magni viri a glottidem dixerint ab istis musculis arctari, experimento facto diducere didici, neque potest ullus ad latus cartilaginis arytænoideæ musculus terminari; quin eam rimam diducat; sic etiam *Camperus*. Ventriculos, dum tument, comprimunt & excutiunt *b*.

Epiglottidem, quantum per modicum fibrarum robur fieri potest, utique deprimunt.

§. XVI. *Arytænoidei obliqui & Transversus.*

Non satis, uti quidem in anatomicis tabulis, ita in cadavere hæ carnes distinctæ sunt. Ego quidem ita soleo reperire, ut a basi & longitudine tota partis crassioris cartilaginis arytænoideæ dextræ, in totam analogam longitudinem sodalis cartilaginis sinistræ, fibræ carneæ numerosæ transversæ *c* exeant. Hi sunt glottidis potentissimi sphincteres, breves quidem, sed efficaces, quod ad oras cartilaginum perpendiculares, eas totis viribus suis, nulla parte amissa, adducant. Est *arytænoideus transversus Albini d*.

Deinde ab his ipsis carnibus transversis posteriores aliquæ & superiores fibræ, paucae omnino,

a *Cowperus*, *Albinus*. Solus nobiscum consentit *Cl. Hofmannus* in *aeroteria* p. 91.

b *Albin.* p. 260. *Lieutaud* p. 190. *Camper.*

c *Albin.* T. 12. f. 1. T. 10. f. 13. *Cowper* T. 30. f. 1. 3. *Santorin.* T. 3. f. 1. c. c. *Eustach.* T. 42. f. 1. 2. Solum habet

Casseri p. 5. T. 13. f. 2. 3. 6. 7. 12. 13. 14. 16. Solum *Fabricius* f. 11. 38. Uterque tendinem non bene interponit, ex bove sumtum *Morgagn.* Adv. I. p. 37. *d* p. 256. *Winslow* n. 455. Majorem *Douglassius* vocabat p. 38.

discedunt, & fere e medio, & directione mutata, adscendunt *e*, magis magisque, atque in superiorem partem alternæ cartilaginis, neque penitus tamen ad cornicula usque veniunt. Id dum utrinque fit, musculus nascitur decussatus *f*, *obliquus arytenoideus Albin* *g*.

Cum thyreoarytenoidei fibræ dixi conjungi *h*. Vidi fibras a cartilaginis scutiformis margine superiori accessisse *i*. Dum agunt & ipsæ cartilagine adducunt, & una ligamenta, quæ glottidem intercipiunt.

Aliquæ, superiores horum musculorum fibræ, prætervectæ suas cartilagine, in membranas, quæ sunt inter epiglottidem & cartilaginem scutiformem, sedemque glandularum arytenoidum veniunt, eademque aliquoties in meis & in aliorum Clarorum *k* virorum experimentis, ad epiglottidis usque latera excurrunt, quæ proprio a nonnullis nuperis anatomicis *Aryepiglottideorum l* nomine veniunt, & epiglottidem,

e Nimis potius latus *Eustachius* l. c. *Bonhomme* T. 20. f. 3. *E.* Latissimos & solos *Morgagn.* *Adv.* I. Nostris similiores *Albinus* T. 10. f. 6. 13. T. 12. f. 1. *f* *Santorin.* l. c. c. d. *Bonhomme* T. 20. f. 3. 4. *Eustach.* l. c. *Albinus* T. 10. f. 13. *Cowper* l. c. f. 5.

g p. 254. T. 12. f. 1. T. 10. f. 13. *Arytenoidis* *croisé Winslow* n. 454. *Minor Douglas* p. 38.

h *Albin.* p. 254. *Santorin.* p. 110.

i *Albin.* p. 255. *Winslow*

n. 455. pro perpetuo; cum *Verbeyen* p. 191. *Lieutaud* p. 190.

k *Albin.* l. c. T. 12. f. 2. 3. T. 10. f. 13. 6. *Schaeber de larynge.* *Walther de obs.* & *vorac.* p. 7. qui multos fasciculos habet *J. Wilb. Pauli* in præf. ad *J. van Horne microcosm.* & dudum apud *Avicennam* oper. p. 14.

l *Santorin.* p. III. T. 3. f. 1. c. d. ad f. *Nicholls* p. 32. *Winslow* n. 457. *Disdier* l. c. & olim *Cl. Bauhini Theatr.* p. 542.

quantum ejus fieri potest, super aditum laryngis inclinant.

§. XVII. *Musculi laryngis rariores.*

Rariores voco, quos ego, non exiguo certe in cadaverum numero, nunquam viderim.

Primum fibræ carneæ nonnunquam in ligamento membranaceo fuerunt, quod a linguae postremo dorso it ad epiglottidem *m*. In brutis animalibus, eæ frequentius reperiuntur, ut in ove *n*, bove *o*, porco *p*. In homine simile quid *Eustachius* delineavit *q*, & inter nuperos vidit *Santorinus* *r* & retractorem dixit, passimque alii scriptores repetierunt *s*, & inter posthumas schedas *Cassebohmi* video, nonnunquam a Cl. viro repertum esse. A genioglossa *Waltherus* deduxit.

Non dubium est, quoties eæ fibræ adsunt, elevare epiglottidem, & de laryngis aditu remove, quoties eum inclinata textit.

Plerumque, quas fibras vocant, vasa sunt & fila cellulosa.

Porro in plurimis etiam brutis animalibus, leone *t*, fele zibethica *v*, lupo *x*, cane *y*,

- | | |
|---|---|
| <i>m</i> p. 378. | <i>comp. anat.</i> f. 34. K. <i>An levator</i> |
| <i>n</i> <i>Verbeyen</i> p. 186. | <i>epiglottidis Littrii</i> l. c. |
| <i>o</i> <i>Idem</i> ibid. | <i>t</i> <i>Parisini.</i> |
| <i>p</i> <i>Idem</i> p. 187. | <i>v</i> <i>Parisini.</i> |
| <i>q</i> T. 42. f. 5. | <i>x</i> <i>Faber ad Hernandez</i> p. 814. |
| <i>r</i> p. 113. | <i>y</i> <i>Douglas</i> T. 40. <i>Casser.</i> T. 9. |
| <i>s</i> <i>Heucher oper.</i> p. 564. <i>Ver-</i> | f. 8. 3. 5. 6. |
| <i>beyen</i> l. c. T. 42. f. 4. <i>Heister</i> | |

bove *z*, capreolo *a*, ove *b*, sue *c*, equo *d*,
uti membrana a basi ossis bicornis ad dorsum
convexum epiglottidis expanditur, ita fibræ
aliquæ musculosæ; una ad id operculum laryngis
veniunt, quæ alias unum, alias duos musculos
referunt.

Eas fibras jam *Fabricius* in humani *e* corporis
descriptionem recepit, dixitque musculum hyoe-
piglottideum, qui id operculum elevet. Res
vetusta est *f*, & passim a posteris renovata *g*.
Fabricius duos illos musculos in brutis anima-
libus solis, unicum alium altius in dorsum epi-
glottidis surgentem in homine constituit.

Rejecit olim, de hominis certe anatome
Fallopianus h, *Pareus i*, *Casseri k*, *Riolanus l*.
Dubitat *J. Benignus Winslow m*.

Cricoepiglottideus boum dictus *Verheyenio n*
eo cum nomine ad hominis anatomen traduc-
tus est.

Thyreoepiglottideus minor, parvus equidem
musculus, magnos tamen auctores *o* habet, qui
viderunt,

- z Fallop. Instit. p. 57. b. p. 34. Pauli l. c. Hofmann
Fabric. f. 31. 32. Casser. p. 10. aeroter. p. 10. Schacher de la-
T. XI. f. 2. 3. 5. T. XVII. f. 1. rynge. Garengot myotom. T. II.
T. II. f. 4. 6. p. 133. a cornubus deductum.
a Casser. T. 12. f. 1. 2. 11. b Instit. anat. p. 24. 57. b.
b Casser. T. 12. f. 1. 2. i L. V. c. 15.
c Casser. p. 10. T. 14. f. 2. k p. 10.
d Casser. T. 18. f. 2. T. 19. l Nempe omnes epiglottidis
f. 3. 4. musculos rejicit p. 313.
e Fabric. potissimum P. I. c. 3. m n. 458.
f Habet Avicenna p. 14. Ve- n p. 188.
salius p. 299. o Santorin. p. 112. T. 3. f. 2. P.
g C. Bauhin theatr. p. 542. Albin. T. 10. f. 3. k. i. l.
C. Bartholinus Instit. anat.*

viderunt, neque sinunt penitus rejici. A summa facie posteriori hili cartilaginis scutiformis surgit, in proximum epiglottidis latus.

Idem minutiorum particularum corporis humani indefessus scrutator alium muscūlum teretem, thyreoideæ cartilagini proprium, descripsit, qui supra terminum cricothyreoidei musculi natus, interno pariter scutiformis cartilaginis lateri infingeretur *p*.

A stitilopharyngæo ad epiglottidem fibras *Waltherus* deduxit: a primæ vertebræ processu transverso in totam partem transversam thyreoideæ cartilaginis *Nicolaus Habicot*.

§. XVIII. *Reliquæ laryngis partes.*

Membrana, Glandula simplices.

Cartilagine diximus, quibus larynx constat, & musculos, quibus regitur. Proprium quidem cartilaginibus suum perichondrion est, in quo vasculorum rete, & aliqua pinguedinis portio reperitur *q*. Membrana, quæ interior omnes cartilagine investit, & tubum asperæ arteriæ, eademque per bronchum in pulmonem descendit *r*, ea a faucibus venit, & ipsa cutis est, cum cellulosa tela circumfusa, qua ad cartilagine revincitur, & cum interiori epidermide, qua ad aeream fistulam patet. Ea membrana a

p p. 104. T. 3. f. 1. h. f. 2. M. noster Præceptor in *Comm.*

q Conf. J. G. *Duvernoi*, olim *Petrop.* T. VII. p. 220.

r T. VI. p. 243.

nervorum numero accurate sensibilis, pariter ut in aspera arteria, ipsius aquæ tactum repudiat. Vasculis ditissima tota rubet, neque rarissime inflammatur.

Verum, cum hæc ipsa cutis ab aere continuo ficcetur, & molesto cum sensu fiat immeabilis, plurimum ut alibi, ita hoc loco natura toti aereo instrumento circumfudit, limpidum & subcæruleum mucum, viscidiorum, quam in ore, minus quam in naribus tenacem s. Eum varia organa subpeditant. Is mucus coactus in membranæ speciem abit in morbo, quem scoti medici nuperiores descripserunt & dixerunt suffocationem stridulam.

Simplices primum folliculi *t* in cellulosa tela sedent, quæ cuti, siue nerveæ laryngis membranæ, circumponitur. Ii brevi ductu, per ipsam cutem producti, & pori *v* specie aperto, in caveam laryngis numerosi se exonerant, eorum similes, quos in asperæ arteriæ historia descripsimus. Reperiuntur in cricoideæ cartilaginis cava parte, quæ laryngem facit. De iis poris guttulas exprimere licet, & aliquanto uberiores utrinque vidi, ab arytenoideis cartilaginibus ad latera versus scutiformem cartilagine[m] recedere. Alii in ipsis ventriculorum caveis sedent, suumque mucum in cellulas effundunt, quibus fundus earum cavernularum effoditur *x*.

s Schneider de catarrh. L. III. privat. p. 6
P. 2. p. 538. Boerhaave de fabr. gland. *v* Morgagn. Adv. I. T. 2. f. 2. p. 30. Adv. V. p. 59.
t Amstelodamenses in colleg. *x* p. 235.

§. XIX. *Glandulæ Epiglottidis.*

Aliquanto majores sunt, & duriores eæ glandulæ, quæ epiglottidis dorso insident, & per sulcos epiglottidis majores y ductus suos emittunt, qui per eos sinus in cava hujus operculi facie caudis cellulosis vasculosis, & glandulosis z in similes glandulas propagantur, quæ eam faciem cuti substratæ obsident; eæ demum & ipsæ sua per foramina a mucum adfundunt laryngi, & in tota epiglottide conspicuæ, ad basin inprimis b, & in ejus crassiori petiolo; quarum appendices facile de sulcis & rimis ejus cartilaginis extrahas. Eas glandulas circumfusa pinguedo ambit c. Res dudum nota fuit, & carnem pinguem in epiglottide federe *Jacobus Berengarius d* reliquit, & substantiam glutinosam *Carolus Stephanus e*. Carunculas epiglottidi incumbentes, & ipsos canaliculos per epiglottidem trajectos *Stenonius* descripsit f, unamque magnam in convexo dorso ejus operculi majorem glandulam, plures in concava minores *P. Dionis g*. Rem totam *Morgagnus* accuratius exposuit h,

y *Morgagn. Adv. I. T. 2. f. 5.*
& *Adv. V. p. 68.* Magnos puto
hos sinus habet *Josias Weit-*
brecht l. c. f. 81. & Cl. Duvernoi
Comm. Petrop. T. VII. p. 218.
z *Morgagn. p. 2. Winslow*
n. 440.

a *Picta a Casserio, a Fabricio,*
a Santorino T. 3. f. 1. D. a Mor-
gagno l. c.

b *Comper append. f. 20. a. 2.*

c *Duvernoi l. c. p. 219.*

d *In Mundinum p. 396. b.*
Isagog. p. 45. b.

e *p. 251.*

f *De musc. & gland. p. 34.*

g *Cours d'anat. p. 480. Ver-*
celloni gland. œscoph. Sect. 2.

h *Adv. I. p. 2. Confirmavit*
Adv. V. p. 68. 69. Eum clan-
culum imitatur Vesheyenius
p. 187.

qui pro unica etiam & majori *i* glandula descripsit. Id quidem in arbitrio fuerit incisoris, in petiolo tamen manifesto solitariae sunt. Addit *Cl. Weitbrecht k* plicam, in parte posteriori & exteriori laryngis, inter scutiformem cartilaginem & musciculum cricothyreoideum posticum. In eam plicam credit hunc mucum colligi. Lineam, quæ absque foraminibus *l* & glandulis sit, ego quidem non invenio, cum ipse petiolus plenus sit glandulosis carunculis.

§. XX. Glandula arytenoidea.

Super glottidem carnem glandulosam federe *Jacobus Berengarius m* reliquit, multorum inventorum primus investigator.

Accuratius *J. Baptista Morgagnus* grana glandulosa coacervata *n* descripsit, quæ in convexa cartilaginum arytenoidearum facie sedent, & quæ pro una utrinque arytenoidea glandula numerat *o*. Gnomonis, sed obtusanguli, figuram utervis acervus habent *p*. Crus alterum *q* fere ad perpendiculum ponitur, & foveam replet, ex iis quibus arytenoidea cartilago exsculpitur, atque a corniculo ad ventriculum usque descendit:

i Ibid. tum *Verheyen* p. 187.
qui tamen discedere fatetur,
& solitarias fieri.

k *Comm. Acad. Petropol.*
T. 14. p. 214.

l *De Borden* p. 88.

m *In Mundinum* p. 393.

n *Plusieurs glandes, Lieutaud*
p. 188. Exiguæ glandulae *Ver-*
heyen p. 189.

o *Adv. I.* p. 1.

p 1. c. & T. 2. f. 6. k. 1. h. i.
Bonhomme T. 17. f. 13.

q 1. c. k. 1. h.

alterum crus magis horizonti parallelum *r* ligamento thyreoarytænoideo molliori & superiori fulcitur *s*. Ductus suos sibi seorsim habent, porosque; non communem aliquem excretorium canalem.

In ovibus descriptas dedit *Theophilus de Borden* *t*, quibus in animalibus aliquantum alia ab humana fabrica obtinet.

Cum ex iis quasi acervis solitarii per vicinas laryngis partes acini se dividant, etiam ad glottidis sedem ejusmodi acini reperiuntur *v*, quos ipsos *Galenus* *x* voluit, & *Oribasius* *y*.

Aliam glandulam innominatam, in parte superiori cartilaginis anularis, inter duas arytænoideas cartilagineas positam, globosam, majorem dixit *Philippus Verheyen* *z*, quam nemo repetiit, & quam forte ad illos solitarios acinos referas, in aliquo cadavere super solitum morem congestos.

§. XXI. Glandula thyreoidea.

Ex maximis corporis humani glandulis est, quæ exterior laryngi adfidet, & cum eo commodius describetur. Perampla, infanti potissimum, feminisque aliquanto vastior *a*, in juvene 28. annorum drachmarum septem fuit cum

r Ibid. h. i. Winslow n. 437. *usu part. L. VII. c. 13. Fabricius* Morgagn. p. I. *c. c. 9.*
t l. c. p. 97. 98. *y* Adipatam p. 60.
v De Borden p. 99. vocat *z* p. 189. T. 22. f. II. e. e.
couche glandeuse. *a* Columbus p. 209. lege 214.
x Viscidam esse glottidem de Inde collum æquabile Whar-
ton, Comper ad Bidloo T. 21.

femisse, cum parotides conjunctæ novem drachmas non superarent *b*. In recens nato homine uncia est pondere *c*, atque adeo paulum cum vita increfcit, hætenus a thymo diverfa, forte ob fedem minus compreffam *d*. In homine unica longe plerumque est, rariffime in duas divifa *e*, quod in animalibus *f* frequens est, & fraudi fuit Cl. viris, qui eandem in hominis descriptione fabricam receperunt. Duas *Vesalius g* dixit, & priori feculo utroque plerique *h*. *Isthmum*, quo duo lobi conjunguntur, inventum ab *Eustachius i*, *Casseri* *k* restituit, & *J. v. Horne l*, Deinde unicam esse glandulam vulgo receperunt *m*.

Anteriora tenet thyreoideæ *n* cartilaginis, atque cricoideæ, & denique superiora anulorum

b Warthon p. 119. 120.

c Boecler l. c. p. 11.

d Cheselden p. 214.

e Semel vidi; semel *Morgagnus Epist. IX. n. 40.* Vidit etiam Cl. *Schulze* apud *Bachner miscell. 1727. p. 252.* & de off. *conferunt.* Pene duas pingit *Eustachius 25.* *Isthmum parvum,* & pene nullum vidit *Arent Cant. p. 16.*

f In ove *Lalouette p. 165.* *Mem. des Savans étrangers T. I.* in equo *Bourgelat hippiat. T. II. P. 2. p. 504.* in fele *Lalouette p. 164.* in cane *Everste T. I.* in mure *Morgagn. Epist. IX. n. 30.* in lepore *Idem.* In cane tamen etiam & bove nonnunquam isthmus adest *Idem ibid.* & in bove *T. 2. f. 4. Lalouette.*

g p. 727.

h *Sylvius Isag. L. I. c. 7.* *Fallopins Instit. anat. p. 40.* *Warthon c. 6.* *Linden physiol. p. 579.* *Highmor. disquisit. p. 175.* *D. de Marchett. c. 11.* *Dionis cours d'anat. p. 484.* *Verbeyen T. 22. f. 2.* *Mavult duas dici de Borden p. 149.* *Glandulas vocat Ruysch Thes. I. aff. 2. n. 2.*

i *T. 41. f. 8.*

k *T. 1. f. 1. & apud Spigel. L. IV. T. II. f. 1.*

l In *microcosmo.*

m *Fantonius p. 325.* *Bidlous T. 24. f. 8.* tum in diff. Cl. *Eversten de gland. thyreoid. & in primis Morgagnus Epist. IX. n. 33.* *Winslow n. 588. 589.*

n *Eversten tab. 3. Tab. 1. arter. tot. corp.*

asperæ arteriæ , & latera. Mastoideo , coracohyoideo , sternohyoideo , & sternothyreoido musculo tegitur *o* & cutaneo. Ad cricoidem cartilaginem exactius *p* , ad vicinas partes laxius cellulosis fibris adhæret , etiam ad œsophagum *q*.

Inferior margo obiter in lobos divisus deorsum convexus est *r* , ut vertex parabolæ ante asperam arteriam sit , sub ima cricoidea cartilagine ad tertium usque bronchi anulum *s* , & summum sternum respiciat , latera utrinque ad superiora divergant. Vidi in vetula inferiori loco positam *t* , ut sola summa cornua ad imam cartilaginem thyreoideam venirent , imus isthmus ad sextum *v* anulum descenderet. Superior terminus longe plerumque trifidus est , sæpe & inferior. Duo laterales lobi utrinque per musculi hyothyreoidei faciem anteriorem summam *x* ad cartilaginem scutiformem adscendunt. Plerumque pares sunt , vidi tamen dextrum longiorem fuisse. Conicus uterque & obtusus est *y*.

Media vero , ex conjunctione horum majorum cornuum surgit columna *z* a *Bidloo* picta *a* alias

o *Casser. T. I. Bidloo T. 15. f. 2.*

p *Weitbrecht f. 81. l. 1. Lalouette p. 160. Gunz p. 284.*

q *Lalouette p. 61.*

r Valde longa portio , quæ isthmus *Eustach. T. 26.*

s Quartum *Lalouette p. 160.*

t Talis fere *Eustachii* figura est XXV. & XXVI. & *Lalouette f. 1.*

v Ad octavum *Eversten.*

x Non eo usque *Eustachius T. 41. f. 8. aut T. 26.*

y *Heister Eph. Nat. Cur. Cent. VII. VIII. obs. 63. tab. 6. f. 2. 3. Bidloo l. c. Lalouette f. 1.*

z *Morgagn. Adv. I. T. 1. c. Lalouette l. c. p. 167. Winslow n. 589. Bonhomme p. 203. Non habet Eversten.*

a Pingitur reclinata *T. 24. f. 8.*

cylindrica *b*, alias alterne contracta & dilatata. Sursum sæpe gracilefcit *c*, alias sursum crassior *d* fit. Plerumque ante membranaceum summæ cartilaginis thyreoideæ, & hyoidis ossis intervallum gracili fine terminatur *e* aliquando adeo longa, ut etiam pone os bicornæ producat *f*. Alias brevior est, adque hilum cartilaginis thyreoideæ sui finem facit *g*. Rarum est, quater vidi tamen, nullam ejusmodi appendicem fuisse *h*. Frequenter sinisteriora *i* tenet, aliquando tamen dexteriora *k*. Vidi etiam propriam glandulam fuisse, quæ ante mediam cartilaginem thyreoideam ponebatur, neque ad thyreoideam pertinebat. Vidit *Ill. Gunzius* duplicem fuisse appendicem *l*, & bifurcatam vidit *Morgagnus m*.

Non recte adeo thyreoidea glandula bicornis pingitur *o*, nisi icon ad raras nonnullas observationes *p* facta sit.

Exterior color in fetu, ex sanguinis copia fere rubet, in adultis *q* hominibus aut ruber est pariter, aut expallescit, in feminis etiam magis *r*.

b Fere apud *Bidloo*.

c *Morgagn*, *ibid.* Pyramidem vocat *Lalouette* p. 163. addit in viro planiorem esse.

d Varietates vidit *Morgagnus* n. 34. 36.

e Finiri ante basin ossis hyoidis *VVinslow* n. 589. Etiam hic varietates recenset *Morgagnus* n. 36.

f *Morgagn*. n. 36. *Lalouette* p. 163. *Gunz* p. 284. Ea parte cellulosa tela adhæret.

g *Tab. art. anter.*

h Nullam *Morgagnus* fuisse

vidit *Adv. VIII.* n. 34.

Advers. VI. p. 119.

i *Santorin.* p. 114.

k *Morgagnus* varietates habet *Epist. IX.* p. 267.

l *Memoir. des Savans étrangers* T. I. p. 283.

m *Epist. IX.* n. 36.

o *Casser.* T. 15.

p Lunatam simpliciter, & sinisterorsum emarginatam vidit *Boehmer præf. fascic.* p. 13.

q *Gunz* p. 284. *Lalouette* p. 160.

r *Lalouette* p. 160.

Interior fabrica & ipsa rubra aut flava, mollis *s*, ex obscurioribus *t*, quam aliæ glandulæ, minusque distinctis, rotundis lobis *v*, constat, neque pariter conspicua cellulosa intervalla habet, per quæ vasa interiora incedant, etsi pariter tota cellulosa densoque involucro tegitur *x*. Appendix tamen glandulæ conglomeratæ similior est *y*. A thymo differt *z*, quod neque album succum habeat, neque cellulosa spatia, quæ facile inflentur.

§. XXII. *Ejus fabrica.*

Interior fabrica aliquanto minus, quam in aliis glandulis conglomerati generis, nota est. Lobos equidem rotundos *a* majores videmus; deinde in istis figuræ ejusdem acinos *b*, tum in siccata glandula numerosas cellulas *c*.

Non rarum est equidem, & dudum Ill. *Morgagno* visum *d*, deinde repetitum a Cl. *Lalouette* *e* aliquid vesicularum simile *f*, cæcum in ea glandula apparuisse. In iis cellulis flavescentem *g* humorem *Idem* Cl. *Parisinus* medicus ostendit,

- | | |
|---|---|
| <i>s</i> Gunz ibid. | boso corpore, <i>Lauth</i> in diff. |
| <i>t</i> Ita etiam Cl. <i>Gunz</i> l. c. | de <i>thyreoid</i> , <i>Lalouette</i> p. 162, |
| <i>v</i> <i>Casser</i> . T. 1. f. 15. <i>Bidloo</i> | 165. 166. |
| T. 24. f. 7. 8. <i>Heister</i> l. c. f. 2, 3. | <i>c</i> <i>Lalouette</i> p. 165. |
| <i>x</i> <i>Gunz</i> l. c. | <i>d</i> <i>Epist.</i> n. 38. p. 273. n. 39. |
| <i>y</i> <i>Bidloo</i> ic. cit. | p. 274. |
| <i>z</i> Comparari solet, ut a | <i>e</i> p. 162. 165. 166. 168. |
| <i>Covvpero</i> ad <i>Bidloo</i> T. 24. f. 7. | <i>f</i> <i>Eversten</i> l. c. |
| <i>Boeclero</i> de <i>thyreoid. thymo</i> &c. | <i>g</i> <i>Morgagn.</i> Adv. I. n. 35. |
| <i>a</i> <i>Morgagn.</i> n. 38. <i>Heister</i> | <i>Heister</i> Eph. Nat. Cur. Cent. |
| in fig. 2. Tab. ant. I. | VII. VIII. l. c. |
| <i>b</i> <i>Morgagni</i> n. 38. in mor- | |

quem & alii mollem, olei amygdalarum similem *b*, insipide dulcem *i*, in tota undique glandula reppererunt, & qualem in appendice gelatinam noster olim *Præceptor J. G. Duvernoi k* memorat. Majores alias hydatides fuerunt.

In eas cellulas aerem *Cl. Lalouette* impulit: ita glandula tota intumuit *k**, ipsique acini, ut denique creparent aere turgidi *l*. Idem in glandulam impulso flatu lymphatica vasa versus thyreoideam & cricoideam cartilagine euntia turgere *m* vidit, quæ numerosa nuper egregius incisor *G. Hewson* vidit, in dextro latere in angulum venam inter jugularem & subclaviam inserta, in sinistro in ipsum ductum thoracicum. In appendice etiam *n Lalouette* vesiculam conspexit, plenam eodem flavo liquore. Aerem in eam vesicam impulit, vesiculasque universæ glandulæ elevavit *o*.

Verum has quidam cavernulas nimis grandes, nimisque incertæ aut magnitudinis aut figuræ, alii *Cl. viri* ad cellulosi textus lacunas referunt *p*, eo majori cum veri specie, quod perinde inter se cellulosæ telæ cavernulæ communicent, quod ab acinorum fabrica alienum est, & quod lymphatica vasa a cavernulis cellulosis manifesto oriantur *q*. Certe, quod præcipuum est, glandula

b Oleosum & viscidum *Fal-*
lopius instit. anat. Quasi olei
globuli innatant *Heister Com-*
pend. T. II. p. 24. In manati
alter succus pene pultaceus est,
nam duos continet *Comm. Nov.*
Acad. Petrop. T. II. p. 315.
i Morgagn. n. 37. p. 271.
k Comm. Acad. Petrop. T. VII.

p. 216.

*k** *p. 162.*

l *p. 163.*

m *p. 163. 166.*

n *p. 163.*

o *p. 164.*

p *Phil. Henr. Bœcler in diss.*
de thyreoidea, thymo &c.

q *L. II. Sect. II. p. 312. seqq.*

tota undique pressa, & appendicula, contra os hyoides caveamque epiglottidi obversam elisa, nihil quidquam emittit liquoris *r*, etiam in Cl. *Lalouette* s periculis. Et si in aliis experimentis pressa glandula, viscidus humor in laryngis ventriculos exiit *t*, neque tamen aut ipsa ostiola detegere potuit vir Cl. neque dubii sunt fontes mucii ventriculorum, neque difficulter compressa glandula thyreoidea cryptas ventriculorum potuit urfisse; succum denique non in veras cavernas, sed in ipsam, quam vocant, glandulæ substantiam effusum repetit, & utiliter monet, quem toties laudavimus, *J. Baptista Morgagnus v.*

Obscura adeo hujus glandulæ utilitas est. Antiquitas *x*, & nuperi plerumque Cl. viri *y*, ad laryngem irrorandum crediderunt pertinere, cum & situs faveat, & mollis succi natura.

Viderunt equidem varii scriptores ostiola aliqua, quæ eo pertinere eorum crediderunt aliqui, alii prudentiores non sustinerunt ad nostram glandulam revocare. Ejus generis ovale ostium in anteriore parte glottidis, proxime orificium ventriculi, sub angulo ligamentorum inferiorum *Morgagnus* vidit *z* & *Santorinus a*. Aliud juxta ligamentum anterius epiglottidis *Winslowus b*.

r Morgagn. Epist. IX. n. 36. p. 115. &c. Parva thyreoidea p. 269. Heister compend. anat. glandula est in animalibus, T. II. p. 24. quæ non loquuntur, de Borden p. 166.
s p. 168.
t p. 169.
v Epist. IX. n. 38. z Epist. IX. n. 35.
x De util. part. L. VII. c. 17. a p. 115.
y Dionis p. 484. Santorinus b n. 590.

Canalem prope laryngem pervium *Vaterus c* dixit, per quem credebat se thyreoideam glandulam replevisse.

Versus os hyoides ab appendice ejus glandulæ canalem visus sibi est deduxisse *J. G. Duvernoi d*, sed inventum non ultra profecutus est.

Addi potest, frequentes tumores aereos *e* in glandula thyreoidea a nixu parturientium oriri, qui cellulofam telam distendant, manifesto argumento, vias esse ex aspera arteria, per quas aer in thyreoideam glandulam exeat, eoque, & in laryngis ventriculos liquidum glandulæ per lymphatica vasa effundi posse suspicatur vir *Cl. f*. Sunt denique super primum *g* bronchi anulum ostiola, aut in ipso primo anulo, & minimus ductus, per quas vias *Theophilus de Borden h* glandulam thyreoideam inflavit *i* & per quas fetas immisit. Addidit, dissolutum per medicamenta thyreoideæ glandulæ tumorem in aquam discessisse, quam æger per alvum egerit *k*.

Paucis verbis, sed tamen certis, ductum ejusdem glandulæ sibi inventum tribuit *Cl. Desnoues l*, per foramen vero cæcum linguæ exonerari eandem, adfirmavit *Georgias Daniel Coschwitz m*.

Egregiæ *Cl. Virorum* expectationi eventus

c De ductu salival. p. 16.

d l. c. p. 217.

e *Lalouette* p. 168. 169.

f p. 172.

g *Valther de lingua* T. III. f. 2. p. 37.

h p. 156. 159. 160.

i p. 161.

k *Rendit*, p. 154.

l *Lettres à Guilielmini* p. 154.

m In diss. de ductu saliv. *Coschwitz*.

hactenus non respondit. *Santorinus* *n*, quem putabat se detexisse ductum, ipse candidus deferuit. Ill. olim *Vaterus* totis triginta annis post illos primos fere suos in re anatomica conatus, nihil addidit ad illas suæ juventutis voces, & nihil adeo videtur interim reperisse, quo suas spes confirmaret.

Via ex aspera arteria in cellulofam telam vi aperiri possunt, neque infrequens est in morbosa glandula vias apertas ad caveam asperæ arteriæ duxisse.

Ill. *Morgagnus* perspicax monuit, & nondum inventos esse ductus *o*, & non posse alios esse, nisi minimos, cum major guttula sensilem asperam arteriam ad intolerabilem tussim provocet. Ostiolum quod viderat, in iteratis inquisitionibus reperire nequirit *p*, neque *Winslowiana* alia *q*.

A *Cl. Theophilo de Borden* alia peritiæ anatomicae specimina exspectamus, quibus persuadeat, ea se vidisse, quæ cum maxime videre cuperent, multos per labores ad hoc ipsum susceptos, non potuit videre, aut *Morgagnus*, aut *Santorinus*, aut *Ruyschius*, aut *Albinus*. Obiter enim ut moneam, facile hactenus est invenire, quæ a nemine magna cum industria sunt quæsitæ, difficillimum vero super eos limites progredi, quos summi in arte viri superare non potuerunt, cum maxime niterentur superare. Id

ⁿ p. 115.
^o *Adv. I.* p. 35, 36. *Adv. V.*
p. 66.

^p *Epist. IX.* n. 35.
^q *Ibid.* n. 36. p. 270.

quidem probabile fit, arterias a Cl. *de Borden* visas esse, quæ per ea cartilagineorum anulorum foramina eunt, venas enim ea via ducit ipse, neque venas *r* absque arteriis fuisse credibile est.

Denique, glandulam thyreoideam ad œsophagum ductum suum mittere, & eo verminosum vitale *s* principium suppeditare, Cl. *Astensis* Medicus suspicatus est: contra eam vero sententiam alii Cl. viri *t* ejusmodi rationes dederunt, quæ eruditis iudicibus satisfecisse videntur.

Alii Cl. viri, cum penitus de inveniendo ductu desperassent, ad aliam omnino utilitatem se converterunt. Liquorem peculiarem in ea glandula parari, qui receptus venulis sanguini reddatur, quæ etiam lienis & thymi sit utilitas, ipse *Ruyfchius* *v* autumavit. Ad sanguinem attenuandum pariter usui esse, qui in fetu viscidus sit *Boeclerus* *x* probabile existimat. Lymphaticæ classi alii adscribunt *x*^{*}.

Utilitatem certo, neque exiguam, ab enormi copia sanguinis exspectasse licet, quam continuo ostendemus ad hanc glandulam venire, & ab ejus glandulæ in quadrupedibus omnium classium, etiam amphibiiis, constantia.

Strumis obnoxia *y* frequenter nimis in patria mea ejus mali plurima sedes est. Vidi in glandula

r p. 160.

s *Vercelloni* de gland. œso-

phagi.

t *J. Vilhelm. Pauli* in progr. 1718. edito. *Morgagn. Epist. IX.* n. 38. &c.

v In epistola quam *Engel-*

bertus de Vesthofen edidit de angina p. 42.

x l. c.

x^{*} *Astruc* des tumeurs p. 166.
y *Phil. Contr. Fabric. anat. pract.* p. 116. Conf. *Peyer* obs. 3. *Morgagn. Epist. IX.* n. 38. seqq.

thyreoidea cystides, etiam cartilagineo velamento firmatas, & effusum sabulum, alias ossæ concrementa z in glandula dispersa, partemque glandulæ in pinguis lardi speciem degenerem. Anginam contra in ea residere non credidero a.

§. XXIII. *Ejus musculus levator.*

Et si a variis, quos enarravimus, musculis, summis consentientibus b auctoribus c, utique hæc glandula contra resistantem bronchum & laryngem emulgeri potest, habet tamen etiam suas peculiare carneas fibras. A thyreopharyngeo d aliquas habere lego, mihi non notas, ut tamen ideo omnino Cl. viri auctoritatem non repudiem. A cricothyreoideo, dextro in latere, numerosiores, quam ipse azygos est, fibras in glandulæ superiora se disjecisse vidi. Sed habet, non in omnibus, in plerisque tamen mortalibus, proprium, a quo sustentatur e, musculum, plerumque sodali destitutum & imparem, plerumque sinistrum f, ut tamen, rarius quidem, & in dextro latere g sit visus, & utrinque h.

z Ossæ in glandula thyreoidea Janus Plancus de monstr.

a Eversten diss. cit.

b Santorin. p. 115. Lalouette &c.

c Negat, quod nimis mobiles sint. Cl. de Borden p. 171. Mihi cum larynge mobiles, ad laryngem contra firmæ videntur.

d Lalouette p. 161.

e Perpetuum facit Schreibe-

rus in edit. Douglassianæ myograph. p. 58. Habet Albinus, apud Bohlium de morfu, & Heymannum Comment. Boerb. p. 457. T. I. Adde Gautier T. 4.

f Eustach. l. c. Schreiber l. c.

g Schreiber l. c.

h Schreiber l. c. Semel vidi, ut sinister a cornu ossis hyoidis proveniret.

A parte cava, non penitus media, baseos ossis hyoidis *i* suam originem tendineam ducit, finitimus hyothyreoideo, non tamen idem *k*. Descendit cum columna glandulæ media, & disjectis fibris *l* super anteriorem faciem glandulæ *m* se disjicit, & involucro ejus membraneo, celluloso, adhærescit. Sustainet glandulam, ne a pondere suo detrahatur.

§. XXIV. *Laryngis arteriæ.*

Thyreoidea superior.

Commodo occurrit, ut arteriæ laryngis eadem cum arteriis thyreoideæ glandulæ sint.

Superior ergo *Thyreoidea* arteria plerumque primus ramus est externæ carotidis, idemque ex maximis *n*, neque raro omnino cerebrali arteriæ æqualis, quam vulgo internam carotidem vocant. Ita vicina divisioni carotidis provenit, ut aut tres *o* omnino ejus trunci rami sint, aut paucis super secessionem cerebrialis arteriæ lineis thyreoidea nascatur *p*.

Trunco

i Eustach. T. 41. f. 5. 8.

k Eundem esse Duvernoi l. c. Aberrantem ab eo musculo portionem habet Cowper T. 30. f. 1. nostri similem; sed qui in cartilagine thyreoidea maneat.

l In velamenta cricoidis, aut inferius in summo broncho late spargi Bass. Dec. II. obs. 1.

m Eustach. l. c.

n Petsche n. 39. Lalouette p. 161.

o Conf. Gunz de arter. maxill. p. 12. Fasc. anat. T. III. tab. art. lab. II. E. Haymann Comm. in I. R. M. T. VI. p. 18.

p Tab. tot. corp. tab. art. max. F. F. tab. thy. inf. I. mi nini. tab. art. labial. II. m.

Trunco suo *q* flexuosa introrsum descendit *r*, & cum superiori ora cujusque lobi lateralis glandulæ cognominis, deinde eo tecta & posterior, in sedem isthmi ejus glandulæ venit, circumque sæpe cum compare perficit *s*. Numerosas propagines, perinde flexuosas, in eandem glandulam demittit, quarum furculi lobulorum majorum *t*, deinde acinorum intervalla perreptant, ut in glandulis conglomeratis solent. Ab earum numero glandula rubet.

Appendix ejusdem glandulæ furculos ab iisdem accipit, qui cum hyoideo ramo lingualis arteriæ communicant.

Alii furculi asperam arteriam adeunt, & vicinos musculos *v*, spatium membranaceum inter os hyoides, & cartilaginem thyreoideam, velamenta utriusque, pharyngem, denique thymum.

Sed ramus *laryngeus*, qui non rarissime seorsim a trunco externæ carotidis nascitur, aliquando etiam a pharyngea natus est, is quidem plerumque thyreoideæ est propago. Idem super cartilaginem thyreoideam, eam inter & os hyoides, supra musculum thyreopharyngeum, in laryngem subit, rarissime certe per foramen cartilaginis scutiformis.

Præcipui furculi sunt; qui in dorso epiglott-

q Conf. totam descriptionem d. t. d. aut duplicem ad a. cum explicatione art. max. intern., not. b. in fascic. II. (Conf. & Lalouette p. 161.) Alium inferiorem fasc. VIII.

r Tab. ant. r. d. a. tab. art. max. tab. thy. inf. I. tab. art. lab. II. p. 10. *t* Tab. anat.

v Vide aliquos tab. art. labial.

s Simplicem tab. corp., ant. n. 9. p.

Tom. VII.

S

tidis rete facit : qui transversus faciem laryngis posteriorem adit , ad arythænoideas cartilagineas & cricoarythænoideum posteriorem ; qui ad cricoarythænoideum posticum , lateralem , & thyreoarythænoideum musculus venit , suisque furculis sub cartilagine scutiformi aut per intervalla ligamenti cricothyreoidei ad anteriora emergit ; denique truncus profundior in ventriculos , faciei-que anterioris laryngis membranam muciferam dividitur.

Varietates , & alios ramos , huic nostræ brevitati minus idoneos , alias descripsi x.

Maximam vidi fuisse arteriam , cum inferior perexigua esset.

§. XXV. Thyreoidea inferior.

Etiam hæc ex præcipuis arteriis est y , & vertebrali aut æqualis , aut demum major z , & tota nonnunquam reliqua subclavia amplior a. Origo est a subclavia , antè quam vertebralis , sed eodem fere loco , paulum etiam exterius b , ad exteriorem scaleni prioris oram. Visa est ex arcu aortæ prodire b*. Semel rarissimo exemplo , ex carotide nasci vidi c. Vidi ad

x Fascic. II. III. VIII. p. 10.
y Lege totam descriptionem Fascic. II. § VIII. p. 60.
Habet etiam Cl. Vink van de bloedvaten p. 54.

z Fascic. II. tab. art. thy. inf. not. e.

a In infante ibid. Vidi in recens nato puero diametrum subclaviæ fuisse oo. oo. 09, dia-

metrum thyreoideæ inferioris oo. oo. 08. superioris oo. oo. 07.

b Tab. art. thy. inf. f. 1. tab. ant. tot. corp. di tab. IV. & V. Fasc. VII.

b* Vink p. 50. Erdman & Neubauer diss. posth. T. 2. f. 2. Meckel in Epist. ad me II. n. 321.

c l. c.

Sect. I. THYREOID. INFERIOR. 275

glandulam cognominem adeo exiguum ramum ivisse , ut negligi posset.

Multi hujus arteriæ rami sunt , alterius quidem loci , *scapularis d* descendens ad subclavium , deltoideum musculus , articulum humeri , trapezium , levatorem scapulæ , supraspinalem , infraspinalem &c.

Cervicalis transversus e ad musculos cervicis numerosos , medullam etiam spinalem *f* tendit ; *Cervicalis adscendens g* ad musculos colli laterales , glandulasque ejus loci , medullam spinalem *h*. Truncus *i* ad glandulam suam accedit , & in eam finitur *k* , ut tamen ad bronchum etiam *l* , & musculos a larynge ad pharyngem euntes , tum ad epiglottidem & thymum rami veniant. Præcipuus tamen ejus ramus *laryngeus inferior* , ad gulam dato furculo , sub œsophageo musculo , tum per intervalla cricoarytænoidei postici , duobus aut numerosioribus propaginibus in laryngem venit , ad eum musculus , quem dixi , atque thyreoarytænoideum , & spatium ipsum hyoides inter os & cartilaginem scuti-formem , cum superiori thyreoidea fere anastomosi conjunctus. Ejus furculus sub cricothyroideo anulum facit cum fodali.

Ramus denique *thoracicus m* , ad bronchum ,

d Tab. Thy. I. Q. tab. tot. corp. post. 2. tab. tot. corp. ant. v. & imprimis in fascic. VI.

e l. c. c. & tab. cit. R. Tab. II. X. Y. tab. ant. tot. corp. æta.

f Fascic. II. l. c.

g T. II. c. e. Fascic. VII. l. c.

h ibid. T. Post pita ro. tab. ant. tot. corp. fascic. VII. T. 4. O. T. 5. V.

i ibid. tab. ant. tot. corp.

k h. ibid.

l l. tab. ant. tot. corp.

m T. I. thy. o. p. q. r.

ejus glandulas , mediastinum posterius , gulam , & membranas vertebrales dividitur , & cum intercostali superiori atque bronchiali vera inofculatur.

Duas vidi thyreoideas inferiores arterias fuisse , a subclavia utramque. Tunc altera perexigua est. Duas etiam alias reperi , sed alteram a carotide dextra *m**. Est ubi altera ab aorta accessit.

§. XXVI. *Vena laryngis partiumque vicinarum.*

Venarum itinera hic ab arteriosa fabrica remota sunt , ut tamen tres ad venarum ordines omnes referas.

Primus est venarum *thyreoidearum inferiorum*. Frequenter binæ sunt , quæ ex subclavia sinistra , sibi vicinæ , perpetuæ adscendunt & in universum locum tenent inferioris arteriæ thyreoideæ , ejusque ramos minores comitantur. Alias altera ex ipsa venæ divisione *n* , & demum ex jugulari dextra , aut a jugulari ejus lateris venit ; aut tres omnino sunt , quarum duæ a jugularibus , tertia a subclavia sinistra prodit. Rarius unica est , pariter ex sinistra subclavia *o* nata. Medio ex thymo ad suam glandulam adscendunt , & in arcum egregium coalescunt , cumque superioribus & mediis thyreoidis etiam coeunt. Ramus insignis *laryngeus* sub cartilagine scutiformi cum arteria subit , quam porro comitatur. Alios ramos broncho exhibet & thymo.

*m** Habet ex carotide *Vink* T. III. *Traité des veines* n. 64.
P. 54.
n *Veine gutturale Winslow* *o* *Eustach.* T. 25.

Media venæ *thyreoidea* fere duæ *p* utrinque, ad venam jugularem internam pertinent, inter ejus venæ originem, & superiorem sui nominis venam natæ. Cuti, spatiiis subcutaneis, & glandulæ *thyreoideæ* anteriori faciei, & posteriori, & laryngi etiam prospiciunt. Cum utroque superiori *q* & inferiori *r* trunco magnis anastomosis solent convenire.

Vena *thyreoidea superior* *s* unica, aut ex duabus radicibus in unam conjuncta, sodalis & vicina suæ arteriæ, ad supremam sedem cartilaginis *thyreoideæ* & ipsa nascitur: editoque non raro ramo ranino, quem alias rectius descriptum dabimus, aliquando etiam faciali, ad cornu cartilaginis, quam dixi, superius se adplicat, ante musculum *sternothyreoideum*, adque mediam fere sedem glandulæ *thyreoideæ* tendit introrsum, truncisque suis per cornu sui lateris descendit, & inter id cornu atque appendicem, egregiam coronam cum sodali perficit, atque maximis per aciem anteriorem hujus glandulæ ramis distribuitur. Ab ea *hyoidea* vena provenit, & *laryngea*, suæ arteriæ comites, & plexuosæ ad *œsophagum* & retro eum ad corpora vertebrarum venæ.

§. XXVII. *Nervi laryngis superiores.*

In universum arteriarum sodales sunt. Pariter

p Duas habet *Eustachius* *q* *Eustach. T. 25.*
T. 25. Tres, aut quatuor, *r* *ibid.*
 ex vena jugulari *Lalouette* *s* *Petite veine que donne la*
p. 162. *jugulaire interne, Winslow.*

adeo & superior *laryngeus* nervus est, & inferior, uterque octavi paris propago. Eos pro dignitate oportet persequi.

Ramorum, in quos octavum par finditur, postquam de cranio exiit, hic *superior Laryngeus* imus est *t*, & paulo post sub atlante non raro alio furculo ab eodem trunco augetur *v*. Pone carotidis ramos incedit, & comitatur arteriam laryngeam. Habet ramum externum præcipuum, & alium internum. Externus *x* dat furculum cum ramo ganglii intercostalis magni conjunctum, ex quo rami ad hyothyreoideum *y*, thyreopharyngeum *z* & glandulam thyreoideam eunt *a*, aliumque, qui perforato cricopharyngæo musculo in cricothyreoideum abit. Idem ad cardiacum nervum eum, quem dicam, furculum edit.

Interior subit laryngem *c*, super oram cartilaginis scutiformis, jam divisus. Ejus quatuor præcipuos furculos inveni, etsi inconstans fabrica est. Prior epiglottidis dorsum adit *d*, alter membranam pharyngis & thyreoarytænoideum musculus *e*. Tertius in cricothyreoideum dividitur nisi eum supplet externi rami furculus. Quartus

s *Andersch*. Tab. nerv. cord. 4.

v *Eustach*. T. XVIII. n.

Albini. Sed eum ramum mireris pingi, tamquam ante laryngem, aut certe infra eum, minime cartilagine scutiformi tectus descenderet. *Vieußsens*

T. 23. p. *Winslow* n. 116.

Willis T. IX. h.

x Ramus superior *Vieußsens* p. 181. Habet *Andersch*.

y *Fabricius* f. 23. *Runge* ibid.

z *Vieußsens* p. 181. *Andersch* ic. *Runge* de org. vocis p. 50

a *Winslow* n. 116. *Runge* ib.

c Inferior ramus *Vieußsensii* p. 181. Sed eum unice in musculos pharyngis ducit.

d Tertius *Runge* p. 31.

e Videtur primus & secundus *Runge* p. 30.

arytænoideos musculos *f*, & crycoarytænoideum lateralem, & posticum adit, inque eo musculo cum recurrente conjungitur *g*. Ad sternohyoideum & coracohyoideum ramos, quos *Casseri* *h* eo ducit, ivisse non vidi, neque ad stylohyoideum & geniohyoideum, quos habet *R. Vieussens* *i*. Sed facile natura lusisse potuit.

Ejus nervi nobiles cum trunco intercostali conjunctiones sunt. Solus nonnunquam ex uno pluribusve furculis dat nervum, quem in cordis historia primum dixi *k*; aut edit eundem, ut tamen ramo octavi paris augeatur; aut ramum emittit, qui cum furculo ganglii magni, & alia nervi intercostalis propagine, eundem cordis nervum constituit.

Ad nervum pharyngæum intercostalis trunci etiam solet ramum emittere *l*.

Ad ramos molles, ex intercostali ganglio ortos, furculum unum pluresve emittit, qui porro in plexum missus, carotidi imponitur, ut alias dicetur, & omnes arteriosos truncos ex carotide ortos comitatur *m*.

§. XXVIII. Nervus recurrens.

Major est, & a *Galeno* inventore *n* celebratus, quem a reditu ex thorace *Recurrentem* dicimus.

p An quartus *Runge* p. 31.
g *Winslow* l. c. *Eustach.*
 ad o. *Villis de cerebro* T. 9.
h. n. Quintus Runge p. 31.
h p. 65.
i p. 181.
k T. II. p. 187. 188.

l *Andersch* l. c.
m An furculus ad ganglion intercostale *Vieussensii* p. 181. t. cit. q.
n *Galen. de usu part.* L. VII. c. 14.

Etiam hunc nervum octavum par generat, sed remoto a larynge loco, in thorace, inque latere sinistro ad exteriora o ductus arteriosi, supra arteriam pulmonalem sinistram: in latere dextro, sub arteriæ carotidis & subclaviæ communi trunco p superiori quam sinister, loco q.

Plerumque non una radice, sed duabus r, aut omnino tribus s nascitur. A tergo ductus arteriosi & trunci aortæ in sinistro latere t, in altero circa truncum communem subclaviæ v & carotidis dextræ circumflectitur.

Adscendit pone carotidem æ, & laqueo sæpe ex trunco & ramo facto amplectitur arteriam thyreoideam inferiorem. Adplicat se utrinque secundum latera bronchi y ante œsophagum z, deinde ante ipsum bronchum, a tergo glandulæ thyreoideæ a & cum eo ad imum laryngem bifidus venit, & sub cartilagine scutiformi, sub cricopharyngeo musculo.

Surculi ejus memoria digni, multi quidem ad cardiacos nervos, aut ab intercostali trunco natos, & ab octavo, & dextri lateris se immiscunt, & sinistri, angulis diversis, ut omnino

o Casser. T. 15. f. 1. *Trem de different. fetus* T. 1.

p Andersch l. c. & Tab. art. thyr. anat. Vieussens T. 23.

Casser. ibid. f. 1. 2. Villis T. 1X. C. Stephanus ic. p. 224.

Conf. Winslow n. 122.

q In omnibus iconib. Winslow n. 126.

r Eustach. T. 18. Andersch 15. & 17.

s Vieussens in sinistro latere,

& p. 184. Vesal. in fig. p. 523. Spigel. p. 192.

t Vieussens ibid. Villis ib. Casser. Winslow n. 126.

v Vieussens ib. Villis ib. Casser. ib. Winslow n. 123.

x Vieussens ibid.

y Vieussens.

z Andersch l. c. Tab. Thyr. jam. cit.

a Tab. thyreoid. cit.

alii ex recurrente in cardiacos adscendant *b*, descendant alii *c*. Etiam unus aut plures furculi nervos cordis profundiores adeunt *d*, alius ad sinum sinistrum *e* tendit. Aliæ in collo, ab his diversæ, cum nervo cardiaco superficiali sunt anastomoses *f*, non tamen perpetuæ, pariter aut adscendentes, aut descendentes. Aliqui ramuli ad pulmonem eunt, cum vena pulmonali, ante eam misti cum cardiacis furculis, & ad anteriorem plexum ejus visceris pertinent *g*.

Plurimas gulæ *h*, dum cum ea adscendit, impertit ex ordine propagines.

Plurimas etiam broncho *i*, quæ in membrana intima eum acutum sensum faciunt, quem fumus admirati.

Aliquas glandulæ thyreoideæ *k*, aliquam musculo crycopharyngæo exhibet.

In ipso larynge dat ramum *l* thyreoarytænoideo *m* musculo & cricoarytænoideo laterali *n*: alterum, sive truncum, sive ramum, crycoarytænoideo postico *o*. Communicat denique cum laryngeo trunco *p* in crycoarytænoideo postico musculo.

b In latere sinistro *Eustach.* T. 18. f. 2.

c In latere dextro *Eustach.* 1. c. *ibid.*

d T. II. p. 190. *Eustach.* T. 18. s. *Albin.* *VVillis* ad n. p. 173. An iste furculus a nervo recurrente ad cordis tunicas circa originem pulmonalis venæ distributus *Columbi* p. 197.

e T. II. p. 191.

f *ibid.* p. 187. 188. *Andersch* Tab. n. 20. 23. *VVillis* ad *Gamma gamma gamma.* *Eustac.* lat. dext. *q.* *Albin.*

g T. II. p. 191.

h *Vieussens* p. 182. *Andersch*

1. c.

i *Casser.* 1. c. f. 2. T. 13. f. 2.

k *Winslow* n. 123. *Lieutaud* p. 446.

l Pingitur a *Fabricio* f. 38. b.

m *Fabric.* c. 10. *Casser.* T. 13. f. 4.

n *Fabric.* *Casser.* f. 4.

o *Casser.* T. 13. f. 2. p. 10. *Fabric.* c. 10.

p *Eustach.* lat. d.l.c. *VVillis* T. cit. *Winslow* n. 124.

Coronam utriusque dextri & sinistri trunci sub larynge factam, non habet *Eustachius*, neque memini me vidisse *q*.

Præter hunc nervum glandula thyreoidea proprios furculos habet *r* a cardiaco nervo intercostalis trunci; tum ab eo trunculo hyothyreoideus, cricothyreoideus, cricopharyngæus musculus.

Sed etiam bronchus ab intercostalibus cardiacis *s*, & ab ipso præcipuo plexu cordis *t* ramulos accipit.

Alios, alias repetendos, ad sternohyoideos, & sternothyreoideos descendentes furculos noni paris ramus edit, quem alias dicemus.

§. XXIX. *Ejus nervi phenomena.*

Non possumus prorsus phænomena præterire, quæ ex nervorum recurrentium vinculo aut destructione, ipsa primum vetustas, deinde etiam nuperorum anatomicorum industria supervenisse vidit. Nervo nempe recurrente altero revincto, aut compresso, aut resecto, dimidium vocis perit in bestiis *v*, & similem *Galenus* eventum *x*

q Habet *Fabricius* f. 38

r *Lalouette* l. c. p. 162. a ganglio nempe intercostali, & a primo cervicis pare, quod ego secundum interpretor.

s *VVillis* ad *Gamma gamma gamma*.

t T. II. p. 194.

v *Vesal.* L. VIII. c. ult.

Massa *Introduct.* p. 61. *Mem. de Chirurg.* T. III. p. 81. *Murralt exper. anat.* p. 496. *Martin Essays of a Soc. at Edimburg.* T. II. p. 119.

x *De loc. adfect.* L. I. c. 6. Simile exemplum habet *Guilielmus de la Motte Chir. complet.* T. II. obs. 212.

in homine vidit, cui chirurgus nervum recurrentem refecerat, inque alio *Amatus y*, cui eum nervum mercurius sublimatus adhibitus corruerat, inque eo forte, cui dorsi initium adlissum septem dierum fecit aphoniam *z*, & in animale nuper *Cl. Portal*.

Quando vero uterque nervus recurrens ligatur *a*, tunc utique tota vox animalis perit, neque revocatur, si linum paulo post removeris *b*. Par est efficacia, si ferro utrumque nervum refeceris, quam administrationem solebat, magna præsentem hominum corona, in porco *Galenus c*, suscipere, & æmulus repetiit *Vesalius d*, tum alii *e* etiam nuperi *f* scriptores, idemque, quem laudavi, *Portalius*. Neque sanata in bestia vox redit *g*. Etiam fortis compressio gutturis, a qua videntur hi nervi stupore quodam adfecti fuisse, vocem abstulit *g**. Cæterum, etsi cum corde aliquid nervosi commercii nervo recurrenti intercedit, nihil inde cor quidem patitur *h*.

Si quando minor fuit hujus crudelitatis potestas,

y Centur. II. curat. 79.

z Galen. de loc. adfect. L. I. c. 6.

a *Muralt* exper. anat. p. 58. *Galenus de Hipp. & Platon. decret. L. II. c. 6. Pare admin. p. 41. Massa p. 61. Mem. de Chirurg. T. III. p. 81.*

b *Valsalva* apud *Morgagn. Ep. XIII. n. 28. Morgagn. ibid. n. 29. Rediit tamen in Emetti experimento.*

c *De Hipp. & Plat. decret. L. II. c. 6. admin. anat. L. VIII. c. 5. Oribasius p. 272.*

d Sub operis finem.

e *Columbus* p. 259. *Chirac. Phil. Transf. n. 224. Riolan. Enchir. p. 236. Courten. Phil. Transf. n. 335. Bidloo Exerc. I. de nervis.*

f *Emett de morb. cap. n. 28. Martin l. c. p. 120.*

g *Courten l. c.*

*g** *Hist. de l'Acad. 1705. p. 53. Etiam furditas inde facta, tum in Muralti experimento.*

h *Riolan p. 227. Emett. ibid. Martin ibid. Galen. ibid.*

& si aliqua vox in animale mansit *i*, aut fanato vulnere rediit *k*, tunc aut nervus male vinctus fuisse potuit *l*, aut in unico latere *m*, aut demum nervus laryngeus naturæ suffecit, quo videtur *Cl. Caverhill* eventus pertinuisse, qui vocem debilitari vidit, non totam tolli.

Demum, cum octavi paris ramus sit, quem recurrentem vocamus, ligato altero nervo octavo dimidium vocis periit *o*, utroque revincto aut resecto, præter alia mala, etiam aphonia *p* in cane supervenit: nam apofitia *q* quidem, & suspiriosa *r* respiratio, ad pulmonis *s*, & oesophagi, & ventriculi debilitationem pertinere videntur. Neque enim in *Valsalvæ* experimento cibi in ventriculum descenderant *s*, & cibos revomebant miseri *v*, neque quidquam ciborum digerebant *x*.

Ex eo experimento id interim adparet, laryngis motum liberum & integrum ad vocis formationem requiri.

Quare vero & in ipso demum pectore nervi

i *Drelincourt canicid. IV. exp. 2. p. 39. Second Memoire*
Raucissima & debilis Faber sur les parties irritables n. 185.
apud Hernandez p. 490. 188.

k *Courten l. c.*

l *Ut apud Brunner p. 42.*

m *Eum sensum J. Fabri*
historia admittit.

o *Second Memoire sur les*
parties irritables & sensibles
n. 188.

p *Willis de cerebro & nervis*
p. 172. Bagliv. exp. 7. p. 676.
Valsalva apud Morgagn. Epist.
anat. XIII. n. 28. 37. & ipse
Morgagnus n. 29. Brunn l. c.

q *Brunn. exp. in lig. nerv.*

l. c. I. p. 38. 43. Willis l. c.

r *Courten l. c. Bagliv.*

s *Morgagn. l. c. & Emmet. l. c.*

t *Sanguine inde suffusi Mor-*
gagni l. c. n. 28. 29.

v *Morgagn. n. 28. 29. Brunn.*

l. c. p. 39. 40. 41. Courten l. c.

Second Memoire sur les parties
irritables exp. 182. Bagliv.

x *Brunn. p. 30. 41. 43. Se-*
cond Memoire exp. 182. 185. 186.

recurrentes nascantur , & circa magnos arteriarum truncos reflexi circumducantur , nemo quidem facile dixerit. Ut aortam hi nervi pro adfectuum animi varietate gubernarent , circumduci credidit *Vieuſſenius* , alterne ab iis nervis aortam & laxari perſuaſus & viciffim adſtringi *y*. Verum vix , etiam ſi irritabiles forent , duriffimam arteriam nervi adſtringerent ; ſed neque irritabiles funt , aut decurtari , vaſaque quæ amplexantur , mutare poſſunt *z*.

S E C T I O I I.

O R G A N A L O Q U E L Æ.

§. I. Os hyoides.

AD vocem glottis ſufficit , loquela linguæ motum requirit , & narium orisque meatus.

Os hyoides & linguæ *a* quoddam quaſi fundamentum & laryngis , homini , quam ulli animalium , rotundius breviusque factum eſt. Idem ſupra marginem anteriorem cartilaginis thyreoideæ ponitur *b* , & paulo minus antrorſum ſe effert. Anterius linguæ obvertitur , poſterius epiglottidi *c*. A re ipſa nomen habet. Baſi

y Neurogr. p. 184.

z Premier Memoire ſur les parties irritables p. 44. 45. Second Memoire Exp. 203 -- 206.

209.

a Caſſer. T. I. f. 3. 4.

b Caſſer. T. I. f. 1 -- 5. 8. 9.

c Caſſer. f. 9. Eustach. T. 42.

enim constat, & cornubus duobus majoribus, ad extremam basin adfixis. Basis transversa in universum cornubus crassior, curvula, antrorsum ad linguam convexa *d*, retrorsum, ad laryngem, concava est *e*. Ora superior brevior, eadem extremo margine paulo anterieus propriæ eminentiæ inposita suspensa gerit minora, quæ dicemus, cornicula. Margo inferior longior est *f*. Faciem anteriorem linea eminens transversa *g* dividit in superiorem *h* & anteriorem *i* facieculam.

Utramque eminentia media distinguit *k*, ad cuius latus pro musculis sinus excavati sunt.

Cum hac basi, mobili in junioribus cartilagine *m*, conjungitur utrinque ossiculum peculiare, quod *cornu* vocant, ligamento *n* & articulatione connexum *o*, idemque in adulto homine cum præcipuo baseos osse conferruminatur *p*. Ea cornua ad basin crassiora *q*, gracilesunt retrorsum *r* eundo, eademque deorsum curvula *s*, & retrorsum, ea sede leviora, modice exsculpuntur *t*. Fere transversa retrorsum eunt *v*.

d Albinus f. 6. *psi* Comper T. 27. f. 1. 3.

e Ibid. Comper f. 2. 4.

f Winslow, Bertin.

g Albin. f. 9. inter *psi* & E. E. Comper l. c.

h Albin. ibid. *epsilon epsilon* Comper ibid.

i *psi* Albin. Comper ibid.

k Albinus ibid. Winslow

traité des os n. 488. Comper ib.

Sinus quatuor Vesal. L.I. c. 13.

Ingrassias p. 276. Syllab. part.

corp. hum. T. 6. f. 5. Comper

ibid.

m Albin. f. 7. 8.

n Albin. ic. off. fet. 153. Nesbit. p. 101.

o Albin. f. 8.

p Winslow n. 489. Bertin. p. 262.

p Est ubi distincta manent Bertin. p. 262.

q Albin. ibid. f. 5 -- 8.

r Eustach. T. 41. f. 1. 8. 11. 12. T. 42. f. 5.

s Albin. in ic. Winslow

n. 489. Comper f. 1 -- 4. Palfyn.

t Albin. f. 5. 6. 7. Comper f. 2.

v Eustach. ubique.

Ab extremi cornu quasi capitulo *x*, ligamentum ad cartilaginem thyreoideam exit *y*.

Cornua minora *z*, alias cartilaginea *a*, frequenter tamen in adultis corporibus ossea *b*, cum tritici granis *c* passim comparantur. Superius cum basi in angulo symphyseos cornuum ad propriam eminentiam coeunt *d*. Vidi prælonga fuisse, & cylindrica *e*.

Ex iis ligamenta *f* exeunt, quæ sursum angustiora recedunt, & retrorsum ad angulum cum cornu majori acutissimum, de processus stili-formis *g* imo apice os hyoides suspendunt. In iis ligamentis non rarum est, osseas portiones aliquas reperiri *h*, neque scriptores desunt, qui eas portiones pro re perpetua *i* descripserint. *Vesalium* diu tota schola secuta est. Sustinent cæterum os hyoides, ne, dum vehementius deducitur, nimis descendat *k*. Desuisse, aut

x *Albin.* f. 5. 6. 7. 8. *Casser.* p. 54. *Columbus* p. 107. *Comper* f. 5. 9. *Eustach.* T. 41. f. 8. f. 1. *Palsyn*, *Bertin.* p. 263. *Palsyn*, *Winslow* n. 489. *Weitbrecht* *Syndesmolog.* p. 211.

y p. 237.

z *Vesalii* c. 13. L. I. Cornicula interna *Vesling* *Epist. posth.* seqq. T. 8. f. 32. etsi difficilius recipit, & raro se addit invenisse.

8. *Syntagm.* c. 11. f. 11. Habet *g* *Steloeides* *Rufi* appell. L. I. *Comper* f. 1. 2. p. 35. etsi nomen *styloeidys* magis probat *Hofmannus* *Instit.* p. 138.

a *Albin.* *oss. fetus* f. 152.

b *Winslow* n. 490. *Platner* de *h* *Reverborst* de *usu linguæ* *epiphyseb.* p. 26. n. 15. *Gernet* de *siccit. senili.*

c *Marchett.* p. 87.

d *Albin.* f. cit. olim *Eustach.* *i* *Vesalius*, qui in feminis ligamenta unice admittit. Re- *T.* 42. f. 5. *Palsyn* *van de been-* jicit has portiones *Eustachius* *deren* T. I. f. 5. e e. *Verheyen* *oss. exam.* p. 175. Habet pro va- *Tab.* 29. f. 7. rietate *Weitbrecht* p. 213.

e *Winslow* n. 490. *Fallop.* *k* *Monroo* p. 143. Glandulæ *p.* 54. Longa 7 lineas *Plancus* *Whartoni* necti *Walthers* de *osc.* *demonstr.* T. 3. f. 5. p. 15.

f *Oribasius* p. 144. *Fallop.*

adeo imperfectum adfuisse, ut lego, non quidem ex propria experientia meminisse confirmari *l*.

Cum lingua ex ora superiori multis carnibus, & ligamento *m* lato membraneo colligitur: cum pharynge perinde & musculis & membrana, cum larynge & musculis *n*, quos dixi, & ligamentis *o*.

Quare cum nulli ossium cominus committatur, & de solis ligamentis styloideis suspendatur, cæterum liberum, facillime emovetur, & aut linguæ, aut laryngis, aut pharyngis motui obsequitur. Easdem, quas dixi, corporis partes vicissim secum trahit, quoties de loco movetur. Primaria vero ad linguam utilitas spectare videtur, quæ, si absque eo osse foret, posterius nimis laxa, in actione sua latitudinem tueri nequiret, uti mappas fere de baculis suspendimus, ne, dum evolvuntur plicas agant.

§. II. Musculi, qui os hyoides movent.

Sternohypidei.

Oritur lato principio *p* a sterni *q* parte superiori interiori tota *r*, quæ costam primam recipit, a tergo admotæ claviculæ, & late a costæ

l Weitbrecht p. 213.

m Columbus p. 107. Bertin. p. 262.

n p. 245.

o p. 237.

p Eustach. p. 53.

q Galen. de util. L.VII.c.19.

Oribas. p. 202.

r Eustach. T. 33. Angustius Albin. T. XI. f. 39. f. f. Nihil aliquando Winslow, Gunz, Comper.

costæ primæ cartilagine s, superiori & posteriori parte, aque ligamento costam connectente claviculæ t, & alias minori particula, alias tamen etiam majori, quam a sterno v, a vicinæ claviculæ x sede posteriori sternoque proxima inferiorius. Ascendit subcutaneus, & eundo angustior fit, & non raro inscriptionem y aliquam tendineam angulosam habet, quam quinquies vidi sexiesve. Ita sursum migrat ante cartilaginis thyreoideæ quadratam faciem, & ante glandulam cognominem. Directionem circa ejus cartilaginis oram inflexus mutat, itque retrorsum, & terminatur in baseos ossis hyoidis sedem anteriorem inferiorem a cornu fere ad mediam z, in foveam, vehementer contractus & pene tendineus, atque cum coracohyoideo conjunctus a.

Bifidum, sed ex animale, *Eustachius* pinxit b, & descripsit *Oribasius* c, solet autem in quadrupedibus magis compositus esse.

Detrahit utique os hyoides, deinde eas partes, quæ eo cum osse connectuntur, laryngem, ma-

-
- s *Eustach.* T. 33. *Douglas Mem.* p. 285. & in adnotatione p. 32. *Winslow* n. 871. *Albin. Morelii* apud *Vandermonde* L. 3. c. 39. p. 20. Tab. cit. c. *Journal de Medec.* T. XI. p. 540. f. g. h. Nunquam nasci eo loco *Santon-*
t *Albin.* p. 202. *ibid.* c. *rinus* p. 116.
Winslow l. c.
v Ad medium usque *Cheselden* p. 79.
x *Morgagnus Adv.* II. p. 32. *Winslow* n. 871. *Cheselden* p. 79. *Douglas* p. 32. *Lieutaud* p. 180. y Habet *Winslow* n. 873. Alias sagittata *Morgagn. Adv.* I. T. 2. f. 1. n. n. Alias transversa *Albin.* p. 202. Plures una *Bidloo* T. 25. f. 5.
Unice ex eo osse *Cowper* T. 15. z *Eustach.* T. 41. f. 5.
f. 1. & p. 35. n. 44. *Rau myolog.* a *Lieutaud.*
p. 57. Aliquando inde oriri b l. c. f. 6.
Albinus p. 202. l. c. d. *Gunz* c l. c.

xillam inferiorem, linguam, unaque retrorsum paulum retrahit: cartilaginem etiam thyreoideam retrorsum deprimit, & pharyngem arctat. Glottidem ideo aperit, & glandulam thyreoideam emulget, non quidem magna vi.

§. III. Coracobyoidei.

Falso nomine ita vocatur, cum nullum satis commodum ipsi impositum sit *d*, musculus non quidem a coracoideo *e* processu natus, qui error apud *Avicennam* reperitur *f*, multosque prioris ævi scriptores, non tamen apud *Vesalium* *g*, neque apud *Fallopium* *h*. Restitutæ veræ originis honor *Riolano* *i*, deinde *Guilielmo* *Comper* *k* debetur, tum *J. Baptistæ Morgagno* *l*.

Lato triangulari *m* tendine nascitur a costa scapulæ superiori *n*, exterius quam hilus, qui a proprio ligamento perfectus vasa dorsalia scapulæ superiora *o* transmittit, eum inter & angulum

d Omoplathyoideus Winslowi n. 865. Ea vox ingratum sonat. *Omohyoideus* vero & *Costohyoideus* gallorum, ad humerum, aut costas tironem abducit.

e Error ab aponeurosi natus est, cujus ope cum eo processu nonnunquam cohæsit *Winslow* n. 867. etsi non proxime, totoque hilo vasculoso remotus oritur.

f p. 13.

g p. 298.

h *Instit. anat.* p. 56. Veram etiam originem habet *Columbus* p. 126. *J. de Valverde* p. 80. *Baub. theatr.* p. 516. & alii.

i p. 312. tum *Guillemeau myolog.* p. 395. *Habicot Journ. VI. Leç. XI. & Journ. III. Leç. V.* non quidem pro constanti fabrica. Inter nuperiores *Genga anat. chir.* p. 230. *J.W. Pauli in v. Horne* p. 31. *Gouey verit. chir.* p. 178. *Duvernoi Comm. Acad. Petrop. T. V.* p. 238.

k *Comper myotom.* 1694. p. 74.

l *Adv. anat. I.* p. 36.

m *Albin. T. XI.*

n *Morgagn. T. I. T. Propius hilum Albinus T. XI. f. 35. a.a.*

o *Fascic. icon. anat. VI.* p. 4.

scapulæ superiorem : alia, etiam a ligamento quod hilum perficit *p*, & rariori exemplo etiam a clavicula *q*, vel certe a membrana tendinea claviculæ adfixa *q**.

Adscendit carneus, fit in tendinem, tum alias accurate ea sede, qua ante venam jugularem internam transit; alias partim, qua venæ jugulari *r* infidet, partim interius quam ea vena; denique alias, qua musculo mastoideo tegitur *s* non qua venam tegit; alias nusquam. Nam omnes eas varietates vidi *t*. Vidi etiam pene absque tendinea intercapedine *x* fuisse, ut leviter inscriptione alba signaretur, aut tendinea superficie pingetur.

Ex eo tendine fibras aponeuroticas ad sternohyoideum vidi accessisse.

Secundus venter ex tendinea natura restitutus, ex obliquo rectus *x* fit, & adscendit secundum hyothyreoideum musculum, ei fere parallelus, cellulosa tela cum cartilaginis thyreoideæ laterali ora conjunctus, idemque nunc angustior fini baseos ossis hyoidis extremi, antèrius & inferius *y*, proximoque aliquantum cornu se immittit, ad latus sternohyoidei, & parte aliqua sui ante

p Douglas p. 32. *Albin.* p. 199.
q Winslow n. 868. *Albin.* p. 201. *Lieutaud* p. 180. *Morel.* l. c. p. 541.

*q** *Sabatier* ibid.

r Venæ jugulari etiam in tendinem mutationem tribuit *Lomer* p. 23. T. 7. f. 2.

s Inter venam scalenumque priorem & musculum mastoi-

deum *Albinus* p. 200. *Douglas* p. 32. *Winslow* n. 869. Alibi etiam, quam ad eam sedem, tendinescere *Cl. Ramspæk* in *Specim.* p. 16.

t *Vesal.* l. c.

v Conf. *Albin.* p. 199.

x *Morgagn.* ic. cit.

y *Albin.* ic. it. f. & p. 200.

eum & muscolum. Nonnullis fibris cum tendine stylohyoidei *a* confunditur, & cum sternohyoides, & cum biventris tendine. Cadavera fuerunt, a quibus totus abfuit *b*, aut in altero latere, aut in utroque.

Officium omnino simile habet muneri sternohyoides, & perinde os hyoides, & laryngem, una deorsum ducit, paulumque retrorsum *c*, cujus origo aliquanto propior sit vertebris. Ita etiam pharynx in deglutitione comprimitur.

§. IV. *Stylohyoidei utrique.*

A processu styloformi tres muscoli prodeunt: a radice *d* quidem ad usque mediam *e* partem, qua epiphyssin adnatam accipit, varia in variis sede, & altero aliquando tendine a radice, altero a medio processu, prodit *stylohyoideus* inferius anterieus, proxime & posterius stylopharyngæus *f*, anterieus ab apice styloglossus *g*.

Gracilis quidem ille & tendineus descendit antrorsum, carne augetur, & plerumque in duas carneas portiones finditur, cellulosa tamen tela conjunctas, quæ medium biventrem muscolum,

z Winslow n. 869. *Comper* T. 27. ed. 1724.

a Albin. p. 200.

b Buchner. miscell. 1727. p. 252. *Cheselden* p. 79. Ejus locum latior sternohyoides tenet. Idem forte vidit *Cl. Winslow*, quando dixit, a media clavicula natum cum sterno-

hyoideo confusum fuisse n. 868.

c Albin. p. 200. *Comper* p. 74.

d Oribasius p. 204. *Winslow*

n. 863. *Albin.* T. XI. n. 37. in medio *Douglas* p. 31.

e Albin. p. 210. 211. *Courcelles* T. VI. i. I.

f Courcelles T. VI. h. H.

g Courcelles T. VI. epsilon.

per album tendineum fulcum transmittunt *b* ; eoque transmissio ; earum altera anteriori ad partem lateralem baseos ossis hyoidis *i* se immittit, inter mylohyoideum & coracohyoidéum *k*. Altera latiori tendinea in idem os ad angulum cum cornu , aut in ipsum cornu *l* , aut cum priori cauda conjuncta in ossis hyoidis basin , aut in biventris tendinem abit , cui & ventri anteriori *m* multas fibras inserit , alias vero reddit priori caudæ , & expansioni tendineæ , quæ biventrem *n* , & musculus mylohyoideum ad os bicorné revincit. Vidi posteriorem columnam , duobus diversis locis se in cornu hyoides inferuisse. Est tamen , neque rarius , ubi biventris tendinem omnino non continet *o* , neque finditur.

Os hyoides , & una linguam , & laryngem ad posteriora elevat : linguam , quæ antrorsum tracta est , a musculis ex mento interius ortis , retrahit ; os hyoides restituit. Idem , quantum quidem potest , cum biventre maxillam *p* inferiorem elevat. Abfuisse in altero latere *q* exempla producuntur.

-
- b* Eustach. T. 35. lat. fin. T. 32. & 38. Casser. T. I. f. I. Bidloo T. I. f. I. Courcelles T. V. T. VI. i. I. Albin. T. XI. f. 37. Cowper T. 23. Synoviam in eo sinu contineri Gunz l. c. Addit , fibras ad membranam glandulæ Whartoni aberrare idem Gunzius.
- i* Ad baseos cum cornu conjunctionem Cowper l. c. Albin. p. 211. T. X. f. I. T. XI. f. 37.
- k* Cowper T. 27. f. 46.
- l* Winslow n. 863. Gunz
- Memoir. des Savans étrangers p. 286. Cowper T. 28. xi. T. 23. Pro varietate Albin. p. 211.
- m* Ferrein Mem. de 1744. p. 532. 533.
- n* Idem ibid.
- o* I. Bach. T. 35. lat. dextr. Negat perforari Riolanus animadvers. in C. Baub. p. 726.
- p* Ferrein p. 531. 539. 541.
- q* Boehmer fascic. II. præf. p. V. & , ut intelligo, Heymaun. Comment. T. I. p. 457.

Stylohyoideus alter non rarus, tamen non perpetuus, musculus ab *Eustachio* *r* primum cognitus, ex apice *s* extremo processus styloformis descendit antrorsum, comes ligamenti cognominis & stylopharyngæi musculi, gracilior priori, & in ossiculum triticeum hyoidis ossis, vicinumque cornu terminatur *t*, aliquantum cum chondropharyngæo confusus. Duos fuisse alias auctor est *Albinus* *v*. Non ideo deest ligamentum stylohyoides, quando is musculus adest *x*.

An hæc fuerit stylopharyngæi in os hyoides insertio dicta *Valsalvæ* *y*, & *Morgagno* *z*, & olim *Fallopio* *a*? An ligamentum, equidem in cornu ossis hyoidis deductum, *Guilielmi Cowper* *b*?

§. V. Biventre.

Multo reliquis musculis ossis hyoidei validior, omnino huc pertinet, cujus uterque venter, diversis temporibus, id os trahere possit.

A fovea processui mammillari *c* insculpta *d* & aliquantum retro eum processum nascitur; neque a processu styloformi, ut olim credebatur *e*.

- | | |
|---|---|
| <i>r</i> T. XLI. fig. V. VIII. XI. | hunc pertinent voces <i>Ep. XI</i> , |
| Pingi videtur a <i>Bidloo</i> T. 14. C. | n. 8. compar. cum n. 11. |
| <i>s</i> <i>Albin</i> , p. 212. <i>Courcelles</i> | <i>a</i> <i>Obs. Anat.</i> |
| T. V. g. G. T. VI. g. G. | <i>b</i> T. 28. V. |
| <i>t</i> <i>Albin</i> , p. 212. <i>Douglas</i> p. 31. | <i>c</i> Sub auribus <i>Oribasius</i> p. 82. |
| <i>Weitbrecht</i> <i>Syndesm.</i> , p. 214. | <i>d</i> <i>Albin</i> , p. 207, T. XII. f. 18. |
| <i>v</i> p. 213. | <i>a. b. c.</i> T. X. f. 1. <i>Courcelles</i> |
| <i>x</i> <i>Weitbrecht</i> <i>Comm. Petrop.</i> | <i>t. v. K.</i> |
| T. IX, p. 256. | <i>e</i> <i>Monet</i> <i>Carp. Isag.</i> p. 48. |
| <i>y</i> <i>Epist. anat.</i> IX. n. 4. | Error existat apud <i>Vesalium</i> |
| <i>z</i> <i>Advers. I.</i> p. 4. <i>Epist. VIII.</i> | p. 295. Correxerit <i>Posthius</i> ad |
| n. 5. <i>Epist. XI.</i> n. 6. 7. Certe | <i>Columbum</i> p. 516. |

Et tendineus ad ossa & carneus prodit. Ventre primo modice descendit, & imprimis antrorsum fertur.

Abit in tendinem teretem *f* & valentem, qui sæpe per stylohyoidei musculi discedentes fibras transit *g*, deinde inflexus os hyoides præterit. Ex eo tendine in ossis hyoidis cum cornu suo conjunctione validæ cellulosæ fibræ splendentes exeunt *b*. Deinde perpetuo multas cellulosas, etiam tendinescentes, robustas *i* fibras emittit, cum alterni lateris similibus fibris irretitas, ut in decussim suarum *k* sodalium ferantur, & arcum efficiant, atque. pene tertiam partem mylohyoidei tegant. Earum plurimæ mylohyoidei inferiori, & posteriori faciei se immiscent.

Res ipsa perpetua est, neque tamen *trochleæ* nomen meretur *l*.

Inde tendo biventris cum primo ventre hætenus directus, cum altero angulum facit obtusum, & mutato ductu antrorsum quidem porro, & introrsum & sursum tendit, & aut contractus & simplex, aut varie compositus, se in maxillæ inferioris foveas sibi paratas in

f Bidloo T. 15. C. &c.

g p. 292.

b Posth. p. 516. Albin. p. 208.

f. 19. *h*. Winslow n. 324.

Douglas p. 57. Courcelles T. IV.

Cowper T. 23. M. Weitbrecht

p. 253. *Monro Essays of a Societ.*

at Edimburg. T. III. p. 266.

T. 2. f. 2. H. Ferrein p. 523.

i Albin. p. 208. *Platner*

progr. p. 4. *Ferrein* p. 524.

Cheselden p. 62.

k *Monro* l. c. P.

l *Winslow* n. 849. 1225.

Monro Essays p. 294. Habet

tamen trochleam *Weitbrecht*

p. 254. & *Courcelles* T. IV.

* Sed fatetur raram esse. Im-

perfectam agnoscit *Ferrein*

l. c. p. 524. & alias nullam

p. 525.

parte posteriori, secundum symphyfin utrinque *m* inferit.

Minime infrequens est, plures in ventres hunc musculum inter os hyoides & maxillam inferiorem abire, aque dextro musculo in sinistrum fasciculos *n* carneos transire, atque vicissim. Azygon etiam o musculum ex aponeurotico cingulo renasci vidi, & symphyfi maxillæ inferi. Vidi tres dextras, sinistramque insertionem fuisse. Carneas etiam fibras communicat cum mylohyoideo *p*, & egregium nonnunquam lacertum.

Efficacia varia est, ut maxilla inferior firma fuerit, perque suos elevatores ad superiorem adducta, aut vicissim laxa. Firma si fuerit, sive nunc in sua cum osse temporum dearticulatione fundata fuerit, sive retenta a masseteribus, temporalibus & internis pterygoideis, clauso ore aut aperto, erit maxilla inferior musculo biventri, pro puncto fixo, atque os hyoides antrosum ducet *q*, unaque laryngem, & pharyngem elevabit, & linguam ad dentes antrosum adtrahet. Id ventre primo fiet.

Poterit denique, si valde firma fuerit maxilla, caput universum *r* deorsum ducere & retrorsum,

m Winslow n. 850. Albin. f. 19. g. g. f. 18. d. c. Bidloo f. 15. A. *p* Cæsser. T. I. f. 1. E. E. Ferrein p. 524. Gunz l. 3.

n Habet etiam varietates Albinus p. 208. & Platner l. c. *q* Winslow n. 1233. Weitbrecht p. 254. Monro Ess. T. I. p. 137. 146. T. III. p. 266. Ferrein. p. 550. Admittit Albinus p. 210.

o Fibras a ligamento ossis hyoidis ortas ad biventrem accedere Gunz Memoir. prés. de mast. p. 14. *r* Albin. p. 209. Winslow n. 1234. Ferrein p. 545. Boerhaave T. I. præl. p. 145. Monro Essays T. I. p. 139.

si maxillæ manus subjecta fuerit, & una brachium cubito nixum. Id venter secundus primario facit, adjuvat secundus. Eodem tempore & maxillam superiorem elevare & inferiorem deorsum ducere alii *r**.

Quando vero maxilla laxa obsequitur, tunc quidem biventer os hyoides retrorsum ducit, & fursum *s*, omnino ut stylohyoideus, & perinde laryngem levat, & linguam ad posteriora & superiora adtrahit, & maxillam inferiorem late a superiori deducit *t*. Hæc ventre secundo, primoque conjunctis.

Poterit etiam alio modo os aperire, solo secundo ventre, qui cum detractoribus ossis hyoidei conjunctus operatur.

In deglutiendo utique agit, ejusque musculi actio digitis percipitur.

§. VI. *Mylohyoideus.*

Duo hic musculi in unum ventrem *v* consentiunt, & ab osse hyoide nomen habent, cui paucis fibris adhærent, alio titulo digniores. Utrunque nempe longa series fibrarum carnearum, ab ultimo dente molari ad mentum usque, non

*r** *Sabatier I. p. 411.* *p. 544. Walther oscit. n. 5.*
s Winslow n. 1233. Ferrein Petit apud Palfyn T. II. p. 402.
p. 550. Monro T. III. p. 266. Cheselden. Admittit etiam
t Douglas p. 57. Albin p. 208. Monro T. I. p. 134. T. III.
Winslow n. 1226. 1227. 1228. p. 266.
tum Memoir. de l'Acad. 1742. v Morgagn. adv. II. p. 31.
Weitbrecht p. 254. Ferrein. Albin. p. 217. Winslow n. 585.

tamen ad symphyfin α , ex maxillæ inferioris linea eminente obliqua γ prodeunt, infra alveolos dentium molarium, caninorum, incisivorum.

Harum fibrarum, quæ priores z sunt, & dentibus incisivis proximæ, transversæ fere α a latere dextro in sinistrum continuantur, ut nullus tendo b medius intercedat, etsi alba cellulosa linea posterius evidentiori medii signantur c . Oblique ponitur, & posteriorem partem altiore habet. A glandula sublinguali interruptus, quasi in duos lacertos dividitur. Quæ posteriori loco nascuntur fibræ d , eæ paulatim magis inclinatæ e magisque, denique oblique retrorsum tendunt, & eminentiis propriis in anteriori & inferiori sede bicornis ossis se immittunt f . Eo loco cum fibris nonnullis sternohyoidei musculi misceri vidi. Ex superficie etiam hujus musculi retrorsum extrorsum fibræ tendinæ in os hyoides se conjiciunt. De fibris diximus, quas a Biventre accipit g .

Princeps proculdubio officium est, linguam, & glandulas sublinguales sustentare h , ne deorsum

α Aliquo etiam spatio geniohyoidei nudi eminent. Mentum excipit *Oribasius* p. 208. & *Santorinus*.

γ *Winslow* n. 856.

z *Santorin.* p. 116.

a *Courcelles* T. 4. L. L. *Albin.* T. XI. f. 38. c . d . *Cowper* T. 23. n. 47. T. 27. Nimis obliquas pingit *Eustachius* T. 41. f. 5. & *Casseri* T. 1. f. 1. T. 15. f. 1.

b Recte negat *Santorinus*, & adnotat continuari ibid.

c Tenuem tendineam lineam vocat *Albinus* p. 217. Tendinem *Winslow* n. 855. Pingit *Casseri* T. 1. f. 1. T. 15. f. 1. B. B. *Spigel.* L. IV. T. 2. f. 1.

d Paucae *Morgagn.* l. c.

e *Albin.* p. 217. l. c. e . *Cowper* T. 27.

f *Albin.* ad f. *Cowper* ibid. *Winslow* n. 858.

g p. 296.

h *Cheselden* p. 78. add. *Albin.* l. c.

vitioſe cedant : has emulgere *i* ; linguam adprimere palato *k*.

Parum eſt, ſi quidquam in oſſe hyoide antrorſum ducendo poteſt. Adtollere *Albinus l.* Maxillam deprimere alii *m*. Tantum autem poſſunt in utroque, quantus eſt ſinus anguli, cum oſſe hyoide intercepti, ſi cum ſinu toto comparetur : nempe perexiguum quid.

§. VII. *Geniohyoidei.*

Hi muſculi *n* ſibi adjacent *o*, diſtincti *p* tamen. Anterior ſinis gracilior eſt, & ex propriis tuberculis maxillæ inferioris *q* in parte menti averſa & cava provenit.

Inde hi muſculi recti, ſed paulatim latiores, retrorſum eunt, & foveæ in baſi oſſis hyoidis ſuperius & anterieus inſculptæ *r*, & in totam denique baſin ad cornu uſque *s*, inque ipſius cornu radicem *t* terminantur.

Quando maxilla inferior ad ſuperiorem adducta

-
- | | |
|--|--|
| <i>i</i> <i>Cowper</i> ad T. 15. f. 1. | novis deſcribit. Superiores vo- |
| <i>Santorin.</i> p. 117. | cat <i>Ferrein l. c.</i> p. 539. |
| <i>k</i> <i>Oribasius l. c. Santorinus</i> | <i>o</i> <i>Winslow n.</i> 861. <i>Caffer.</i> |
| <i>ibid. Monro Eſſays</i> T. I. p. 144. | T. 1. f. 1. <i>Courcelles</i> T. V. B. B. |
| <i>l</i> <i>Ferrein l. c.</i> p. 539. & | <i>p</i> Unicum ſæpe eſſe <i>Lieutaud</i> |
| <i>Monro ibid.</i> p. 144. | p. 180. <i>Caffer. l. c.</i> Nimis an- |
| <i>m</i> p. 217. & <i>Douglas</i> p. 30. | guſtos <i>Euſtach. T.</i> 41. f. 5. |
| <i>Oribasius</i> p. 204. <i>Santorinus</i> | <i>q</i> <i>Winslow n.</i> 860. <i>Albin.</i> |
| p. 117. <i>Monro l. c.</i> | p. 218. T. 12. f. 36. A. B. |
| <i>n</i> Habet <i>Oribasius</i> p. 205. | <i>r</i> <i>Albin.</i> p. 218. |
| <i>Jacobus Berengarius Carpenſis</i> | <i>s</i> <i>Albin.</i> p. 219. T. 12. l. c. |
| <i>Iſagog.</i> p. 45. <i>Caffer. T.</i> 1. f. 1. | <i>t</i> <i>Winslow ibid. Albin. ic.</i> |
| ad A. <i>Fallopins</i> p. 74. qui pro | cit. e. |

est, utique os hyoides antrorsum *v* ducit sursumque, ut biventer, & una linguam antrorsum protrahit *x*, ut apex de dentium intervallo emineat, & laryngem una elevat *y*. A geniohyoideo & mylohyoideo musculofo læso impedimentum respirationis vidit *G. Erhardus Hamberger* *z*, cum os a sternohyoideo & sodalibus musculis perpetuo deduceretur.

Contra quando os hyoides vel elevatur, vel deprimitur, ab aliis quidem potentiis, & maxilla inferior laxa obsequitur, tunc eam utique deprimit & os aperit *a*.

§, VIII. *Lingua.*

Genioglossos communes linguæ & ossis hyoidis musculos, nunc dicere oportet. Verum eorum historia utique linguam, certe in universum, cognitam ponit. Non hic de involucris agimus, neque de papillis aut nervis, aut vasis, unice in fabricam musculosam intenti, quæ sola ad loquelam spectet. Quadrupedibus in universum, ut homini, angustior, tamen avibus & quadrupedibus oviparis *b* plerisque etiam longior, duriorque, piscibus aut nulla data est, aut certe fabrica non ea, quæ homini, neque aut papillis ornata *c*, aut mobilis. Quadrupedibus oviparis

v Albin. p. 219.

x Arantius observ. anat. c. 26.

y Schelhammer p. 13.

z Eph. Nat. Cur. Vol. IV. obs. 86.

a Albinus forte p. 219.

b Etiam crocodilo Hammen de hern. p. 105. 106.

c Lorenzini anat. of the Crampfish.

aliqua est, minus libera ut de ea in ipso crocodilo ambigatur *c**. Insectis *Reaumurius* (certe api), cochleæ *Swammerdamius* linguam tribuit.

Homini cum brevitata lata caro est, obtuso *d* fine, superne longe libera, & ad palati offei caveam adaptata, inferne multo brevior, conatis sibi glandulis vestita, & brevi cis apicem fine soluta. Dorso suo ab epiglottide adscendit, inde reliqua longitudine modice declivis *d**. Superior latitudo media, obscuriuscula crena dividitur, quæ linguam bipertit *e*. Tota mobilissima, adque omnem & situm, & figuram recipiendam aptissima, ad dentes superos inferioresque, ad palatum anterius, mediumque & demum postremum, ad gingivas, se adplicare idonea, apicem & retrahere, & ex ipso dentium intervallo expellere, inque buccarum caveam producere, omnemque eam caveam pervestigare, aut demum inter ipsa labia prominere & revolvi, & dorsum explanare & vicissim cavare, lateraque sua ad se adducere, invicem & in cylindrum se densare mira mobilitate habilis. Ad os hyoides, & pharyngem, & tonsillas, & epiglottidem, & gingivas suorum involucrorum ope retinetur, quæ a lingua ad eas partes transeunt, tum musculorum, quos exponemus. Vinculum *f*, quod

*c** Nullam habere *Aristot.*
Part. IV. n. II. *Seba* T. CX. f. 1.

d Bitida nonnunquam *Borell.*
Cent. II. obs. 63. Supernumeraria lingua, ad quam recipiendam palatum vehementer fornicatum erat *Eschenbach* obs.
rar.

*d** *Luchtmanns* de saporibus
& gustu p. 61.

e Lingua bipartita est *Aristot.*
telis part. anim. L. II. c. 10.

f *Arantius* obs. c. 25. *Weitbrecht* syndesmolog. f. 79. d.
J. Bonhomme T. 15. f. 1.

vulgo citatur, ejusdem involucris duplicati plica est, quæ mediam partem inferioris faciei linguæ ad membranam oris, glandulis sublingualibus impositam, & ad gingivas revincit. Id frenulum aiunt brevitate sua libero motui linguæ officere posse, ut omnino elocutionem impediat, aut certe literæ *r.* & *l.* *g* ob ejus ligamenti arctitudinem minus recte pronuncientur. Balbis autem plerisque *h* filum linguæ nimis breve esse, ut linguam de ore educere nequeant, hinc incidi debere, id quidem nimium fuerit *i.* Noverat *Celsus* *k* hominem, qui lingua fuccifa & liberata tamen non locutus est. Nuperos chirurgos video de hoc frenulo deque ejus amputatione, ut de re non rara & de necessario auxilio dicere.

§. IX. *Genioglossi.*

Maximus musculorum huc pertinentium identique compositi generis est, linguæ, ossi hyoidi, & demum pharyngi communis. Communis fibrarum origo est in mento, facie nempe posteriori cava maxillæ inferioris, utrinque ad symphysin, supra reliquos musculos, qui ab ea sede nascuntur, ex propriis tuberculis asperis *l.*

Inde retrorsum it, & eo dum tendit, fibras

g Amman de loquela p. 113.

h Balbutiem inde nasci *Dionis des accouchemens* p. 381. *Brouzet educ. medic.* T. II. p. 254. Oportet excidere *Thebesius Hammen-Kunst* p. 578.

i Absque rupto vinculo multi optime loquuntur *Camerarius memorab.* Cent. VI. n. 24.

k L. VII. c. 12. n. 4.

l *Albin.* p. 222. T. II. f. 42. a. b. T. 10. f. 2. 3.

suas dilatat, inque tres fasciculos separat, quos cellulosa telæ, vasa, & nervi dividunt.

Primus, infimus in os hyoides *m* tendit, inque faciem anteriorem & superiorem *n* baseos supremus musculorum eo loco terminatorum tum in cornicula minora *o* terminatur. Hæ fibræ dextri & sinistri muscoli cellulosa linea separantur *p*, & teguntur alba membrana. *Geniohyoidei superiores Ferrenii q interni Veslingii r* ob eam insertionem dicti sunt.

Proximæ fibræ obscuriores, sparsæ, & dissolutæ, neque numerosissimæ in pharyngis *s* membranam linguæ finitimam, & anteriorem, inter os hyoides & styloglossum, & in arcum flexæ retrorsum adscendunt, partimque occurrunt styloglossio *t*, cumque ejus fibris continuantur *v*. Hi sunt *Geniopharyngei Winslowi x*.

Supremæ eademque exteriores, breviores, sed robustissimæ, linguæ in basin late se immittunt, radiatæ *y*, ut anteriores antrorsum inclinentur, proximæ transversæ sint, posteriores maxime retrorsum tendant.

- | | |
|--|---|
| <i>m</i> Habet Oribasius p. 206. | <i>glas</i> p. 34. |
| <i>Fallopianus instit.</i> p. 54. b. observ. | <i>p</i> Winslow n. 524. |
| p. 74. & <i>Eustachius</i> T. 41. f. 8. | <i>q</i> l. c. p. 539. |
| Non adeo primus ossi hyoidi | <i>r</i> Apud Marchett. p. 88. |
| adjudicavit <i>Riolanus</i> p. 822. | <i>s</i> Albin. p. 223. T. 10. f. 3. |
| Habet etiam <i>Rau myotom.</i> p. 53. | <i>l. m. n. o.</i> |
| <i>Morgagnus adv.</i> II. p. 33. | <i>t</i> Albin. f. 43. m. T. 11. f. 3. m. |
| <i>Winslow</i> T. IV. traité des vis- | <i>v</i> Albin. p. 223. |
| <i>ceres</i> n. 523. <i>Valther</i> de de- | <i>x</i> Traité de la tête n. 480. |
| <i>glut.</i> p. 6 | <i>y</i> Winslow n. 523. Albin. |
| <i>n</i> Courcelles T. VIII. alpha. | p. 223. f. 41. 43. Douglas p. 34. |
| <i>bita.</i> Albin. T. 11. f. 42. d. d. | <i>Eustach.</i> T. 41. f. 11. Courcelles |
| <i>o</i> Albin. f. 42. e. In hæc sola | l. c. A. B. Coupper T. 28. f. 1. |
| <i>Albin.</i> p. 223. In cornua Dou- | <i>Bonhomme</i> T. 15. f. 2. |

Fibras in epiglottidem a lingua euntes ad hunc musculum *Albinus* refert *z*, alias *a* dictas. Diversis cum fasciculis idem fiat, & firmitudo terminorum etiam variabilis sit, diversis omnino muneribus defungitur. Quando maxilla inferior contra superiorem adducta, & firma est, tunc quidem prima portione os hyoides *b*, & laryngem antrorsum *c* ducit sursumque, sodalis biventris, & geniohyoidei.

Altera pharyngem antrorsum ducit, & latera, quantum potest, constringit.

Tertia, cum inferatur posterius, quam est mentum, linguam antrorsum *e*, ducit, atque, dum postrema pars baseos ad mentum accedit, facit ut apex de dentium intervallo ipsaque labiorum rima exeat. Una latera linguæ depri-
mit *d*, eamque explicat.

Potest etiam fibris suis antrorsum recurvatis linguam ad posteriora reducere *e*, etsi hæc actio prioris contraria videtur.

Contra, si maxilla inferior laxa fuerit, & os hyoides per vires suas aut elevantes, aut depri-
mentes, aut utrasque, retrorsum ducatur, poterit etiam genioglossus maxillam inferiorem deducere, & os aperire.

§. X.

z p. 224.

a p. 255.

b *Albin.* p. 223.

c *Mussa* p. 68. *Columbus*

p. 128. *Arantius* p. 82. *Albin.*

p. 223. *Douglas* l. c. *WVinslow* n. 526.

d Conf. *WValther* de deglut. p. 6.

e *WVinslow* n. 526. *Douglas* l. c.

§. X. *Styloglossi.*

Ab apice *f* processus styloformis natos diximus. Inde porro in arcum *g* flexi descendunt, dumque maxillæ angulum incurvati prætervehuntur, accipiunt sibi adnexas ligamentosas fibras, ex maxilla, proxime super angulum natas, & processus styloformis apici innascentes, quibus sustententur *h*. Eæ aliquando carneæ fuerunt *i*, ut altero capite styloglossus augeretur *k*. Bis & ego carneas vidi. Inde porro styloglossus secundum latera linguæ, super hyoglossum *l*, ad apicem *m* usque rectus producitur, plerumque non simplici fine. Alias duo *n* plana fibrarum vidi, primum quod nunc dixi, cuti propius: alterum tectum a priori, & cum eo ceratoglossum *o* amplexum, cumque eo ipso & genio-glossis fibris nonnullis confusum, & pariter ad apicem continuatum. Alias tria, quæ vocant, fibrarum strata fuisse vidi. Quod cuti linguæ proximum, idem longissimum fuit, & fibras aliquas miscuit cum ceratoglossis. Medium, posterius, in lingualem musculum accessit, ut

-
- | | |
|-----------------------------------|--|
| <i>f</i> Albin. T. II. f. 40. 41. | <i>k</i> Cowper ibid. Unice inde |
| T. 10. f. 2. | natum vidit Duverney myoto- |
| <i>g</i> Eustach. T. 41. f. 5. 8. | molog. p. 60. |
| Bidloo T. 19. C. Albin. l. c. | <i>l</i> Courcelles T. V. E. Albin. |
| <i>h</i> Riolan. p. 741. & 311. | f. 41. 42. 43. T. X. f. 2. |
| Winslow traité de la tête | <i>m</i> Albin. f. 41. 42. Fallop. |
| n. 519. Morgagn. Epist. XI. | p. 75. Bonhomme T. 15. f. 2. E. |
| n. 11. Veithrecht f. 32. i. 2. | <i>n</i> Fallop. Instit. p. 56. Albin. |
| <i>3. k.</i> Gautier in tab. | p. 224. Lieutaud p. 177. |
| <i>i</i> Douglas p. 35. Cowper | <i>o</i> Albin. p. 214. Conf. Wins- |
| T. 23. E. | low n. 520. Lieutaud l. c. |

cuti propius ceratoglossum complecteretur. Postremum, ossi hyoidi vicinius, & ipsum genioglossum occurrit, & cum priori ceratoglossi muscoli profundum stratum continuat. Sed posteriora duo strata Ill. *Albinus* linguali musculo accenset. Tria tamen fuisse vidi, cum præterea lingualis musculus adesset. Vidi quatuor fuisse plana fibrarum: Superficiale primum: alias tenues fibras sub chondropharyngæo, ad genioglossi lacertos ossi hyoidi propiores inclinatas, & in eum musculum terminatas: alias supra eum chondropharyngæum similiter omnino in genioglossum continuatas, denique fortiolem lacertum, qui ad latus genioglossi externum partem linguæ non modicam constituit. Tres ultimas partes perinde ad lingualem refert *Albinus*.

Fasciculum ad laryngem dedisse *p* visus est; & sunt, qui viderint nullum styloglossum fuisse *q*.

Linguam potissimum retrorsum ducit, apicemque contra epiglottidem elevat, tum os hyoides *r*.

Alterius lateris styloglossus, si solus egerit, linguam varios ad usus ad latera trahit.

§. XI. *Linguales.*

Lingualis utrinque musculus plurima cum styloglossum communia habet, ductum eundem *s*,

p *Boehmer fascic. obs. præf.*
p. 7. Osteol. p. 117. Cheselden
p. 79.

q *Boehmer p. 6. 7.*

r *Albin. p. 214.*

s *Columbus substantiam linguæ pro duobus musculis numerabat p. 127. Primus lingualem musculum constituit Douglassius p. 36.*

fibras communes. Solet tamen distingui. A nullo osse profectus lacertus est, qui a sede ossis hyoidis, & a radice linguæ *t*, antrorsum, & paulum extrorsum tendit. Adcumbentem hinc exterius genioglossi pharyngæum finem habet, multis fibris sibi mistum *v*, inde styloglossum, a quo posterius interjecto ceratoglossi distinctus, hunc ipsum musculum tamquam vagina continet *x*, cujus fibris se sodalem addit *y*, & una ad apicem *z* linguæ fertur. Principium alias simplex habet, duplex alias, & ceratoglossum tunc quasi vagina altera complectitur *a*. Linguam deprimit *b*, in os reducit, apicem deorsum ad frenuli sedem curvat *c*, & una versus pharyngem retrahit.

§. XII. Ceratoglossus. Basioglossus.

Sive unicum musculum feceris *d* sive duos *e*, consentientes habebis Cl. virorum auctoritates. Eorum ergo alter, a basi ossis hyoidis, per paucas lineas, & ab exteriori ejus parte, e regione sternohyoidei, alias etiam ab incipiente cornu per aliquod spatium *f* oritur. Inde extrorsum

-
- t* Douglas, Albinus T. II. f. 41. 43. T. IO. f. 3. h. Courcelles T. VIII. Walther de deglut. p. 7. obs. 75. & Drelincourt prælud. p. 186. & Morgagnus advers. II. p. 34. Est Hyoglossus Winslow n. 520. Ceratoglossus Douglas p. 35. Uterque etiam chondroglossam conjungit.
- v* Albinus l. c.
- x* Albin. f. 43.
- y* Albin. p. 226. T. II. f. 40.
- k*. f. 41. e. f. 42. e. T. IO. f. 3.
- z* Douglas p. 36.
- a* Albin. f. 43. b. l. a.
- b* Walther l. c.
- c* Albinus l. c. Douglas ibid.
- d* Unicum mavult Fallopius
- e* Oribasius p. 206. 208. Vesalius & J. W. Pauli in præf. Comperus T. 28. f. 50. 51. & Albinus.
- f* Albin. f. 40. g. T. IO. f. 20. & p. 221. Eustach. T. 41. f. 5. 8.

antrorsum *g* radiorum ad modum dilatatus migrat, & supra glandulas sublinguales in basin linguæ definit, aliquantum a ceratoglossa tectus, & eodem anterior. Inter styloglossi duo plana quasi in vagina continetur, aut inter styloglossum & lingualem. Ad styloglossi etiam ductum se accommodat *h*, pariterque tendit antrorsum. Hic *Basioglossus*.

Alter incipit oriri, quando grandior est, a cornu ossis hyoidis cum basi conjuncto, inde a toto pene margine ejus cornu anteriori *i*, pene ad ligamentum usque hyothyreoideum, & simili fere decursu sursum extrorsum introrsum delatus una linguæ partem posteriorem & lateralem constituit. Inter styloglossi strata continetur, comitemque se ei addit, & incurvatus ejus ductum sequitur. Ejus etiam fibris multas de suis immiscet *k*. Fibræ ab extremo cornu natæ, priorum contrariæ potius introrsum redeunt. Hic *Ceratoglossus*.

Cum arteria lingualis interjecta hos musculos potissimum distinguat, inæquales portiones facit, ut sæpius solo ab extremo cornu alter triangularis & angustior *l*, alter & a basi, & a bona cornu parte prodeat.

Est ubi tres omnino partes facere licuerit,

g Courcelles T. 5. C.

h Idem T. 8. M.

i Eustach. T. 41. f. 8. Douglas p. 35. cum late dicat oriri,

Albinus T. 11. f. 40. e. e. T. 10. f. 2. & p. 219. Inter lingualem

& styloglossum Courcelles T. 8. G. y.

k Albin. f. 40. ad D. T. 10. f. 2. ad E.

l Ita fere Verheyen T. 29. f. 9. O.

duas quas nunc descripsi , deinde tertiam , anteriorem , atque ab istis tectam , a cornu ossis hyoidis parte anteriori natam *m*.

In universum uterque latera linguæ deprimit & linguam explicat , quando excavata fuit , atque arctat *n* : eamque in oris profundiora reducit *o*.

Si lingua firmiter a genioglossa & geniohyoideo antrorsum prolata fuerit , poterit etiam os hyoides elevare , & antrorsum ducere *p*.

Alteruter linguam oblique ad latera trahit *q*.

§. XIII. Chondroglossi.

Parvi sed omnino diversi sunt , quos nunc dico , musculi. Nempe fibræ carneæ , breves , crassulæ , sursum s antrorsum radiatæ. *t* in linguam exeunt , in ceratoglossum , & genioglossum terminatæ , cumque linguæ perrecturæ ; ex corniculo hyoideo *v* , & a ligamento natæ , quo id corniculum ad os bicornis revincitur , aque proxima parte baseos ipsius ossis *x*. Octies in tabulas meas retuli , neque meminisse desideratum fuisse , quando inquirebam *y*.

m Huc refero voces Winslowi n. 421. & figuram Eustachii T. 41. f. 11.

n Albin. p. 220.

o Douglas.

p Albinus ibid.

q Douglas.

s Albin. in icon. Arcum facere cum sodali Verheyen p. 272.

t Courcelles T. VIII. D. d. d. Teretem vocat Walther de deglut. p. 9.

v Courcelles , Albin. T. 41. a. b. T. 10. f. 4. t. Verheyen tab. 9. f. 9.

x Etiam Albin. p. 222.

y Plerumque reperiri Pauli præf.

Exiguus cum sit, debiliter ceratoglossum & baseoglossum adjuvat.

Myloglossus veterum z & *Verheyenii*, a *Winslowo* non præteritus, ab aliis exclusus a, ab aliis iterum tamquam non perpetuus b recensetur. Ex *J. Wilhelmi Pauli* indicio c ad pharyngem & ad mylopharyngæum pertinet.

§. XIV. *Fibræ linguae propriae.*

Linguam ipsam musculum esse d, & a vetustis dictum est & a nuperis auctoribus: neque obstat e, quod teneriores fibræ sunt, atque mollior cellulosa fabrica f, plusque teneri & mucosi adipis g etiam minutis lacertulis sit interjectum. Nam & irritabilitate lingua gaudet, & mobilitate, & fibras habet sibi parallelas. Quos vero ductus sequantur eædem, id junice quæritur. In vituli lingua *Malpighius* h invenit fibras longitudinem sequentes i, transversas k, perpendiculares l, obliquas m, introrsum convergentes, inque

z *Garengeot myotom.* p. 104.
146. *Heister* p. 81.

a *Drelincourt* p. 180. *Cow-*
perus, *Albinus*, *Verdier*.

b *Molinett. diss. anat. path.*
p. 132. *Petit ad Palsyn* p. 489.
D. de Marchett. p. 90. *Lieutand*
p. 177. *Winslow* n. 517. Ut-
cunque vidit *Morgagnus adv.*
II. p. 33. *Rarissime Boehmer*
præf. p. 8.

c Magis ad pharyngem quam
ad linguam pertinere *Pauli* l.c.
Weitbrecht Comm. Acad. Petr.

T. IX. p. 257.

d *Wharton* p. 6. *Bellin de*
gustus organ. p. 104.

e Ideo separat *VV. G. Muys*
de fibra musc. p. 136.

f *Revershoft de fabric. ling.*
n. 38.

g *Idem ibid. Heymann* p. 498.
499.

h In proprio libello de lingua
i f. 1. A.

k B.

l *Ibid.* C.

m f. 3. G. G.

angulum consentientes , aliasque divergentes *n* , alias , quæ dorsum acuminatum deprimant *o* .

Porro in homine tres fibrarum ductus sibi adnotatos descripsit *Stenonius p* , quæ nempe longitudinem sequantur , quæ latitudinem , quæ crassitiem , & quæ eadem ad perpendicularum ponantur *q* . Alia plana fibrarum *Bidlous r* pinxit , recta , tunc oblique extrorsum descendente , & duos fasciculos teretes peculiare fibrarum perpendicularium .

Mihi , perinde ut aliis *Clar. viris s* , in homine quidem impossibile videtur fibras teneras , adipe obvolutas , seque trahentes , separare inque lacertos disponere , quibus nomina possis impartire . Inferiores tamen fibræ fere a genioglossis producuntur ; posteriores , & a ceratoglossis , superiores & eadem laterales a styloglossis .

Sed neque in vitulo facile est *t* fabricam *Malpighianam* ostendere , & qui microscopio plurimum usus est *Antonius v. Leeuwenhoeck v* , solas perpendiculares & transversas fibras retinuit .

Id interim certum est , mira mobilitate linguam gaudere , qua omnes fere & figuras induat , & situs omnes , & sæpe in formas se fingat , quas a nullo , quantum intelligo , muscutorum exteriorum derives , qualis frequentissima illa est ,

n f. 2. E. E

o f. 4. H. H.

p De musc. & gland. p. 13.

q Collins p. 226. 227. Barbaut
splanchnolog. p. 354. &c.

r T. XIII.

s Massa p. 67. Albin. de

deglut. p. 38. *Reverhost de fabr.*

ling. n. 37. *Boerhaave Prælect.*

T. I. p. 163.

t Reverhost l. c. *Lichtmans*
p. 62.

v Arcan. & contempl. Ep. 81.

p. 408.

in qua in canalem se fingit , medioque dorso excavato cibos fuscipit.

§. XV. *Fauces.*

Etsi alius his partibus describendis aptior locus erit *x* , non potest tamen hæc oratio absolvi , quin hætenus in universum fauces innotescant. Nempe gula , posterius quidem in amplum musculosum saccum abit *y* , qui ante sex vertebrarum colli superiorum corpora *y*^{*} , & ossis occipitis partem cuneiformem , & simile medium ossis multiformis fundamentum , surgit , laxiori primo cellulosa tela ad periosteum firmatus , sensim vero strictiori. Inde ad latera quidem idem saccus ossis cuneiformis alis magnis *z* , deinde maxillæ inferiori *a* , tunc linguæ & ossi hyoidi *b* , & cartilagini thyreoideæ *c* , & demum anulari *d* adhæret , ut laryngis facies averso eo sacco comprehendatur , cumque epiglottidis pars cava anularis cartilago latiori facie sua respiciat , deinde cartilagines aryænoideæ *e*.

Idem supra linguam apertus patet , & duas in caveas ducit. Inferior inter linguam *f* aperitur , & fornicatum palatum mobile , quod in

x Quando de deglutitione agetur.

y *Albin.* T. 10. f. 8. 9. 10. *Eustach.* T. 42. f. 11. *Comper* T. 28.

y^{*} *Albin.* ibid. f. 1 -- 5.

z *Albin.* f. 3.

a *Idem* t.

b *Idem* f. 2. *bita. gamma.*

c *Idem* f. 2. E. delta. zeta. f. 3. alpha. bita. gamma.

d *Idem* f. 2. 3. æta. tan. f. 3. gamma. delta.

e *Idem* f. 12. 13. 14. 15. *Casser.* T. I. hom. f. 7.

f *Albinus* f. 17. conf. 12. 13. 14. *Bidloo* T. 13. f. 1. *Bonhomme* T. 15. f. 1.

arcum curvatum , inque mediam columellam contractum *g* , demum dorso linguæ postremo ante epiglottidem imminet , ut tamen distet *h*. Hæc via & aperiri potest , & claudi.

Super idem velum alia , sed minus mutabilis via ad nares patet *i* , medio divisa vomere , eademque supremo ad os occipitis adnexo pharyngi continuata.

Quare aeri vel de laryngis magno ostio efflato , vel per angustiores glottidis rimam eliso , non alia præter os naresque via superest. Per alterutram exire potest , vel per utramque.

§. XVI. Os.

Potior via , quæ ad loquelam propius pertinet , inferior illa est , os inter & velum mobile. Oris non una est significatio. Latiori sensu designat ingentem caveam , quæ hinc labris , buccisque clauditur , inde velo palatino , si ad id linguam elevatam ponas , dorsoque linguæ postremo.

Deinde oris vocabulum divisam habet significationem. Buccarum cavea est inter dentes utriusque maxillæ , & alveolorum principium , interque musculosum illum parietem , quem alias describemus , nunc unice labro superiori & inferiori & dextra bucca atque sinistra contineri dicemus. Ejus *caveæ buccarum* anterius ostium etiam os dicitur , posterius inter dentes superiores & inferiores aut clauditur , aut patet.

g Albiz. f. 12. 13. 14. 15. 17.
Littre Memoir, de l'Acad. 1718.
T. 15. f. 1.

h Bonhomme f. 1. *Littre* f. 1. 2
i Bidloo T. 14. f. 2. *Albin.*
f. 12 -- 16.

Porro lingualis illa cavea, sive os verius, antè terminatur dentibus utriusque maxillæ, superius palato primo osseo, deinde molli: inferius membrana oris, deinde linguæ carnibus inferioribus & musculis subjectis, genioglossis, geniohyoideis, mylohyoideis.

Posterior vel palato molli, & lingua clauditur, si eæ partes conjunctæ fuerint, vel vicissim patet, si diductæ.

Eam caveam lingua pene totam replet, inque eam ita producit, ut in duos iterum quasi loculos dividat. Superior amplius linguæ dorso, dentibus superioribus, palato osseo & molli continetur. Inferior linguæ parte cava, & aliqua parte alveolorum dentium priorum inferiorum, subjectisque genioglossis & glandulis sublingualibus, quas oris, quæ dicitur, membrana oblinet.

§. XVII. Uvula.

Veli palatini & uvulæ historiam hic omittimus. Vetusta quidem fama fuit, uvulam plectrum esse vocis *k*, & suo loco vocis vitia dicentur, quæ ex uvulæ magnitudine aucta sequuntur, aut diminuta *l*.

Verum *m* ad vocem moderandam mollissima & ad mollem partem, linguam, unice adpulsura

k Fabric. P. II. c. 8. Galen. de usu part. L. VII. c. 5.

i S. III. n. 10.

m Vide contra vulgarem opi-

nionem Fallopius obs. anat. p. 212. Schelhammerum de voce p. 17.

uvula una ineptissima videtur. Et vox quidem, minime debilis, absque uvula in cane & plerisque animalibus *n* editur, atque uvula corrupta multos commode loqui *Hildanus* testis est.

Quare, quæ voci acciderunt detrimenta ab uvulæ vitiis, si majora fuerunt, voci per veli palatini vitiata organa illegitimo itineri tribuerem, pariter uti erosio naribus vox rancidum o quid sonat, non quod nares in voce aut loquela moveantur, sed quod sonoros aeris tremores transmittant aut reflectant. Quare, si palato osseo eroso vox deletur *p*, redditur eadem reposita pro osse lamina *q*, resonitu ergo, non motu restituto: & homo, cui gurgulio erofus fuerat, loquebatur capitis situ mutato *r*. Eadem de loquela erit sententia mea. Poterunt litteræ gutturales *s*, vitiato gutture, malignius pronunciari, quod adlisiones necessariæ sublatae sint: sed nulla littera est, in qua producenda uvula laborat; plurimosque liceret testes excitare, qui omnino uvula resecta *t*, aut

n Pene foli homini concessa uvula *Morgagnus Epist. IX.* n. 9.

o Qui uvulam amiserunt, absurde & quasi per nares loquuntur *Pareus L. V. c. 14.*

p *Forest. L. 32. obs. 22. Schultet. T. 36. f. 4.* Qui absque palato erat, obscure loquebatur *Nov. Eph. Nat. Cur. vol. 1. obs. 103.*

q *Schultet. l. c.*

r *Slevogt. de gurgul. ad fin.* Antrorsum capite inclinato.

s *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs. 16.* Non bene pronunciabatur l. s. o, r. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. p. 490.* cum nulla uvula esset, adultior certas litteras pronuntiare non poterat *Vedel morb. infant. p. 12.*
t *Rufus part. hom. L. II. p. 57. Blancard Jaarregister I. C. IV. n. 99. Martin Phil. Transf. n. 233. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs. 66.* Mansit tamen rauco.

erofa *v*, aut nulla *x*, negant loquelam lædi, etiam excitatis exemplis. Ut omnino suspicio ante me Ill. viri fuerit, alias præterea partes corporis in iis hominibus læfas fuisse, quibus ab uvulæ vitio vox jacturam dicitur passa esse *y*.

§. XVIII. *Nares.*

Quæ via supra palatum osseum & molle ad nares ducit, ea caveam offendit vastam, multiformem, multis auctam recessibus, osseam totam, pulpofa equidem membrana vestitam, quæ manifestissima adparet, quando deletis paulatim ossibus nuda, & sola relinquitur. Princeps cavea profunda, ad perpendiculum a lamina cribrosa descendit ad narium fundum, qui ex cavis ossibus maxillæ & palati formatur. Eam mediam septum, sæpe equidem inæqualiter, bipartit *z*, ut dextrorsum convexum dextram meatus partem reddat angustiores, aut vicissim *a*, nam utrumque vidi. Septi narium natura superius, & inferius, atque posterius ossea est, antèrius triangulari cartilagine perficitur.

Inde lateralis recessus cavæ narium tres ad anteriora magnæ cavæ adduntur, ut tamen &

v Astruc de lue Vener. L.IV. p. 410. Fallopius l. c. Baubinius Theatr. anat. L. III. c. 83. Hildan Cent. II. obs. 21. 22. Phil. Trans. n. 464. Eysel de præcipuis uvulæ morbis n. 3. add. Mosca P. II. T. I. p. 221. *x* Hagedorn. obs. 68.

y Morgagn. l. c. *z* Schneider de catarrh. L. VI. p. 473. Gunz Memoir. des Savans étrangers p. 290. Quelmalz progr. de incurv. sept. nar. Bertin ostiolog. T. II. p. 214. *a* Semper sinistram Gunzius p. 288.

posterior *b* finis cavæ magnæ continuus sit, & anterior *c*. Ergo imus quidem meatus, inter latera narium & os cribrosum infimum intercipitur, in medio altissimus, humilior & ad anteriora, & ad posteriora *d*.

Medii eadem fere natura est, ut tamen brevior sit. Inter parietes maxillarum sinus & os spongiosum medium intercipitur *e*.

Supremum additamentum unice posterius est, breviusque, inter planam partem ossis spongiosi, quod nunc dixi, & cellulas ethmoideas infimas *f*.

In caveam narium contra protuberant tres quasi monticuli, os spongiosum imum, introrsum convexum, anterius & posterius caudatum, & gracile *g*: Os ejusdem nominis medium, anterius obtusius *h*, & totum brevius, denique totus ille cellularum ethmoidearum apparatus *i*, quem exterius os planum perficit, & teneræ versus nares laminæ claudunt.

Sed recessus, quos dixi, multi magnique in nares patent: primumque frontalis uterque sinus, in cellulam aliquam ethmoideam descendit *k*, cumque ea in medium narium additamentum

b Fascic. Icon. IV. f. 3. ad Z. & Y. Albin. T. 4. f. 1. ad 5.

c Fascic. IV. f. 1. ad B, C, D. Albin. ad æta.

d Fascic. IV. f. 1. ni. pi. pi. mi. f. 3. alpha. zita. Albin.

T. ita. delta. Tarin osteogr. T. 7. V. V. VV.

e Fig. I. epsilon thita ita epsilon

gamma. f. 3. z. b. Tarin i g e g e.

f f. 1. u. u. f. 3. c. Albin.

w. w. v.

g f. 1. ab mi. ad ni. Albin.

L. Tarin c.

h f. 1. bita. Albin. D.

i f. 1. p q n o l m h. Albin. n.

k f. 1. l. Albin. d. c. f. 2.

apertus, latus, angustus, in osse folido exsculptus, cum adolefcentia demum subnascitur.

Deinde sphenoidei sinus *l* rotundiores, utraque diametro non exigua, & ante fellam turcicam, & sub ea, & post eam, late in osse multiformi exsculpti, inque supremum narium meatum, antrorsum patuli.

Cellulæ ethmoidæ *m*, tres, quatuor, utrinque, tenerrimo ex osse effosæ, quarum anteriores in medium, posteriores in supremum lateralem narium canalem aperiuntur.

Sinus demum maxillaris *n* vastus, & ante nativitatem jam inceptus, in osse maxillæ peculiariter dicto excavatus, tenera lamina ossea fere undique clausus, ad medium meatum patet.

In eos sinus & recessus, quoties muco non pleni sunt, aer ex glottide emissus irruit, osseosque parietes percellit, novosque in tremores totam narium universitatem ciet. Breve interim compendium dedimus, plenior enim historia ad olfactus instrumentum pertinet.

l f. 1. V. f. 3. e. d. f. Albin. *n* f. 3. G. H. f. 4. G. H. b.
f. 1. 2. Omega. Tarin f. 1. 2. f. Z. a, c. Albin, f. 2. 3. p.
m f. 1. h. l. n. n. q. p.



S E C T I O III.

T O N I.

§. I. Vocis sedes.

VOCEM dicimus aeris sonorum per glottidem iter : expirationis enim necessitatem o non sinunt libere admittere singultus phænomena p, & tussis q pertinacioris, & denique ventriloquorum forte sive hominum, qui etiam literas aere pronunciant per inspirationem retrogrado. Ejusmodi quidem loquelam non crederem aut Rhodigino, aut Adriano Tourneboeuf r, aut aliis s passim testibus, sed gravissimo viro J. Conrado Ammann non licet fidem negare, qui vetulam inspirando loquentem vidit. Neque tamen dissimulandum est secundum Cl. La Chapelle totum artificium poni in aeris penu, quem ventriloquus in posteriori parte cavæ oris reservat, & pro arbitrio edit.

Per glottidem t in homine aerem transire

o Nullam vocem, nisi in expiratione fieri *Fabricius P. II. c. 5.*

p p. 139.

q In qua vox oritur ab aere in asperam arteriam redeunte *Dodart. Mem. de l'Acad. 1706. p. 249.*

r Apud *Foesium in æconomia Hipp.*

s F. M. V. *Helmont. alphabet. natur. p. 22. Suidas p. 667. Breslauer Samlungen 1724. M. Mart. Camello Phil. Transf. n. 307. ubi superstitiosi quid subest.*

t *Schelhammer p. 26. Dodart l. c. p. 248. Perrault Essay. p. 393. Ferrein in Thes. Cl. Mon. tagnat.*

oportet, ut vox edatur. Hinc si in larynge *v* aut epiglottide *x* morbi fuerint, vox parva, obscura, rauca est. Si omnino bronchus vulnus accepit, vox nulla superest, sive casus calamitatis causa fuerit *y*, sive curiositas experientis incisoris *z*.

In plurimis animalibus, & avibus potissimum *a*, aliter res se habet, avibus nempe plerisque præter laryngem verum alius nodus est in broncho ad divisionem positus. Ita se habet in avibus aquaticis *b*, auctore olim *Aldrovando*, in corvo *c*, anate *d*, anate moschato *e*, mergo *f*, anseri *g*, cygno *i*, querquedula *k*, ipso demum, ut nuper vidi, passeri & gallo *l*.

In

v Fissa cartilagine thyreoidea vox vitata *Eph. Nat. Cur.* Dec. III. ann. 2. obs. 136.

x Epiglottis nulla, vox exigua *Guilielmini de morbofor. cadaverum* iudicio p. 22. Uleus epiglottidis vox nulla *Duncan chem.* p. 197. Raucitas a fissura cartilaginis scutiformis *Eph. Nat. Cur.* vol. X. obs. 12.

y A vulnere laryngis *Acad. de Chir.* T. I. P. 3. p. 135. & T. III. p. 78. A vulnere asperæ arteriæ *la Motte chirurg. complet.* obs. 212. & ab ulcere *Mem. de Chir.* T. I. P. 2. p. 185. 194.

z *Fabric.* l. c. P. II. c. 4.

a *Herissant Mem. de l'Acad.* 1753. p. 290.

b *Perrault Essays* T. III. p. 139. T. 7. f. 12. *Dodart* l. c. p. 322. *Maleet Ergo homini*

vox peculiaris p. 9.

c *Aldrovand* L. 19. p. 264.

d *Hildan ad Pavium* p. 223. *Aldrov.* l. c. p. 190. *Blas. miscell.* p. 283. *Mem. avant* 1699. T. II. p. 48. *Albin of birds* T. II. n. 100.

e *WVelsch hecatostæ* obs. 71.

f *Aldrov.* l. c. p. 279. merganser *Birch* T. II. p. 13.

g *Aldrovand.* p. 107.

i *Bartholin.* de cyg. anat. p. 38.

k *Albin.* T. I. n. 100.

l Vox in ima aspera arteria ad bifurcationem in gallo nascitur *Ancien Mem.* T. 2. p. 7.

Cum nempe laryngem & organum vocis avium partim non ad verum, partim potius nimium ornate videam describi, liceat breviter exposuisse, uti se habet in anseri.

In iis nodis membranæ tensæ sibi parallelæ

Larynx alter inferior est avibus proprius, quem primum describo.

Aspera arteria, quæ anulis fit integris & parum distantibus, paulum supra divisionem abit in duriores naturam, ossisque similiorem. Ea fit duobus arcubus ossis, dextro & sinistro, non penitus semicircularibus. Ex eorum semicircularum finibus & antè petiolus membranaceus exit, & posterius, quorum quilibet suum bronchum suspendit. Hi petioli utrinque bini, sibi vicini sunt, propiores tamen qui anteriores.

Deinde bronchus quilibet, qua asperam arteriam respicit, arcum similem, sed cartilagineum habet, perinde semicirculo planiorem, sursum cavum, quem uterque petiolus suspendit.

Inter petiolos, per latera, inter ellipticum arcum ossis ultimi asperæ arteriæ, & primum cartilagineum arcum bronchi, spatium nascitur, unum utrinque. Id spatium a tensa membrana repletur, quæ ex broncho ad osseum asperæ arteriæ arcum adscendit, ita oblique, ut ejus posteriori fini inferatur, in caveam producta arteriæ asperæ. Figura fere elliptica est, ut tamen inferne ad bronchum angustior, superne ad asperam arteriam latior sit.

Paulo supra os istud musculi inferruntur, qui asperam arteriam elevare, atque eam membranam tendere videntur.

Bronchus quilibet sub asperæ

arteriæ divisione intumescit in ovalem fere tumorem, depressum, cujus undecim circuli cartilaginei sunt, quos brevissima membrana conjungit. Dextra cistula sinistræ cistulæ, qua proxima est, densissimæ cellulossæ telæ ope conjungitur. Cavea ejus cistulæ intus simplex est, nisi quod columna cartilaginea quasi septum inter dextros & sinistros anulos faciat, cui utrinque ii anuli adhærent.

Deinde sub ea quasi pixide bronchus quilibet, qua in pulmonem ipsum subit, incipit misceri membranacea natura, quæ antè ex rima quasi anulorum cartilagineorum nata versùs pulmonem latefcit.

Posterius vero de broncho utrovis quatuor aut quinque semianuli cartilaginei eminent, tenera membrana in unum tubum conjuncti. Hi anuli in caveam bronchi vehementer se efferunt, ut possint pro totidem valvulis sibi parallelis habere, inter quas profundi sinus, quasi in valvularum aortæ parabolicis spatiis, intercipiuntur. Sunt autem vere eminentes margines nascentium bronchiorum, sive ramorum, qui porro mollissima membrana perfecti in pulmonem utrinque continuantur. Maximi, qui asperæ arteriæ viciniore, exigui sunt qui pulmoni propiores.

Sub iis anulis totus jam bronchus membrana est.

Nihil in hoc larynge est, quod possit arctari, tendi vero & laxari potest membrana valens, quam dixi, broncho interjecta & asperæ arteriæ.

ponuntur *m.* Sed eas proprio loco describam.

Larynx superior anseris.

Glottis antrorsum angusta rimæ similis est, ut tamen latescere apta sit: retrorsum latescit eadem, & rotunde sub appendicibus barbatis finitur. Eas appendices rima levis separat. Anterius rima glottidis cutaneo quasi arcu perficitur, qui a dextro latere in sinistrum circumducitur.

Incisa hac plica adparent *furculæ* cornua anteriora, incumbentia fini vomeris, & sibi vicinissima. Glottidis labia omnino efficiunt, dum membrana oris obvolvuntur.

Musculus *longus* *furculæ* oritur magno fasciculo a parte crassa nascente, superiori, vomeris, & ex calloso corpore, quo processus *furculæ* posterior & barbatus obducitur. Inferitur in totam longitudinem utriusque quasi dentis *furculæ* sive cornu majoris. Potest intra os versus & fauces quasi, *furculæ* cornua reducere, & accumbendo dum intumescit, comprimere.

Alter musculus *circumductus* duplicem arcum efficit, circa finem latiore posteriori glottidis, ut ea sede dexter musculus in sinistrum arcu continuo abeat. Duplicem anulum ea sede perficit. Prior incumbit conjunctioni cornuum *furculæ* majorum, & glottidis partem posteriorem arctat. Posterior, non penitus distinctus, dimidio anulo majori vomeris incumbit. Inferitur anterius in cornu utrumque majus *furculæ*, interius quam prior.

Cartilagine laryngis perinde est, sive unam numeres, sive duas, sed connexas.

Furcula, omnino hoc nomen meretur. Ea nascitur petiolo

suo brevi ex hilo sive medio processu vomeris. Inde crassa primo, & dura pars *furculæ*, quæ cornua ejus conjungit, continet glottidis latiore partem & posticam. Antrorsum vero uterque dens *furculæ*, sive cornu majus, continuatur, dextrumque sinistro parallelum in suum labium glottidis porro abit, sinistrum in alterum labium. Singulum eorum suum labium replet, atque denique nodulo terminatur, & ad sodalem convergit.

Sed cornu utrumque *furculæ* modo natum retrorsum educit *corniculum* tenuius, cui pars *barbata* posterior, glottidem terminans adhæret.

Vomer, sive præcipua pars laryngis, canalem inferius semiconicum repræsentat, qui quasi emarginatus, iterumque latescens, paulo latiori rostro terminatur, sursum perpetuo cavus.

Inde parte posteriori semicanalem perficit arcus valens, in medio incisus, ut non magno ithmo pars dextra cum sinistra uniatur. Huic mediæ processus anterioris sedi *fureula* adhæret, cellulosa tela brevi adnexa. Firmatur autem eo ipso processu anteriori, per totam longitudinem, primo in asperæ arteriæ anulo, vel brevissimo celluloso nexu, vel cartilagine tenuissima.

His collectis adparet, glottidem superiorem tendi non posse, sed arctari; Glottidem inferiorem arctari non posse, sed tendi. Videri ergo ad variandos tonos, & in tensione organi sonori, & in angustia ostii sonum edentis varietatem locum habere.

m Herissant T. IV. V.

Harum machinarum, & in universum bronchiavium, imitamenta sunt, quibus vocem simulatimiferas captamus *n*.

§. II. *A tremore oritur.*

Potest equidem vox, sed humilis, & rauca, quam *susurrum* o vocamus, per glottidem quietam reddi. Ut autem vere vocalis, & clara sit, omnino oportet aerem, dum per glottidem transit, ita incurrere in ejus rimulæ parietes, ut & ipsi tremant *p*, & una laryngis cartilagine, & denique ossa capitis *q*, & pectoris, & universi corporis *r*. Hinc surdi homines veram vocem non discunt edere, nisi manum ad laryngem loquentis magistri dederint, & tactu tementem laryngem fenserint *s*.

Adparet, cur organa vocis cartilaginea fere in plerisque animalibus sint, & elemento consent ad tremores omnium maxime idoneo.

Adparet etiam, quare in vivo melior & clarior vox producatur, quam quidem in cadavere *t*. Voces enim Ferrenianæ, quas ego unquam audiui, fuscæ fuerunt, & vivi hominis, vivique

n Verduc de l'usage des part. aliquos legere & audire docuit, II. p. 393. dum mento occipiti loquentis
o Holder Elements of Speech hominis innixi tremores perci- p. 47. Wallis Grammat. Anglic. piebant Gautier obss. T. III. p. 3. & imprimis Amman de p. 296.
loquela p. 26. 31. *r* Ammann. Schelhammer p. 28.
p Idem Cl. viri Ammann *s* Amman. p. 82. Raphael l. c.
p. 83. &c. *t* Negabat in cadavere pro-
q Vibrationum ope surdos duci posse Ammann p. 24.

animalis voci legitimæ nunquam fatis similes. Nempe vivo homini larynx a viribus musculosis, quas anima regit, ita libratur, ut, ab aere percussus, longe tremat celerius & expeditius.

Hinc in catarrhis vox exigua vel nulla, quando cartilagines muco obductæ minus exquisitè tremunt *v*.

Hinc fortissimus & gravissimus rugitus animalibus, quibus asperæ arteriæ cartilagines integræ, aut certe imbricatæ sunt, minimumque in broncho membranæ, plurimum vero cartilaginis, aut omnino ossa pro cartilaginibus sunt *x*, ut leoni *y*, elephanto *z*, crocodilo *a*, pavoni *b*. Et contra vox debilis, quibus anuli bronchi molles, ut casuario *c*. Hinc vox gravis, & cum inamœnitate fortis, in avibus aquaticis, in quibus repetitæ elasticæ membranæ in secundo larynge sonant *e*.

§. III. Tremunt ligamenta glottidis.

Diximus laryngem tremere, dum vox profertur, tremunt tamen potissimum ligamenta glottidis inferiora, & tenaciora *f*, per quorum

v Idem p. 29.

x Barthol. hist. 100. Cent. IV.

la Boulaye voyag. p. 303.

y Stukeley p. 97.

z Reck Salzburgisch. Emigr.

T. I. p. 182. Vesling Epist. V.

a Japonico Birch T. III. p. 489.

Grew Cosmolog. p. 25.

b Graculo Grew, linariæ Idem

ibid.

c Birch l. c.

e Herissant l. c.

f Ita olim Dodart Memoir.

de l'Acad. 1700 p. 258. Per-

rault ed. Bât. p. 393. deinde

Ferrein in thesib. D. Montagnat

in Memoir, de l'Acad. &c.

intervallum aer sonorus eliditur. Video virum, quem plurimi facio, de his tremoribus dubitare, tum quod aves non inter ligamenta glottidem habeant, sed inter cartilagines, & osseas denique conchas *g*, ad vibrandum ineptas, tum quod etiam in homine chordæ eorum ligamentorum non liberæ *h* sint, multaque membrana & mucosa obducantur *i*, & denique semper humore madeant *k*, & musculos thyreoarytænoideos adcumbentes habeant *l*. Extensionem etiam negat, de qua videbimus.

Verum certum est, in universum aerem in diversis tonis producendis utique corpora sonora omnia in tremores agere *m*, & a numero vibrationum majori acutos, a minori gravissimos nasci *n*: id quidem inter postulata potest recipi, quæ nemo recuset.

Deinde aer, ut alia corpora sonora, & laryngem in tremores agit, & proxime enim in ipsa ligamenta illidit, quæ glottidem includunt: tensa utique, & manifesto elastica, neque adparet, cur non faciat oscillare. Neque mucus impedit, cum etiam narium cartilagines certis in literis & sonis profundis manifesto tremant, quas similis pituitosa membrana obducit.

Sed etiam Cl. viros audire oportet, qui eas fibras omnino microscopio, dum sonabant,

g Lettres sur le nouveau système de la voix p. 42.

h Lettres p. 30. 36.

i Id addi potest, etsi disertè non dicit vir Cl.

k p. 38.

l p. 8. 30. & 37.

m Vide interim Comm. Boerh. T. IV. p. 298.

n ibid. p. 296.

dumque flatus per glottidem cum sono exhibat, adhibito tremere viderunt o.

Denique neque ejus experimenti nulla vis est, ex quo constitit, toto larynge remoto, fervatis solis glottidis ligamentis *p*, tamen inflatum per bronchum aerem eam vocem producere, quam natura cuique animali propriam dedit.

§. IV. Discrimina vocis.

Vox animali cuique propria.

Difficillimum dictu fuerit, quomodo aer ex humana glottide prodeus vocem generet, ex qua hominem ab omni alio animali dignoscas, & quare in quoque animale alia & alia, & semper sua vox nascatur, cum ligamentorum glottidis discrimina non possint, in fabrica adeo simplici, esse maxima. Et tamen verum est, solam glottidem characterem, quem dixeris specificum, cujusque animalis voci impertire. Non nova res est. In anserem, aer per bronchum inflatus, & de glottide prodeus, vocem anserinam facit *q*, idemque est experimentum *Perralti r*. Sed his avibus larynx in divisione bronchi est. Verum in aliis animalibus, quorum fabrica aut simplicior est, aut humanæ propior,

o *Ferrein Memoir. de 1741. p. 420. Montagnat éclairciss. p. 53. & in thesibus suis Maloet p. 7.*

p *Ferrein l. c. p. 422. Montagnat éclairciss. p. 97.*

q *Fabricius L. 3. c. XI. ad fin. ex discipuli experimento. r Ed. Bat. p. 394. T. 7. f. 12. & ed. Gall. Ess. de phys. p. 3. T. 7. f. 12. p. 139.*

aer aut unice de pulmone expressus , aut inflatus in bronchum , ut de glottide exeat , ranæ ololyginem *s* , aut cujusque quadrupedis propriam vocem repræsentat : & primus , ni fallor , *Schelhammerus* *t* experimento addidit , sufficere , si glottis integra fuerit , posseque reliquum laryngem totum abesse.

Sed multo ornatius hæc experimenta seculo nostro sunt repetita. Cl. quidem *Ferrein* flatu in asperam arteriam impulso , hominis , bovis vocem expressit *v* , unice arctata glottide.

Eadem fuit industria Cl. *Montagnat* *x* , Cl. *Herissant* *y* , deinde nuper Cl. *Maloet* *z* in sue , fele , cuniculo , lutra , lepore. Cl. olim auditoris nostri *Rungii* *a* , atque veteris amici *J. Gefneri* , demum *Portalii*. Idem experimentum eodem cum successu in larynge inferiori avium aquaticarum *Duverneyo* successit. Mihi quidem similia experimenta aliquanto minus feliciter ceciderunt , ut sonum quidem vocemque obtinerem , quam animalis esse adgnosceres , characterem tamen suillæ vocis , aut caninæ , non satis fideliter humanæ vero etiam minus potuerim imitari.

§. V. Unde vox acuta & gravis.

Si ligamenta glottidis ab aere percussa tremunt *b*,

-
- | | |
|---|--|
| <i>s</i> <i>Muralt vademec.</i> p. 590. | <i>y</i> In equo p. 284. asino p. 287. |
| <i>t</i> In canibus , bobus , ovibus | porco p. 289. |
| <i>l. c.</i> p. 17. | <i>z</i> Not. d. p. 7. |
| <i>v</i> <i>Mem. de l'Acad.</i> 1741. p. 417. | <i>a</i> In litteris. |
| <i>x</i> Tensis prius ligamentis | <i>b</i> p. 325. |
| glottidis in <i>thesi</i> . | |

si vocem edunt *c*, quæ cuique animali propria est, si sonorum varietas a numero vibrationum pendet *d*, quæ in tremente chorda certo in tempore absolvuntur, proximum est, ut etiam sonorum in voce varietas a numero vibrationum pendeat, quæ in iis ligamentis cieantur. Neque hæc *Dodarto* ignorata fuerunt *e*.

Verum id nunc quæritur, quomodo fiat, ut ligamenta glottidis alias celerius vibrent, vocesque reddant acutiores, tardius alias, & profundius sonent. Multum cum de ea re sit quæsitum, oportet esse in causis audiendis curiosiorem. Primum quidem id certum est, receptumque omnibus, laryngem suspendi mobilem *f*, inque sonis acutis adscendere *g*, descendere in gravibus *h*; thyreoideam enim cartilaginem, dum acutos sonos molimur, & sursum efferri, & antrorsum *i*, quisque in proprio larynge facile digitis percipit. Res vetusta est, & undique recepta. Hinc, quibus vox nimis ex natura sua gravis est, ii vitium superant larynge magis elevato *k*.

Propius etiam ad rem est accessum. In musicis varios numeros vibrationum tonos vocamus, & post tonos senos alios novam octavam numeramus *l*. Sed homines non rari duodecim diversos

c p. 327.

d p. 325.

e *Mem. de l'Acad.* 1700.

p. 258 -- 279.

f *Ibid.* p. 252.

g In scorbutico homine spasmus laryngis perpetuus, ut ad palatum usque adsurgeret, & vieissim descenderet ad jugulum *Hobius van der Worm* *artiplex satis.* p. 94.

h *Fabric. P. III. c. 8. Dodart*

l. c.

i *Ferrein Mem. de l'Acad.*

1741. p. 426. *Montagnat éclair-*

ciff. p. 81. *Ammann* p. 30. 37.

Berard art du chant p. 20. 21.

40. 43. &c.

k *Berard* p. 40.

l *Dodart Mem. de l'Acad.* 1700.

p. 269.

tonos proferre apti sunt , aliqui vere rariores cantores etiam sedecim tonis *m* possunt adscendere & ultra : & tantumdem tonis alii barytoni infra mediocrem tonum descendunt *n* , ut gravio- rem vocem proferant. Ad hanc , quatuor adeo octavarum varietatem producendam , multo & adscensu opus est , & descensu. Repererunt adeo , ut per octavam acutior sonus edatur , laryngis elevationem esse dimidii fere pollicis ; tantumdem vero descendere o eundem , ut vox alia tota octava mediocri tono gravior fiat : totum ergo laryngis iter , adscensu computato & descensu , esse integri pollicis , & in duobus hominibus , quorum alter altissime in alto laryngem elevat , alter profundissime ad bassum deprimit , pollicum omnino duorum *p* , quorum unus in adscensu percurratur , alter in descensu. In summis etiam conatibus , ad superandos limites susceptis , intra quos natura vocem nostram coercuit , caput totum ad cervicem rejicimus , ut musculorum laryngem elevantium vires intendamus *q*.

Non obscuræ per priora sunt vires , a quibus larynx aut levatur , aut deprimitur. Levatur a stylopharyngæo *r* , stylohyoideo *s* , thyreopala- tino *t* , quantum hic quidem in aperto ore potest : a biventre *v* , genioglossa *x* , genio-

m Dodart l. c. p. 267. 268.

286.

n Dodart ibid.

o Dodart p. 253.

q Dodart 1706. p. 141.

r p. 246.

s p. 292. seqq.

t p. 247.

v p. 294. seqq.

x p. 304.

hyoideo *y*, hyothyreoideo *z*, dum a musculis elevantibus maxilla superior firmatur. Id enim fieri posse non repugnat, & facile laryngis ad aperti oris diductam maxillam adscensus percipitur, una arytænoideæ cartilagine retrorsum ducuntur & ad se invicem accedunt. Deprimitur a sternohyoideis *a*, sternothyreoideis *b*, coracohyoideis *c*, ab ipso in inspiratione diaphragmate descendit etiam sola restitutione, quando vires elevantes desinunt agere.

§. VI. *An vocis varietas ex longitudine variata instrumenti vocis.*

Ut ex laryngis adscensu vox fiat acutior, variæ existant auctorum sententiæ. *Fabricius d* canalem vocis ex eo adscensu longiorem fieri credebat, indeque oriri quintam, octavam, & decimam quintam, reliquos tonos ad novemdecim usque, ad arctationem glottidis referebat. Ita *G. C. Schelhammerus*, acuti cæterum ingenii vir, a descensu laryngis vocem potius mutari, & (*a*) in exemplo in (*o*) *e* mutari, non tamen inde vel graviore sonos, vel acutiores fieri persuadebatur. Vocabat vero eum adscensum breviationem canalıs oris & faucium, descensum vero elongationem.

Contra *Dodartus* & priorum aliqui, hanc

y p. 300.

z p. 246.

a p. 289.

b p. 244.

c p. 292.

d L. III. c. XI. p. 302, ed. Lipf.

e p. 26. 27.

bronchi mutatam longitudinem ad acutos fonos, aut graves reddendos, nihil omnino facere, cum contra, asperam arteriam in laryngis adscensu longiorem fieri, & gravius fonare oporteret *f*, in descensu brevior fieri, & fonare acutius *g*, quod est contra experimenta: Idem ab oris nariumve cavea mutata, sive ab externo canale gratiam aliquam & puritatem tonorum deduxit *b*, quod utique ea cavea in gravibus tonis longior, in acutis brevior reddatur. Ita instrumentum vocis externum adcommodari ad tonos graves acutosve docebat.

§. VII. *An voces acutæ ab arctiori glottide?*

Non penitus nova res est, a glottide arctata vocem acutam, gravem a dilatata nasci. Nimis id conveniebat antiquo tibiæ instrumento, in quo notissimum est, clausis foraminibus, aut vicissim apertis, rima ergo sonora latiori facta, aut vicissim angustiori, graviores, aut acutiores fonos produci. Quare ante *Dodartum* vim veri aliqui fenserunt *i*. Sed etiam *Galenus* glottidem primarium vocis organum esse, & viam aeris contrahere & dilatare sensit *k*, & apud *Suidam* legimus, vocem acutam fieri cartilaginibus laryngis a musculis contractis *l*.

f Vide, ut ex longitudine canalis cum tibiæ comparata vocem gravem, ex brevitate acutam generari scripserit *Cassorius* l. c. p. 118.

g p. 252. 253.

b p. 251.

i *Fabricius* P. II. sub fin. P. III. c. 11. etsi alias conditiones adjunxit *Ammann.* p. 30.

k Apud *Oribasium* p. 60.

l III. p. 582.

Id autem addidit priorum inventis vir Clar.¹ quod unice in ea arctatione & dilatatione glottidis, indeque nato celeriori aut lentiori aeris torrente, & vibrationum *m* in ligamentis glottidis varietate, totam sonorum varietatem deduxit. Quare in ea hypothefi, adfcenfus laryngis ideo vocem acutam facit, quia glottidem arctat *n*, defcenfus viciffim gravem, quia glottis, depreffa cartilagine thyreoidea, aut toto larynge deducto, dilatatur. Ipfis tamen in ligamentis aliquid fphincteri o fimile quærebat vir Cl. fibrasque eorum elasticas fponte in contractionem niti, rectamque lineam adfectare perfuadebatur, a qua fiat glottidis arctitudo *p*.

Argumenta caufasque profert varias, quibus fententiam fuam ftabiliat, & alia fimilia addi poffunt. Viro inquit *q*, & hominibus gravioris vocis, glottis amplior, & profundior canalis exterior: contra in hominibus oxytonis & feminis larynx minor, palatum planius. Et larynx viro multo amplior eft *r*, eoque gravior vox, quo larynx amplior *s*. Animalibus etiam, quibus vox graviffima, iisdem ampla glottis eft, ut ardeæ ftellari *t*, & bovi *v*, inque ftertente teftudine & phoca *x*.

m Dodart 1700. p. 258.

n Utrumque conjungi jam Schelhammerus p. 27. *Lettres fur le nouveau systême de la voix* p. 31.

o Dodart 1700. p. 261. *Morgagn. advers. anat. II.* p. 31. Ita semper reperi.

p Ibid.

q p. 263.

r p. 367.

s Ammann p. 30.

t Duarum linearum Scheucher Bresl. Saml. 1721. p. 650.

v Fabricius P. III. c. 2.

x Paris. Mem. pour l'histoire des animaux. T. III. P. 2. p. 191.

In glottide tibiæ *haut-bois* rimæ angustiores *y*, & sola glottidis inter labia ab instrumento sejunctæ constrictio omnes tonos reddit *z* acutiores. In instrumento *Cromorne* (*Krumhorn*), non alia causa est varietatis tonorum, quam rimæ varia latitudo *a*.

In tibia unici foraminis, quæ rima est angustissima, tonus generatur omnium acutissimus *b*. In vulgatissimo illo instrumento, quod sibilos imitatur, angustia foraminum sola facit vocis acumen *c*. In organo musico pro brevitate fissuræ sonus acutior exit, & vicissim gravior cum latiori rima *d*. In tibia clauso ostio tubi vocis acumen intenditur *e*. Ita epiglottide depressa acutior vox redditur *f*. In sibilantibus denique manifestissime ad vocem reddendam acutiorem labiorum rima diminuitur, & rugis labiorum excitationis *g*, & apice linguæ admoto; indeque ad duas octavas sola labiorum forma mutata vox mutari potest *h*.

In tussî convulsiva sonus acutus fit ob glottidis arctationem. Sed arctationem glottidis ab homine canente addunt facile percipi, quoties subito ad tonum acutiorem transit *i*.

y Dodart 1700. p. 263.

z Idem p. 263. 264.

a Lettres sur le nouveau système p. 48.

b Casser. p. 159. conf. Schellhammer p. 24.

c Lettres sur le nouveau système de la voix p. 47.

d Lettres à M. D. p. 34.

e Ibid. p. 32.

f Lettres sur le nouveau système p. 49.

g Dodart 1707. p. 67. seqq.

h Plot natur. hist. of Oxfordshire p. 304. qui non est ad manus.

i Dodart 1700. p. 263.

In avibus manifesto, dum canunt, rimulam glottidis arctari *k*, pergunt, & denique adeo accurate claudi posse, ut ne atomus *l* quidem viam per eam rimam inveniat, totique atmosphærae & aquarum vi incumbenti resistat.

Ita porro pergebat vir Cl. glottidem continuo arctiorem factam tonorum dare omnes imaginabiles varietates. Minimam in latitudine, quæ non superet $\frac{1}{34} m$ partis fili serici, sive $\frac{1}{384}$ partem capilli varietatem alium tonum edere. Et cum octava a musicis in 810 *n* partes dividatur, glottidisque nativa latitudo in homine sit lineæ unius *o*, varietates toni ex ea sola rimula nasci posse *p* 9632. aut demum, si placeret accuratum esse, quadruplo numerosiores *q*.

Causam autem harum varietatum esse, quod angustior rima torrentem aeris exeuntis acceleret *r*, & vibrationes adeo in dato tempore faciat numerosiores, sonumque acutiorem *s*: ut omnino in sonis valde acutis reddendis ventus nascatur, quem manus percipiat, aut flamma ellychnii *t*.

Magno adeo cum plausu hæc sententia recepta fuit, quæ varietatem sonorum unice a variata

k Fabric. P. II. c. 4. in gallo canente.

l p. 261. Swammerdam p. 120. In ranis de Bremond Mem. de 1739. p. 477.

m Dodart 1700. p. 271. 272. Chordarum mutatio, quæ $\frac{1}{7000}$ non excedit, distinguitur a musica aura Keil abrigdm. p. 155.

n Mem. de 1700 p. 269.

o p. 268.

p p. 270. Certe partes 903. Ferrein p. 425.

q p. 270. De lusciniis vide Kircherum in musurgia p. 39. & conf. Krugerum physiolog. n. 233.

r p. 258. 260. &c. 1707. imprimis p. 72. 74.

s Ibid.

t 1707. p. 75.

glottidis amplitudine *v* derivat, nuperque post *Antonii Ferrein* contraria experimenta defensa est a *J. Exuperio Bertin* *x*.

§. VIII. *An a tensis ligamentis glottidis?*

Etsi in angustia variata glottidis potissimum causam diversorum tonorum quærebat, minime tamen ignoravit Cl. *Dodart*, quantæ partes esse possint chordarum alio & alio gradu tensarum. Quare tensionem labiorum glottidis cum variata latitudine conjunxit *y*, & vibrationes, uti dudum excitavimus *z*, fecit quam plurimi *a*, demumque gradus tensionis ligamentorum pro primaria causa admisit sonorum variatorum *b*, cujus sequela demum sit eorundem ligamentorum vicinia, & accessio *c*.

Iterum ad *justam*, puram liquidamque vocem docuit ligamenta requiri, quæ æqua vi tensa sint *d*, iisdem labiis inique tensis vocem fuscari, (*fausset*), aliumque a destinato tonum produci *e*.

Ultra tamen *Dodartiana* utique progressus Cl. *Ferrenius* *f* ita auxit dignitatem tensionis

v *Dodart* ubique. *Lettre à M. D.* p. 28.

x In duobus libellis minori, *Lettre à M. D. sur le nouveau système de la voix* Hagæ 1745. Paris 8. deinde eodem altera epistola aucto, & recuso cum titulo *Lettres sur le nouveau système de la voix & sur les arteres lymphatiques* 1748. 12. *y* *Mem. de 1700.* p. 246.

z P. 436.

a 1700. p. 258.

b p. 262.

c Ibid.

d 1706. p. 42. 1700. p. 252.

e 1706. p. 143.

f In duodecim quæstionibus *Monspeli* 1732. propositis, deinde in *Mem. de l'Acad.* 1741. p. 409. seqq. cujus diff. præcipua momenta repetiit Cl. *Montagnat*.

ligamentorum , quibus glottis continetur , ut omnino diversam latitudinem excluderet , hominisque organum vocis a tibiæ classe avulsum , ad id instrumenti genus revocaret , cujus variata tensio causa variati toni est. Ligamenta adeo glottidis cum chordis fidium *g* comparat *h* , quas aer tremefacit. Cum nempe aerem in bronchum inflaret , & eodem tempore glottidem varie arc-taret , vidit vim quidem soni cum arctitate glottidis intendi *i* , cæterum tonum minime mutari *k*.

Inde detectis undique glottidis ligamentis , percepta eorum vibratione *l* , observata ce-riorum oscillationum cum sonis acutioribus concordia *m* , vidit , compressis iisdem & vibra-tiones suffocari , & una omnem sonum perire. Deinde iisdem semper ligamentis ita confirmatis , ut una dimidia pars libera superesset , sonum ad integram octavam intendi *n* , & ad quintam , si tertia pars longitudinis diminuta fuerit *o* : & divisam per medium ejusmodi tæniam , nam solet ita vocare , in duas chordas abire , quarum quæque octavam acutiorem prioris toni reddit *p*.

Si inæquales portiones feceris , inæqualiter etiam super priorem tonum vox adscendet *q*. Si alterius ligamenti mediam partem liberam dimiseris ,

g Cum fidibus (viole) instru-
menta vocis comparat p. 416.

h *Memoir. de l'Acad.* 1741.
p. 416. 422. &c.

i p. 418.

k p. 418. 419.

l p. 420, 421. 431. *Runge* p. 36.

m p. 422.

n p. 421. 431. conf. *Montagnat*
thes. & *éclaircissements* p. 47.

o *Ferrein* ibid. p. 421.

p Ibid. & 431. conf. *Runge*
p. 36.

q Ibid.

dimiseris, alterum vero totum, tunc quidem symphonia fit, duorum tonorum, qui octava distant *r*. Denique vel utrumque ligamentum, vel alterum solum, ab omni alia parte firma corporis separavit, ut omnino soli fines manerent immutati, & tunc quidem, deleta jam glottide, iidem, qui dudum, toni redduntur *s*.

Porro ut diversi toni ab homine vivo producantur, sufficere vidit, si ligamenta sonora aliter & aliter tenderentur. In larynge ergo aut hominis, aut bestię, incisior ligamenta retrorsum educit, tenditque, aeremque una inflat, ita pro vario incremento longitudinis, quarta, quinta, octava, prioris soni auditur *t*. Neque adtinet iterum, num arctior sit glottis, num vicissim latior *v*, & demum alterutrum ligamentum solum, dum distenditur, acumen vocis intendit *x*. Sufficere autem repetit vir Cl. ut omnes varietates vocis humanę repręsententur, si duabus aut tribus lineis ligamentorum longitudo varietur *y*.

Iterum invenit, posse tendi ligamenta glottidis, & longiora reddi, hinc quidem antrorsum prolata cartilagine scutiformi, inde arytenoideis cartilaginibus ad averſam sedem reductis *z*. Eam verò mutationem facile esse duarum triumve

r p. 422. *Montagnat éclairciss.* p. 47. 57. 58. ad proprium experimentum.

s p. 422. 430. *Montagnat éclairciss.* p. 97. & in theſib. E. vox humana a sonoris fidibus plectro pneumatico moris oritur,

& conf. *Runge* p. 35. 36.

t *Ferrein* p. 424.

v *Ibid.*

x *Ibid.*

y Tres quatuor lineas habet Cl. *Montagnat* in theſ.

z p. 425.

linearum , adeoque ad producendam sonorum varietatem sufficere *a*. Se enim , dum una in larynge variorum animalium diversis modis ligamenta toties celebrata tendebat , omnes eorum animalium variatos in voce tonos producere *b*.

Eundem laryngis motum aiebat in homine digito *c* tangi posse , ut cartilago scutiformis antrosum ducta impressum digitum urgeat : idem vero si in cadavere factum fuerit , dum aer in bronchum inflatur , tonum tota octava altiore produci *d*. Machinulam denique ligneam , glottidis similem , excogitavit , quæ easdem vibrationes sonoras imitaretur *e*. Experimenta inde producit , testesque illustres Academicos *f* , aliosque viros Monspelienses *g* & ipse Cl. *Nolletus* testimonium pro Cl. viro dixit *h*.

Sed etiam alii Cl. viri *i* confirmant , ex variata glottidis latitudine nullam in tono varietatem sequi. Et Cl. Bremensis Professor *J. Georgius Runge* *k* propria per experimenta perinde evincit , glottidis solam variatam diametrum in tono nihil mutare *l* & ligamenti paulum in arcum diductis , cæterum magis tensis , potius acutiorem sonum obtineri *m*.

Cæterum aliquantum a Cl. *Ferrenio* in eo

a Ibid.

b p. 426.

c Ibid. *Montagnat éclairciss.* p. 471.

d Ibid. & p. 430. 431. *Montagnat thes.*

e p. 430. 431. *Montagnat éclairciss.* p. 64.

f p. 431.

g *Montagnat éclairciss.* p. 38.

h *Leçons de physique* T. III.

i *Berard* p. 13. ad propria experimenta.

k *De voce ejusque organis.*

1753.

l p. 37.

m p. 37. 38.

recedit Cl. olim noster auditor, quod ligamenta & superiora, & inferiora ad experimenta revocaverit, quorum ista quidem sola a *Ferrenio* adhibentur. Ea adeo, ut tensa magis, acutum *n* sonum reperit edere, dum tremunt, percussa ab aere, quem in bronchum impellit, & acutissime *o* sonare, quando sola relicta etiam contremiscunt. Superiora vero ligamenta ut molliora *p*, tamen etiam sola, oscillare, dum aer transit, lentius equidem, tardioresque sonos producere *q*.

Oportere adeo, sicubi sonus acutissimus producendus est, laxari ligamenta inferiora, superiora vero tendi, ut sola sonent *r*. Id officium a musculo thyreoarytænoideo præstari.

§. IX. *Objectiones.*

Solet, & non absque utilitate publica, vix ulla nova opinio obtinere, nisi prius a receptæ sententiæ tenacibus viris contradictiones passa, demum istas suorum testimoniorum robore superaverit. Multa sunt adeo, quæ contra *Ferrenium* non humili auctore proposita sunt; historica *s* aliqua, alia anatomica. Diximus, neque id quidem absque magna specie veri repetemus, omnino cartilaginem quidem scutiformem

n p. 35. 36. 37.

o p. 36.

p p. 474.

q p. 35. 36. 37.

r p. 39. 40.

s Non omnes academicos *Ferrenii* experimentis testimonium dedisse *Lettres sur le nouveau système de la voix* p. 34.

antrorsum proferri, sed cum toto larynge & cum obsequente cartilagine anulari *t*, neque adeo, in eo motu, ligamenta glottidis tendi. Utique quidem dum elevatur larynx, tendi ligamenta, sed una glottidem arctari *v*, eamque causam esse soni acutioris additur. Neque ligamenta glottidis libera esse, quæ tremere possint *x*, sed ita velari, ut oscillationes sonoræ a circumjectis aliis corporis partibus impediuntur. Adeo parum necesse esse, ut vibrent ligamenta glottidis, ut in avibus, quibus cartilagines pro chordis sunt *y*, & in organo, plumbeave aut chartea *z* glottide, aut cerea, variati tamen toni obtineantur. Sed neque tam brevem in varietate longitudinis quasi *scalam* sufficere producendæ admirabili sonorum *a* varietati parem. In experimentis *Ferrenianis*, quando imposito stilo ligamenta comprimuntur, nunquam accurate octavam, quintam, tertiam, toni prioris produci *b*, sed alium temere elevatum sonum; aut nihil quidquam mutari, si stilus, quo urgetur ligamentum, valde tenuis fuerit *c*. Ejus vero, quæ alias percipitur, mutationis causam esse in arctata glottide *d*. Denique, absque ulla suspitione tensionis chordarum sonorarum, in sibilo alios & alios sonos, a sola angustia, aut a latitudine intervalli labiorum produci *e*, nihil

t p. 31.*v* p. 31. 32.*x* p. 39.*y* p. 42.*z* p. 39.*a* p. 35. 36.*b* p. 40.*c* Ibid.*d* p. 41.*e* p. 43. Non intelligo, quod hic respondet *Montagnat éclairciss.* p. 92.

vero intercedere , quin perinde glottidis variata latitudo sonos varios efficiat. *f.*

Alii alia objecerunt *g.*, quæ Cl. viris valida visa sunt *h.* , aut certe eorum adfensum *i.* suspenderunt , uti neque ego pronunciare sustinui , cum minus opusculum physiologicum ederem *k.*

Videtur certe , si in tremoribus elasticis ligamentorum glottidis causa vocis , inque tensione majori , acutæ vocis causa est , adolescentibus & feminis vocem graviolem potius , quam acutiorlem esse debere. Nam viris elastica magis , adque oscillandum apta natura est , & in ossibus , & in cartilaginibus & in omni fibrarum genere. Optime vero consentit , a latiori glottide virorum , graviolem vocem oriri. Neque huic objectioni respondetur , dum longitudo laryngis virilis citatur *m.* , cum ea non adeo perpetua sit , & majoris staturæ femina minori viro facile æqualem laryngem possit habere , multaque minuta animalia sint , quibus gravior multo , quam maximis vox sit , ut ex rana patet , quam cum multo majoribus avibus compares. Sed etiam eunuchis acuta vox est , quam æquum esset ex hypothese graviorlem esse , si omnino a pinguedine circa laryngem effusa , vocis in eunuchis acumen nascitur. Adeps certe fibram animaleml relaxat *n.* Neque , fateor , mihi de instrumento satis liquet ; quo ligamenta glottidis tendantur , aut

f Ibid.

g Brouzet de l'éducation des enfans p. 352. 353.

h Vogel de larynge.

i Schreiber almagest.

k In primis lineis n. 329.

m p. 222.

n Schreiber l. c. p. 354. 355.

quo ab arytenoideis cartilaginibus & anular cutiformis cartilago abducatur. Arctari vero glottidem, & aliunde certum est, & causas habet conspicuas o.

§. X. Respondetur ad objectiones.

Contra ea, quæ a J. Exuperio Bertino, aut ab amicis ejus in Ferrenii inventa dicta fuerant, acriter respondit Cl. Montagnat p. Pleraque eadem repetit, quæ protulerat Cl. Ferrein, ut vera esse, & testes habere dignissimos, & etiam a seipso iterata fuisse, passim repetat, & frustra pro absurdis refutari, quæ vere fiant. Glottides etiam avium cartilagineas negat esse q, in eo nimius r.

Aliqua, ab instrumento musices sumpta argumenta, ait veræ ejus fabricæ repugnare s.

Verum utcunque aliqua in nova vocis theoria nondum satis plana sunt, sufficit tamen, experimentis verè constare, glottidis amplitudinem tonos non mutare, tensionem vero ligamentorum variam mutare utique. Quamprimum enim phænomenon vere nostris sensibus confirmatur, nihil adtinet ostendisse, nos causas modumque non intelligere, quoniam fiat, aut alia, remotiora, argumenta produxisse, quæ non possint cum

o p. 253.

p *Eclaircissement en forme de lettre à M. B. 1746. Lettre à l'Abbé des F. ib.*

q *Eclairciss. p. 69.*

r Avium glottides cartilagineæ Casserius p. 97. Fabricius L. I. c. 2. p. 85. neque aliter vidi.

s p. 91.

phænomeno consentire. Avibus secundus larynx subvenire potest, quem etiam in minutis aviculis reperio, isque larynx tremulis potius & vibrantibus laminis membranaceis constat, quam foraminibus, rimisve *t*. Neque defunt aliæ adnotationes, quæ apprime cum *Ferrenianis* conveniunt. Vox gravis & rauca, in homine fuit, cui ligamenta glottidis ab angina relaxata fuerant *v*. Contra in gravissima angina, cum inflammatione conjuncta, contentis adeo ligamentis, vox acuta & stridula *x*. In eximia cantatrice incisa cartilagines glottidis *y* rigidiores & subtiliores fuerunt, ut ex pari naturæ analogia liceat arguere, etiam ligamenta magis tensa fuisse. Pinguetudo potius gravem & raucam vocem facit *z*, eaque ex causa etiam argentea vox puellarum gravior redditur, quando per ætatem nunc obefiores sunt. Solis tremoribus passim ab insectis soni redduntur, ut in cicadis, membrana plicata alterne in tympanum depressa & vicissim elevata *a*. Intus in larynge equi, cujus vastissima & penetrabilis vox est, membrana tensa & tremula reperitur *b*.

Pro *Ferrenio* etiam *Ill. Camperus* sentit, tantum ut vocem artificialem imperfectam & fuscam esse moneat, qualem nunquam non audiui.

v Swieten Comment. T. II. p. 659.

x De Borden recherches sur les glandes. p. 104.

y Taglini lett. sopra dilettevoli argom. p. 106.

z Walther de obes. & voracib. p. 6.

a Casser. T. 21. f. 2. Reaumur Memoire pour servir à l'histoire des insectes T. V. p. 168. Laurentius Acad. Bonon. Comment.

T. I. p. 79.

b Herissant l. c. p. 283.

T. I. A.

§. XI. *Instrumentum vocis auxiliare.*

Ex folis adeo brevibus ligamentis, omnes in tonis, in gratia, in robore vocis varietates fieri, eo minus probabile videtur, quo infinita magis tonorum est varietas, quam homo aut avicula multo etiam minor, exprimere novit *c.*

Nam & homo, præter suam vocem, & ejus varietates, omnium sæpe animalium *d* voces, & cantus *e* imitari didicit, & virginica avis *f* omnes volucrum cantus cum ridicula quadam adfectione novit reddere, & sturni variorum animalium voces sæpe imitantur *g.*

Nunc quidem humanæ vocis organum multa habet, quæ in nullo organo adpareat, neque potest cum fistula comparari, quod *Ferrenius h* confirmavit, neque cum organo musico, cujus in tonis variis reddendis flexilis facilitas a variata longitudine tuborum pendeat, qui in homine est unicus. Sed neque fides, aut monochordon, utrumque organum *Ferrenianæ* sententiæ propius, ullo modo ad fertilitatem in producendis tonis diversissimis accedunt, quæ in homine est. Aliquas tamen adeo causas esse probabile fit, quæ præter glottidis ligamenta ad mutandam vocem conferant.

c. *Dodart Memoir. de 1700. p. 268. seqq.*

d. *Cardan variet. rer. p. 295.*

e. *Lusciniarum aliarumque avicularum cantus Taglini l.c. p. 119. Schelhammer l. c. p. 4.*

f. *Mockingbird Catesby natur. hist. of Carolin. T. I. p. 27.*

g. *Severin Zootom. Democrit. p. 28. 29.*

h. *p. 414. 415.*

Si in avibus aquaticis tremulæ membranæ bronchi sonos prius variant, quam ad glottidem i aer venit, qui eos sonos vehit, minime repugnat, quin in linguæ cum palato rima, quin in resonituario, quin in palatis varietate causæ sint, quæ sonum de glottide expulsum varie contemperent. Neque dubitare finit vel sibili exemplum, in quo glottis soni quasi elementum ministrat, arctior vero, aut minus arcta labiorum rima, acumen addit aut aufert, aut in alio simili exemplo rima, quæ linguam inter & palatum osseum intercipitur. Hæc ideo moneo, quia Ill. viri omnes omnino præter glottidem corporis humani partes a vocis variandæ potestate removerunt.

§. XII. Vocis robur.

Ad robur vocis requiritur momentum magnum aeris *k* per glottidem elisi, & tremor validus ligamentorum. Primum adeo amplius pulmo, multoque aere plenus huc facit. Laterum vastitatem in voce fortissima generanda veteres minime ignorarunt, & subtiliter adnotavit *Galenus l*, in animalibus vocalibus, appendices diaphragmatis majores esse & longius descendere, quam in oligophonis. Et a pastu male declamatur & difficilior *m*, quod plenius abdomen descensuro diaphragmati resistat, neque pariter finat pectoris

i Maloet diff. cit. p. 10. Vo- p. 74. 1700. p. 266. &c.
cem faciunt clangoriam
k Dodart *Memoir. de* 1706, *l* *Administr. anat. L. VIII. c. I.*
m Hales hæmastat. p. 88.

caveam expandi. Hinc quibus pectus minus dilatabile, ii ad cantum juvantur magnis inspirationibus *n*. Hinc etiam consumpto pulmone vox in phthificis o humillima, quam vix exaudias. Hinc avibus pro corporis mole fortior vox, & miri in lusciniâ roboris, quod avibus non in pulmonis unice cellulis, sed in totius late abdominis pectorisque cellulis aer sit *p*.

Ita pariter amplior aspera arteria *q*, quæ multum reddat aeris, multum ad vocis vires conferre videtur. Leoni vox magna, & longe terribilis; sed aspera arteria, quam bovi tanto vastiori bestię, amplior *r*. Ardeę stellaris rugitus bubuli similis, & duo bronchi amplissimi *s*. Urso marino aspera arteria valde capax *t*.

Ad vocis robur aerem in avibus omnes fere in caveas etiam ossium receptum facere posse, Cl. *J. Hunter*, quod in serino sit manifestissimum *v*.

Deinde ut quantitas aeris, ita velocitas, qua expellitur, multum ad robur facit *x*. Id enim alterum momenti elementum est.

Quare glottis etiam arctata vim vocis auget *y*. Cum enim multa vis aeris per arctius nunc osculum eadem, aut majori, vi contracti abdominis expellatur, celerius proculdubio per id fretum erumpit. Huc arctissimę glottides luscii-

n Berard p. 43.

o Conf. Schelhammer p. 37.

p p. 128.

q Ammann p. 30.

r Borrich. de hermet. Ægypt. sapient. p. 250. act. Hafniens. vol. 1. p. 46.

s Aldrovand. ornithol. L. XX.

p. 406.

t Comm. nov. Acad. Petrop.

T. II. p. 343.

v Phil. Trans. n. LXIV.

x Ferrein p. 418. Berard l. c.

p. 43.

y Ferrein p. 418.

niarum aliorumque avicularum, quarum glottides subtili rima constant.

Hinc facile intelligitur, quare idem tonus & fortis esse possit *z*, & vicissim debilis. Altitudo enim toni unice a vibrationum numero pendet. Sed numerus idem potest debiliū esse vibrationum & fortium.

Altera causa est a resonitu. Uti enim omnes soni a percussione corporum duriorum intenduntur, & per repetitionem Echus cum primo sono confusæ invalescunt, ita etiam humana vox ex tremore elasticarum partium corporis augetur, quas in oscillationes ciet.

Multa vero sunt, quæ tremunt, & vibrationes suas elasticas sono primum producto addunt. Aspera arteria tremit, ut etiam in pectore anima, ad ea adtenta, quæ in broncho geruntur, oscillationes percipiat. Hæc iterum causa est, quare in casuario parvæ vocis ave, mollis *a*, in ulula, cujus stridor molestus sit, magis cartilaginea *b*, in pavone japonico *c*, in graculo, & linaria penitus ossea *d* sit, quibus animalibus robusta vox est. Gravis est in lacerta vocali Tockay, cujus in aspera arteria cartilagineæ integræ sunt *e*. Psittaci, gravi & humana voce clamantis, animalis anuli in broncho fere continui, bronchus ipse brevis *f*. Gravem & clangosam vocem gruis plicæ tres asperæ arteriæ

z Conf. Dodart Mem. de 1700. p. 260. 266.

a Birch. T. III. p. 484.

b Grew l. c.

c Birch. l. c. Grew l. c.

d Grew ibid.

e Observat. des Jesuit. p. 53.

f Aldrovand. T. I. p. 646.

fecerint, quæ in propria sterni carne repetito contra se ipsam inflectitur qualis etiam in cygno est sylvatico.

Alter in larynge *g* est resonitus, qui potissimum in cantu tremit. An inde etiam mulicæ feminæ, quod molliores *h* aliquanto & magis elasticæ cartilagines laryngis melius tremant, in viro duriores difficilius in oscillationes cieantur?

Aliud ad resonitum organum ventriculorum laryngis est, quantum quidem a mucosa particula sperari potest. Stringi in acutis sonis a musculo thyreoarytænoideo, laxari in gravibus *i*, summæ auctoritatis incisior suspicatus est. Neque fere de resonitu ventriculorum sinunt dubitare, quæ ex animalium anatome adduximus. Vocalibus enim bestiis evidentiores sunt, evidentissimi porco *k*. In asino, alio ad nauseam usque vocali animalis genere, proprium in cartilagine thyreoidea tympanum est, præter ventriculos *l*.

Quin denique ad sonum efficiendum ventriculorum vis concurret, dubitari nequit, cum eorum resonitus in larynge manifesto, etiam a nobis percipiatur, quando inflatus per bronchum aer vocem animalis imitatur, neque eadem vox repræsentatur, cuique bestię suæ, quando ventriculos incisior removit *m*. Etiam in ranis canoris faccus est, in quem aspera arteria rima patet, qui idem per duas alias rimas aerem reddit *n*.

g Schelhammer p. 28.

h Ammann p. 31.

i Morgagn. *Advers.* I. p. 18.

k Herissant p. 288. T. 3.

Runge p. 21.

l Herissant p. 285. T. 2, tum in mulo p. 287.

m Herissant p. 289. Sufurrum

in porcis exaudiiit Runge l. c.

n Roessel vom Laubfrosche.

Quarta sedes resonitus in ore est, & potissimum in palato osseo, fornicato, duroque. Dudum monuit *Santorinus n**, etiam ideo vocem feminarum debiliorem esse, quod palatum, quam viri, minus cavum nactæ sint.

Proxima narium est cavea, quæ pariter ut os, etiam sola, ad cantum edendum apta est. Neque solum obstructæ nares literas aliquas corrumpunt, quarum sonum per eam viam edere oportet, sed etiam ingratam, fuscamque vocem faciunt. Quod enim per nares loqui aiunt, omnino est per solam oris caveam loqui, postquam nares parum nunc perviæ sunt o. Magis vero resonare frontales sinus & ethmoideos, minus maxillares, magis mucos plenos, id quidem credibile videtur.

Aliquanto plus huic narium canali tribuit Cl. olim *Dodartus*, neque ab ejus resonitu solo gratiam aliquam vocis unice derivat. Nam & brevem & longum fieri canalem, post *Fabricii* conjecturas, & ad tonos acutos se accommodare docet, aucta longitudine p., & ad graves diminuta. Augeri vero longitudinem credit, dum larynx detrahitur, minui dum elevatur. Contra asperam arteriam a detracto larynge brevior fieri, & latior, longior & angustior, in voce acutiori q. Verum hanc quidem aut asperæ arteriæ, aut narium utilitatem non

*n** *Observ. anat.* p. 167. de 1700. p. 240. 1705. p. 138.
J. Eusebii Instit. rei med. p. 1700. p. 251.
n. 67. prælect. p. 187. 38. q p. 252.
Amman p. 34. Dodart Mem.

videntur permittere , quæ de tonorum varietate ex folis ligamentorum glottidis tremoribus oriunda dicta sunt *r*.

Hæ conjunctæ vires vocem intendunt , ut fortis & gravis cantus fornices templorum tremefaciant *s*.

§. XIII. *Alia vocis organa.*

Quin aliquæ non litteræ solæ , sed etiam voces , per guttur edantur , & quin earum modulatio aliqua per palatum mobile , aut propius ad linguam adductum , aut vicissim remotius , exerceatur , dubium quidem non videtur , & id videtur esse illud peculiare vocis organum , quod se descripturum promisit *Ferrenius t* , nondum tamen descripsit , aliis non dubie operibus intentus.

Lingua ad palatum adplicata *v* , ut modulatorem se inter & palatum viam , modo angustiorē relinquat , sonos edit acutiores , sed modulabiles , quos folio arboris intra os adsumto sunt , qui altiores , & gratiores reddere norint.

Labiorum contractorum *x* ad peculiarem vocem reddendam aptitudo est , quæ , ob rimæ ut videtur angustiorē , vocisque expulsæ robur in nonnullis mortalibus acutissima est , ut audientium pene aures findat , quale quid de incolis

r p. 335. seq.

s *Dodart* 1700. p. 256.

t 1741. p. 430.

v *Glotte linguale* *Dodart* 1707. p. 69.

x *Glotte labiale* *EjUSD.* *ibid.* p. 68.

Canariensium insularum legimus. Eadem vox modulationem & varietatem admittit, uti alia & alia rimæ labiorum laxitas & latitudo fuerit.

Alia labia, sphinctere munita *y*, aut acutum sonum aut gravem reddere, uti ostium angustius fuerit latiusve, ridiculam adnotationem vocaverit, qui memor non fuerit, naturam semper seriam esse.

§. XIV. *Vocis communia.*

In unum sermonem contractis, quæ hætenus de voce demonstrata proposuimus, adparet, viribus expirationis *z*, alias recens, aerem ex pulmone, per bronchum *a*, & glottidem, varia & copia & celeritate, expelli. Ita sonum nasci, aut fortiolem, aut debiliolem *b*. Eum sonum per glottidis rimam transire, ejusque ligamenta in oscillationes *c* ciere, numerosiores alias in acuta voce, pauciores alias in gravi. Ita definitam vocem per os naresque, aut per alterutram caveam solam, prodire.

Nulla piscium frigidorum vox est, quia pulmo nullus, neque aeris receptaculum, quem exprimant, neque glottis, quæ tremat. Qui pisces vocales dicti fuerunt *c*^{*}, in iis aqua expulsa *d*,

y Lettres sur la form. p. 44. of english songbirds P. 85. &

z In cantu abdomen tumet Fabricius L. II. c. 6.

& induratur Winslow Memoir. *b* p. 336.

de 1738. *c* p. 325.

a Luscinia canenti, & vociferanti anseri guttur tremit hist. *c*^{*} Piscis Caper grunnit Plinius L. XI. c. 5.

d Suidas L. III. p. 135.

aut aer de ore per labia expressus *e*, aut branchiarum adfrictio *f*, aut alia causa *g* sonum a vera voce diversum producit. Calidi utique sanguinis pisces, etiam fortiter clamant, delphinus *h*, balæna jupiter dicta *i*, aliæ balænae, monoceros *k*.

Quare ex prioribus multa nunc intelliguntur, de quibus quæri potest. Primumque, cum in acutis tonis elevato larynge, etsi alia acutæ vocis causa est *l*, tamen *m* certo glottis arctior reddatur, adparet, quomodo nocere possint, non solum dum animæ vires franguntur *n*, aut vox debilitata *o* deficit *p*, aut laryngis cartilagine divelluntur *q* & bronchocele supervenit *r*: sed omnino aut pulmo vitiatur, & sanguis rejicitur *s*, & phthisis *t* demum consequitur, aut demum vertigo supervenit *v*, morsve subita, uti quidem in lusciniæ *x*, magna cum contentione æmulam cantu superatura, dudum adnotatum est.

Nempe ad robur vocis multus aer pectore recipitur

e Huc anguillarum sibilus
Klein *Versuche einer Gesellschaft*
von Dantzig p. 120.

f *Radsczynski hist. nat. Pol.*
T. II. p. 249. de scorpio marino.

g *Aristoteles* ad cartilagine
hist. L. 4. c. 9.

h *Plin. L. 9. c. 8.*

i *Anderson* p. 198.

k *Klein l. c. p. 113.*

l p. 337.

m p. 331.

n In concionatoribus *Am-*

mann p. 32. 33.

o *Dodart* 1706. p. 140. in
voce naturali altiori fausset.

p *Anmann* p. 31. *Dodart*
etiam 1707. p. 75.

q *Bartholinus* de pulm. p. 59.

r *Idem* ibid.

s In notissimo *Crassi* oratoris
exemplo apud *Ciceronem*.

t *Bartholinus* l. c.

v *Ger. v. Swieten T. III.*
p. 271.

x *Plinius* L. X. c. 129.

recipitur *y* : ad acumen glottis arcta tenetur *z* : ad diuturnitatem cantus diuturna pariter exspiratio *a* poscitur : ita per angustum ostium aer multus ægre transit , fiunt omnia phænomena inspirationis longius persistentis *b* , sanguis congeritur in pulmonem *c* , venas jugulares *d* , cerebrum *e*. Omnia vero ista graviora erunt , si vir peracutam vocem edere laboraverit. Multo plus enim viro conandum est , ut glottidem arctet , quam latam habet. Vox autem nulla omnino prodit , si quando glottis adeo arctata fuerit , ut rima nulla supersit.

Iterum intelligitur quare , qui magna contentione loquantur , possint in femininam vocem delabi , quod *Gracchi* vitium fuit , a quo proprius servus dominum fistula revocabat *f*.

Iterum , quicumque graviorem sonum volet edere , quam fabrica sui laryngis admittit , eum vox deficiet *g* , flatusque prodibit non sonorus. Adeo enim laxabit ligamenta glottidis , ut ne tremant quidem , rimam vero ita dilatabit , ut ratio luminis bronchi ad lumen rimæ nimis parva sit , & aeris iter per rimam non ea sit celeritate , quæ ad ligamenta in oscillationem cienda sufficiat.

Cur adeo egeant cantantes irroratione , ut & frequenter bibant *h* , & muci aliqua particula amissa *i* , non possint in canendo persistere.

y p. 345.

z p. 341.

a p. 221. seqq.

b p. 116. seqq.

c p. 118.

d p. 45. 118.

Tom. VII.

e p. 120.

f In vita a *Plutarcho* scripta.

g *Dodart* 1707. p. 139.

h *Schurig* *siatograph*.

i *Boerhaave* *Prælect.* T. V.

P. I. p. 231.

Membranæ nostræ ab aere siccantur, & siccæ dolent, minusque flexiles ad officia sua ineptæ fiunt. Sed in cantu, voceque contentiosa, aer celerius, & majori vi, per asperam arteriam transit, siccatur adeo magis totum, quem percurrit, vocis canalem *k*.

§. XV. Vocis discrimina.

Ab animalium varietate.

Animalia omnia, avesque, toto sæpe charactere sibi simillimæ, vocem tamen suam habent quæque, ex qua exaudita facile genus distinguas. Quare merito & sua homini voxerit, etsi esse negavit *Schelhammer* *l*, quod puer inter urfos educatus eorum animalium barritum, alius qui inter oves adoleverat, balatum ovium expresserit *m*, uti quidem vetusta illa, pro Phrygiarum causa producta, vox *bek* *n* unice ovium vocem videtur æmulata esse.

Verum etsi hominiorum animalium voces discit imitari, etsi aviculæ tiliarum sonum satis apte exprimunt, aut alias aves, cum quibus educantur, discunt imitari, non ideo aut pittaci, aut sturni, aut aliæ aves propria voce carent;

k A cantu raucedo quinque annorum & mutitas *J. Gotl. Scheid.* etiam gutture ampliori, ut balaret.

l *l. c.* p. 20. Nondum vocalem fuisse anno decimo *Connor hist. of Poland. L. I. p. 342.* *n* Ad panis significationem detraxerunt. *Suidas. p. 428.* Habet etiam *Herodotus & Claudinus in Eutrop. L. 2.*

m *Tulpius L. IV. c. 10.*

neque caret homo. Alia enim organa alias vocis adfectiones producunt, neque simia, quæ ad hominem proxime accedat, sonum edit similem humani. Ipsos inter homines cuique sua vox est, quam etiam animalia domestica facile distinguunt.

§. XVI. *Ab animi motu.*

Omnium communissima causa vocis edendæ est, qua mas feminam appellat. Venus enim ipsa infecta vocalia reddit. Uti enim ranæ mares *p*, ita solæ cicadæ mares *q* canunt, & locustæ *r*, & alia infecta feminas suo stridore adliciunt.

Inde, non quidem in classe insectorum, sed in avibus, & quadrupedibus, voces sunt, quæ terrorem, quæ iram, quæ pullorum caritatem, & blandientium matrum amorem, quæ gaudium *s*, quæ dolorem exprimunt, quæ sodales convocant, quibus aliqua non satis nobis percepta animi sensa gregalia animalia sui similibus videntur aperire. Ejusmodi voces etiam mutis hominibus, aut loqui non doctis, communes sunt, & significationes vocis diversas irato in homine aut læto, aut advocante, & largituro animalia dignoscunt.

p Roesel de rana vocali viridi *Swammerdam bibl. p. 504.*
Laubfrosch. Puber & ad ven- *r* *Swammerdam bloodlooze*
 rem aptus mas demum canit. *dierkens p. 94.*
q Reaumur, Laurentius l. c. *s* Conf. Cardanum de ranis
 Animalia canora mares sunt p. 183.

§. XVII. *Cantus.*

Amoris vox & lætitiæ *cantus est*, avibus proprius & homini *t*; cujus naturam quidem literarum exprimendarum necessitas non ingreditur, varietas autem, & a tonis acutioribus in graviores, & vicissim a gravioribus in acutiores transitus, perpetuus est. In universum etiam acutior in cantu, quam in loquela vox est. Qui enim canunt, etiam dum gravissimos edunt tonos, sonum quarta tamen, aut quinta, a sono diversum reddunt, qui loquentibus familiaris est *v*.

Summa cantus a loquela diversitas in undulationibus est, quas ut edat manifestiores, larynx non quiescit, sed inter vires elevantes & depri- mentes in æquilibrio quasi sustinetur *x*. Facile autem hanc librationem quisque in se ipso perci- piet, si, dum canit, volet digitum laryngi admove- re. Quare, dum multis musculis eget, fatigat cantus, & male sustinetur *y*. Resonitum requirere, tenfasque fibras, vel excitatum alias exemplum cantatricis suadet, cujus in larynge cartilaginee rigidiores & subtiliores fuerunt *z*.

Quæ tonorum successiones, & quæ symphonie nobis gratæ sint, alias rectius dicetur *a*. Nunc unice addimus, ad cantum potissimum egregiam

t In luscinia mare sola larynx intumescit & laborat *Englisch Songbirds* p. 85. Querquedula mas habet in broncho organum labyrinthi simile, non femina *Albin. of birds* T. I, n. 100.

v *Ammann* p. 24.

x *Dodart Memoire de 1706.* p. 144. 145.

y p. 147.

z *Taglini* l. c. p. 106.

a *L. de auditu.*

vim auditus requiri, quæ minimis a vitiis offendatur; deinde perfectam symmetriam organorum, per quæ vox editur, ligamenta adeo laryngis æqualiter tensa *b*, æquam vim musculorum utriusque lateris, cartilagines laryngis utrinque æquales, (nam hilum præter medium poni non raro vidi), & ventriculos *c* æque altos, qui subinde inæquales visi sunt, & ossis hyoidis æqualia cornua *d*, & alia id genus. Quibus harum dotium aliqua deest, ii nunquam liquide canent: neque poterunt eos tonos producere, quos destinant edere. Utcunque enim alterum laryngis latus ad certum tonum comparaverint, latus alterum non consonabit *e* harmonice, & alienum semper admiscebit tonum.

Solet hic quæri, quare vox hætenus gracilis & acuta puerorum, sub pubertatis *f* tempora fusca & inæqualis fiat; deinde gravis, quando pubertatis tempus superarunt *g*. Respondet Clar. noster amicus, quod fibræ glottidis, perfecto nunc corporis incremento crassescant, ita sonent gravius: non tamen una mutantur omnes, neque pariter, ita vero fiat ut falsa & fusca fiat vox *h*, cum aliæ acutiorem sonum reddant, graviolem aliæ.

Aliud vitium est *falsæ* vocis, quæ fit, dum

b Dodart *Memoire de* 1706. p. 142.

c Morgagn, *Adv. V.* p. 67.

d Inæqualia habet Duvernoi *Comm. Acad. Petrop.* T. VII. p. 216.

e p. 444. 445.

f Aristoteles *hist. anim.* L. VII. c. 1. Tiffot *de la mue de la voix* p. 159.

g Venerem addit Aristoteles. Post quatuor vel quinque menses Tiffot l. c.

h Tiffot l. c. p. 168. seqq.

supra naturalem scalam vocis acumen sursum urgemus *i.* Tunc enim tres, quatuorve, quos addimus, toni, aut aliquando etiam plures, vix limpidi prodeunt: eos incertiores & vitiosos videtur non adeo narium canalis reddere, quo recipiuntur, quam tensio nimia chordarum glottidis, quæ argutum denique, ut omnes chordæ, tonum reddunt, quando supra modum tenduntur.

Admirabiles illi musices in excitandis animi passionibus effectus facilem causam habent. Cuique, uti modo diximus, animæ adfectui sua vox est. Eam dum cantus apte imitatur, oritur per *idearum adfociationem* is idem adfectus, cujus symbolica vox exauditur. Pari modo, ut conspecta tabula lasciva, aut odor demum peculiaris ad venerem & homines instigat, & demum animalia. Qui contra cantus nullius adfectus animi symbolum imitantur, iidem frigidi, nos non movent.

S E C T I O I V.

L O Q U E L A.

§. I.

PULCHERRIMA est, quam nunc proponimus speculatio, & eximii exempli, quantum sollicita phænomenorum contemplatio, & in

eruenta rerum natura possit, & in vitiorum corporis humani correctione. Nam ex sola loquentis hominis curiosa observatione, hactenus profecimus, ut raro exemplo causas enarrare possimus, quibus cujusque literæ pronuntiatio perficitur, & demum homines corrigere didicerimus, qui vel aliquas literas male exprimunt, aut omnino loquendi facultate a prima ætate destituti vixerunt.

Si litera sonus est in simpliciores indivisibilis *k*, erit loquela vocis in literas & vocabula ex literis composita formatio. Verum si toni varii & ipsi in simpliciores resolvi nequeunt, erit loquela potius vocis ex glottide expulsæ, a lingua, ore, naribusque in ejusmodi elementa formatio, quibus animæ sensa cum aliis mortalibus *l* communicamus. Homo adeo solus vero sensu loquitur, etsi aliqua animalia, lingua lata *m*, & humanæ similiori prædita, literas vocesque nonnullas imitantur, tum aves, tum canes denique *n*, quorum maxillam magister artificiose motitabat.

Sed animalia sensa animi sui his literis non exprimunt. Homini vero adeo naturale est loqui, ut etiam absque magistro, inter solitarios pueros, nova lingua nata sit *o*. Simia clamat, ad pueri modum, & linguam & uvulam habet humanæ similem, neque tamen loquitur *p*.

k Wallis de loquel. p. 2.

l Conf. Ammann p. 18.

m Aristoteles hist. anim. L. II.

c. 12. Pfittacus Aldrovand. T. I. p. 646.

n Ill. Commentator Heisteri Edit I. p. 392. Hist. de l'Acad.

des sciences 1715. p. 3. Bradley philos. account of nature p. 18.

82. Fritsch seltsame Handel p. 325.

o Valentin diss. Epist. IX. p. 165. 166. Salmuth L. II. obs. 56.

p Tyson anatom. of a pygmy p. 51. 52. Buffon T. II. Addit

idem, non loqui, quia non cogitant.

§. II. *Literæ vocales.*

Literæ , quæ loquelæ elementa sunt , aliæ sunt vocales , consonantes aliæ. Vocales unice apertura oris majori & minori formantur *q* , dum vox efflatur , neque hic lingua ad labia aut ad aliam partem adhicitur *r*. In ipso risu vocales pronunciantur , & in animalium vocibus sonus vocalium æmulus passim editur *s*.

Etsi linguas paucas calleo , vocales tamen non crediderim his octo , quas recensebo , plures esse. Eas octo vocales *claras* , sive longas reperio esse , (*a* , *eta* , *e*) clarum *epsilon* græcorum , (*i* . *o* . *u* . *ô* . *ii* .) *t*. Totidem vero , quot veræ vocales , etiam aliæ furdæ , brevesque sunt , quæ fere in gutture pronuntiantur.

Germanorum fere literis utor , ea enim lingua constantiores literis suis valores adsignat , cum aliæ linguæ cum eadem litera , aut certe cum diphthongis ex duabus vocalibus compositis , absque ulla manifesta ratione , alios conjungant sonos , quam quidem ex simplici coalitu prodeunt. Nihil enim est , cur (*o*) apud Anglos sæpe (*a*) sonet , cur (*a*) sæpe (*eta*) , cur *o o* potius (*u*) , cur (*au*) Gallorum (*o*) , cur (*eu*) ejusdem gentis (*ô*) proferatur. Eadem uniformis pronun-

q Ammann p. 62.

633.

r Holder *Elements of speech* p. 59. *Fabricius de locutione* p. 43. *s a & o* in viro , *i* in femina & *e* , *Hamberger physiol.* p. 632.

t Novem etiam facit *Wallis* p. 4. octo *Ammannus* p. 62. seqq. similes nostris. Duodecim *D. Maloet* p. 17. Sed vere octo sunt.

ciatio Germanorum *v* fecit , ut *Ammannus* non alia lingua ad furdos mutosque instruendos usus sit : & cur ea in arte liquidius , quam Angli scripserit , faciliusque. Difficultatem certe ex Anglicæ linguæ mala pronuntiatione *Guilielmus Holder v** non diffimulavit. Italis paucae etiam & purae sunt , sed destituuntur vocalibus (*ö* & *ü*).

Plures vocales ignoro , neque duo illa (*u*) *Holderi* receperim *x* , quorum alterum diphthongus est (*iu*), neque Cl. *Maloet* (*ain*) finale pro quatuor vocalibus numeraverim , quæ consona sit , cum quatuor vocalibus conjuncta *y*. (*Ue*) Helvetiorum diphthongus est , in quo (*e* & *ü*) distinguitur.

Pauciores justo fuerint , si quinque illas vulgares & solas numeraveris , neque enim (*ü* , *ö* , *ä*) & furdæ vocales diphthongi sunt *a*. *Mistas* esse , ut *mistas* vocat *Ammannus* ; minime repugno.

§. III. *Generatio literarum.*

Literæ vocales vario a motu linguæ potissimum nascuntur , eas ad propriæ vocis repetitam & frequentem observationem expono , cum qua scriptorum melioris notæ adnotationes comparavi , *Ammanni* imprimis , & in aliquibus exemplis *Holderi*.

Inter eas vocales simplicissima (*a*) fit voce

v *Ammann* p. 56. 61.

*v** p. 108. 109.

x p. 87. 88.

y p. 18.

z *Cordemoi de loquela* p. 41.

a Consentit Cl. *Ammann* p. 57.
de *oe* , *ae* , *ui*.

ex patulo ore emissa, labiis diductis *b*, lingua plerumque in medio ore suspenſa, & explanata, etſi etiam lingua ad gingivas depreſſa, & dentibus admota, pronunciari poſſit. Primas (*a* & *o*) didicit pronunciare, qui poſt aphoniam vocis uſum recuperaverat *c*. Primas fere infans pronunciat *d*, cum facillimis conſonantium compoſitas.

E pingue, quale didici *Saegol* pronunciare, & *paire* gallice enunciatur, & anglice *welſh*, germanice optime (*ä*) ſcribitur, qui character mediam inter (*a* & *e*) naturam recte exprimit. In ea vocali litera multo anguſtior oris canalis eſt. Pars enim linguæ poſterior, ejusque latera, aut elewantur, aut omnino ad dentes ſuperiores adducuntur, & apex ab iis dentibus modice diſtat *e*.

In (*e*) limpido, *epſilon* Græcorum, quale eſt in terminatione (*té*) gallorum: & in (*eh*) germanorum, linguæ medium dorſum elevatur, & proxima latera dentibus molaribus poſtremis admoventur, apex autem ad exiguam a dentibus prioribus diſtantiā ſuſtinetur. Labia præterea multo minus diducuntur *f*, quam in (*a*).

In (*i*) Germanorum, Gallorum, & Italorum viâ vocis palatum inter & linguam etiam, quam in (*e*) anguſtior eſt *g*. Nam & labia minus

h Wallis p. 4. Helmontius p. 90. in *patach*. Cordemoi p. 41. Holder p. 85. Ammann p. 63. Raphael.

c Tulpius L. 1. c. Monconis l. p. 38.

d Buffon *hiſt. naturelle* T. II. p. 476.

e Wallis p. 6. Raphael, Holder p. 83.

f Ammann. p. 64. Raphael.

g Ammann p. 65.

diducuntur , & latera linguæ dentes molarium priores contingunt *h* , & apex omnino curvatur , & elevatur , ut modice a dentibus prioribus distet.

In (*o*) Gallorum , Germanorum , & Italarum labia arctius adducuntur *i* , quam in (*a*) , & linguæ major pars anterioribus & interioribus dentibus vicina est , fere ut in (*a*) , nam etiam aliter disponi potest.

In (*ö*) Helvetiorum , Suecorum , Saxonum inferiorum , (*eu*) Gallorum , angustior quam in (*o*) labiorum rima est , lingua vero ut in (*e*) disponitur , lateribus ad dentes admotis , apice versus dentes superiores incurvato *k*.

In (*ii*) Saxonum inferiorum , & (*u*) Gallorum , labia magis quam in (*ö*) adducta sunt *l* , ut apertura oris omnium minima sit , latera vero linguæ dentibus admoventur , & linguæ apex inferioribus dentibus atque prioribus imminet. Et hæc ergo , & sodalis (*ö*) , habet labia ut in (*o*) , & (*u*) , dentes ut in (*e* & *i*).

U clarum , ut in *Uhr* , (*ou*) Gallorum , (*oo*) Anglorum , aliquanto propius labia adducta habet *m* quam in (*o*) linguam vero dentibus adplicatam , quæ in (*u*) furdo libera est. Potest autem aut apice ad dentes incisores inferiores admoveri , aut lateribus ad dentes superiores. Non admota lingua vix potest pronunciari.

Deinde possunt totidem vocales *surde* numerari , sive *breves* , quæ in gutture fere pronun-

h Conf. Holder p. 86.

i Ammann p. 66. Raphel.

k Raphel , Ammann p. 67.

l ibid.

m Raphel , Ammann. p. 66.

cianitur, larynge minime tremente, & paulum, sed minus, quam in vera vocali, elevato. Neque brevitate solum a vocalibus sui ordinis differunt, utcunque enim diu productæ furdæ manent & gutturales. Earum quidem (*a*) exauditur in germanico & anglico (*all*, *ball*,) in gallico *accent*, & id ab (*a*) aperto divisum habet, quod labiorum figura non indigeat, & iis utcunque dispositis perinde pronunciari possit, lingua, etiam utcunque disposita, plerumque tamen in medio ore suspensa.

Scheva, sive (*e*) femina Gallorum, Germanis & Anglis potissimum in terminatione *Sinder*, *Sinner* familiare, nullo pariter dentium labiorumve motu perficitur, & omni in situ labiorum & linguæ possibili efferri potest, lingua tamen plerumque paulo magis, quam in (*a*) furdo apice suo levatur. In ea vocali exprimenda larynx etiam parum adscendit, etsi adscendit tamen, neque tremit.

Omnino simile est (*i*) breve vel furdum, ut in Germanico *irren*; & (*o*) furdum in *Rotte*, & (*u*) breve quale est in Germanico *Bund*, *Sprung*, & in Gallica syllaba *on*. Habent utraque similitudinem aliquam veræ vocalis, labia tamen adductiora, & in (*u*) furdo lingua dentes non contingit, etsi elevata est. Similiter (*ü*), (*ö* & *ü*) furda in gutture formantur.

Ut possint in lingua Tamulica 13 diversæ vocales esse aut 16 in sanscritica id quidem non intelligo *m*^{*}.

m^{*} Anquetil. du Perron Voy.

§. IV. Consonantes Literæ.

Nescio an alia in lingua, aliæ præter nostras vocales reperiantur. De consonantibus certum est, alias & alias gentes plures habere paucioresve. Non sola enim (*r*) in Sinensium lingua & Mexicana desideratur, sed a Groenlandica *n* (*c*, *f*, & *d*) dicuntur abesse, a lingua Brasiliica (*f. l. s. z. r.*) o quod quidem nimium videtur. Sed neque Ephraimitæ (*sch*) pronunciare norant. Insulæ Taiti incolæ (*e. g. f. z.*) non pronuntiant. Irosekii (*b. f. m. & p.*)

Contra inter linguas Europæas Helveti & Hispani proprium habent (*ch*) gutturale : Angli (*th*), sive (*s*) blæsum : Malabri duas literas habent, quibus Europæi nullum proprium characterem adsignant, & alteram modo (*r*) scribunt, modo (*d h*) *p*.

Infinitas adeo esse posse non præter rem *Ammannus q*, etsi paucas tamen esse fatetur, quæ veræ diversæ sint *r*. Sunt tamen in lingua Sanscritica evidentissimæ literæ consonantes, quas numerant omnino 35. *r**. In Tamulica cui tantum 18. numerant, sunt tamen duæ Europæis ignotæ & sæpe a Danicis missionariis citatæ *r*** quare fit ut alii & alii Europæi eas suis litteris aliter exprimant, etiam ut alii (*d h*) scribant, alii (*r*).

n Egede *gamle Groenlands nye perustration* p. 94. *Script. Societ. Danic. T. II. p. 144.*
o *Montanus Americ. p. 367.*
p *Collaram fl. aut Colladham fl.*

q p. 53.
r p. 55.
*r** *Anquetil.*
*r*** *Idem.*

Consonantibus commune est, ab adlifu linguæ aut aliarum partium oris generari s.

Multis modis dividuntur. Alio enim modo partiuntur consonantes respectu spiritus non sonori *t*, ex quo formantur (*b. ch. f. sch. f. g. z.*) Gall. (*w. k. t. p. d. z. x.*) quæ novissimæ quidem compositæ sunt ex simplicibus.

Aliæ semivocales ex voce quidem per oris hiatum explosa formantur, non tamen perinde libero ore ut vocales, ut (*l, r, v* sive (*ain*) Hebræorum, (*n. & m.*).

Aliter ex organo dividuntur, per quod sonus transit. Tunc sunt nasales *x*, ne Hebræis quidem ignotæ, *orenasales Holderi y* (*m. n. ain*).

Deinde orales *semivocales* (*r & l.*) *z*.

Mutæ a (*f. z.*) Gallor. (*sch. j.*) Gallor. (*f. w. g.*)

Explosivæ (*b. p. d. th. k. g.*) Germ. *b*.

Iterum Hebræi ex organo, a quo finguntur, separarunt literas *gutturales*, (*a ain. th. m. g. ch.*) *Palatinas* (*t. s. d. n. l. r.*) & *labiales* (*o. u. m. f. p. b. w.*)

Sed præstiterit ire per singulas, earumque formationem exposuisse.

§. V. Consonantium formatio. *Surda* (*f.*) *mutæ*.

H sive adspiratio adeo simplex sonus est, ut vix possit pro consonante haberi, neque a Græcis

s Vide p. 360.

t Ammann p. 71. 72. Holder
p. 51. 40. Maloet p. 20.

v Ammann p. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
Maloet p. 20.

x Ammann p. 69.

y p. 24.

z Ammann p. 70.

a Sibilantes Ammann p. 71.

b Ammann p. 75. 76.

eam in classem admissa fuerit. Fit aere de laxa glottide leniter eliso *b**, quasi anima nos calefacere vellemus, densare vocat *Ammannus c.*

Proxime distat (*ch*) Helvetiorum, (*cheth*) Hebræorum, (*j*) Hispanorum, nam aliæ linguæ eo sono fere destituuntur. Mutissima est omnium, & aer ex gutture cum tremore bronchi, linguæ & palati, ni fallor mollis, eliditur inter palatum & linguam, cujus pars posterior ad palatum admovetur *d*, nam anterioris situs liber est, neque sonum mutat.

S omnium nationum, sibilantium princeps, fit linguæ parte anteriori palato proxima *e*: lateribus in dentibus inferioribus nixis, apice dentibus primoribus superioris maxillæ admoto *f*, his ita dispositis, ut non alto, sed lato intervallo distent *g*. Hujus literæ vis in quibusdam hominibus vix tolerari potest, cum argute ferrum secantis limæ ad modum aures adficiat. Dentibus incisivis amissis hæc littera minus commode, & cum ingrato audienti sibilo pronunciatur.

Ab hac litera (*z*) Gallorum modice mollitie sua differt, quæ (*sain*) est Hebræorum.

Ab (*f*) proxime differt (*schin*,) sive (*sch*) Germ. quod Galli aliquanto durius per (*ch*), aliquanto mollius per (*g* aut *j*) pronunciant. Lingua in hoc sibilo paulum apice depressa est, aque palato remotior, sic iter vocis amplius *h*.

*b** Holder p. 67.

c p. 73.

d Ammann p. 73. Holder
p. 73. 74 F. M. Helmont
alphab. natur. p. 70.
e Eabricius p. 54.

f Holder p. 42. Collins p. 238.
Ammann p. 74.

g Wallis p. 17. F. M. Helmont p. 76. Raphael, Holder l. c.
h Ammann p. 74. Holder
p. 71. &c.

Th Anglorum sive (*f*) *blasum* fit, quantum quidem intelligo, tota lingua ad dentes adplicata *i*, apice a dentibus superioribus modice deducto, iterumque cum tremore aliquo admoto. Exteri vix eum sonum discunt reddere.

F habet labium inferius ad superiores dentes adductum *k*, ut id inter & eos dentes per angustam rimam sonus exeat.

Ab eo (*f*) parum (*v*) consona Germanorum distat, & (*w*) Germ. sive (*v*) Gallor. Illa quidem solis adductis labiis, efflando nascitur, excitato vento, uti flamus, quando calorem nimium studemus minuere, lingua pariter ad extremum palatum adlisa, ut in (*u*) vocali. Labium inferius dentibus non admovetur *l*.

W fit labiis primo momento adductis & pene conjunctis, deinde deductis, neque lingua ad palatum dentesque adlisa *m*.

§. VI. Consonantes explosivæ.

A spiritu fieri Cl. *Ammannus*, qui in oris aliqua parte coacervatus, exclusus a narium meatu, subito per os exploditur *n*.

B proximum priori (*w*) unice differt, quod labia & accuratius conjuncta postulet *o*, & magis paulo post diducta. Solis cum a labiis fiat, pronunciari

i Holder p. 41.

k Holder p. 40. *Ammann*
p. 74.

l Sonum admistum esse *Am-*

mannus p. 75. *Holder* p. 41.

m *Raphel* c. 2.

n *Idem* *ibid.*

o *Raphel*.

pronunciari potest, quo tempore lingua minus bene ab infante gubernatur *p*. Inde *Baba* pater plurimarum gentium. Ob eandem rationem, prima consonantium solet in alphabeto poni, ut (*a*) prima vocalium *q*.

P. valde adfines aque Saxonibus sæpe cum *B* confusum, & adunata poscit labia & validius diducta, cum explosione aliquantum majori *r*.

D. fit ore quidem diducto, ut labium & maxilla inferior descendat, deinde linguæ apice ad palatum anterius & dentes primores admoto *s*, indeque iterum deducto, atque aeri exitum ex ore permittente.

T. est *D*. valentius *t*, cæterum eodem modo generatur. Hinc frequenter, & a Saxonibus potissimum, confunditur. A Chinenfibus (*d*) nunquam pronuntiatur.

K. parum differt a *D*. Habet linguam fursum cavam, parte posteriori *v* & lateribus ad dentes & palati partem anteriorem admotam, cum maxilla inferiori magis quam in *D*. deducta. Intelligitur, cur male proferatur, quando lingua gravior, & muscoli elevatores debiliores sunt, & in universum infantes pro *K* proferant adfines *D*. cujus minor est motus.

G. Germanorum & Gallorum ante (*a. o & u,*) majorem linguæ partem, & palato, & dentibus, quam in (*k*) admotam habet. Debilius etiam spiritus eliditur *x*.

p Buffon T. II. p. 476.

t Fabricius p. 41.

q Haller Geschichte der Thiere p. 89.

v Ammann p. 76. Raphael, Helmont p. 80.

r Raphael &c.

x Ammann p. 76. conf. Helmont p. 63.

s Helmont v. 65.

§. VII. *Litteræ nasales.*

Hoc nomine dicimus eas, quarum sonus aliqua certa ex parte per nares transit.

Earum prima *M*, fit labiis penitus adductis *y*, ut totus sonus per nares exeat *z*, & alæ narium alterne contremiscant. Et ipsa hæc litera lingua quiescente pronunciatur, hinc pariter inter primas *a* est, quas infantes edunt, *Mama* Europæorum, & Peruvianorum matrem sonat. *Mama* prima vox pueri undecim annorum, qui cum surdus & mutus fuisset loquelæ usum recuperaverat *b*. *A* *B*. imprimis differt; quod labia clausa maneant, & vox per nares prodeat.

N. a plerisque gentibus in alphabeto proximo loco ad (*m*) ponitur, ut etiam naturam adfinem habet. Labia non adducuntur, sed linguæ pars anterior palato osseo admovetur *c*, ut vox per nares erumpat, pari cum tremore & tinnitu, ut in *M*. Narium ergo nomen merito, multis in linguis, ingreditur.

Ain Hebræorum, (*n*) ante (*g*) plerarumque nationum, (*n*) finale Gallorum, (*ng*) finale Germanorum, etiam Sinenſibus familiare. Fit radice linguæ ad velum palatinum *d* admota, ut oris cavea præclusa, sonus per nares exeat, quorum alæ perinde, ut in modo dictis literis, contremiscunt.

y Holder p. 69.

z Ammann p. 69. Holder ib.

a Buffon l. c.

b Monconis Voyage T. I. p. 38.

c Ammann p. 69. Holder l. c.

Wallis p. 13.

d Wallis p. 13. Ammann p. 69.

§. VIII. *Literæ liquidæ.*

Difficiliores sunt, quæ per os solum transeunt, & semivocales orales *e* dicuntur. Earum facilior *L*. fit linguæ lateribus ad dentes molares interiores & caninos, apice ad dentes priores & palatum stabile antè admoto, unaque lateribus deorsum ductis, ut convexa pontis similis densiorque sit. Ita media vallis angusta inter linguam & palatum intercipitur, ex qua aer elevata lingua, & ad palatum latius admota secundum linguæ latera eliditur *f*. Potest una tremere lingua, potest tremor abesse *g*.

R ab *L* differt potissimum tremoribus suis vehementioribus. Nempe lingua perinde, ut in *L*, admovetur dentibus molaribus anterioribus, deinde apex levissime *h*, & minus late, quam in *L*. ad palatum antè cominus admovetur *i*, & dum aer per valleculam interpositam *k* eliditur, una linguæ apex & pars proxima celerrime *l* contremiscit. Hinc difficilis litera, quibus lingua pro musculorum portione ponderosior est: Neque a plerisque infantibus ante decimum annum pronunciari potest, vel certe ante id tempus, quo epiphysis styloformis ossis temporum tota cum sua capsula, suoque osseo fundamento coaluit *m*.

e Ammann p. 70. 71. 72.

f Ammann p. 71. Holder p. 48.

g Requirit Wallisius, non bene.

h Holder p. 49.

i Helmont p. 81.

k Repetito celeriterque palato admoveri Ammann l. c.

l Holder p. 49. 51. Helmont l. c. Fabricius p. 41.

m Schreiber Almag. p. 358. Negat prius articulate loqui.

Cum adfinis sit literæ *L*. quæ tremores non requirit, fere *L*. pro *R*. pronunciant, quibus hæc litera minus molesta est effatu.

Reliquæ consonantes literæ, nobis notæ, compositæ ex prioribus, iis celeriter se consequentibus pronunciantur, ut (*x, z,*) *psi* Græcorum, *tsch*, quod unico signo Russi exprimunt, *ro* adspiratorium Græcorum.

Liceat nunc in unica litera tentasse, ut musculi & organa enumerari possint, quibus quæque generatur. Ergo in exemplo *L* requirit styloglossorum *n* musculorum officium, a quibus lingua elevatur, & ad palatum adducitur. Una latera deprimuntur a genioglossorum fibris ad latus divergentibus, & ea latera detrahentibus. Reliquum pectoris opus est.

Cæterum ex tot elementis, quæ facile ad 26 accedant, posse innumerabiles voces componi, dubium non est, etsi vocabulorum numerum iniri non datur o. Impossibile enim fuerit ex calculis eas voces rejicere, quæ lectu quidem possibiles, ob consonantium vero numerum molestum pronunciari nequeunt.

§. IX. *Vitia vocis & loquela aliqua.*

Postquam causas exposuimus, quarum vi literæ pronunciantur, facilius invenietur, qua culpa quæque litera malignius exprimatur.

ⁿ p. 306.

^o *Init Maloet Ergo homini vox sua* p. 21.

Primumque lingua quidem abscissa loquelam penitus non tollit : sunt enim literæ, quæ ejus partis ministerio non egeant, qualem diximus esse (*m*). Non ideo tamen fieri crediderim, ut legitur, multos mortales absque lingua libere locutos esse *p*, & demum omnes *q* literas pronunciaſſe. Nam certe & res ipsa fuadet, adeo multas consonantes literas, quæ linguæ egent ministerio, ea sublata non poſſe rite efferri, & cum homines per infortunium linguæ parte mutilatos viderem, loquelam ſemper vitiatam vidi, tum alii *r*, literasque lingua mutilata non paucas male pronunciari paſſim lego *s*. Eos adeo, quibus a cancro *t*, aut a variolis lingua exefa fuiſſe dicitur, non vitiata loquela, iis linguam crediderim recreviſſe poſt vulnus dilatam, ut quidem ex ſua natura vulnera linguæ facile ſanantur. Pro lingua elevationem laryngis a geniogloſſis muſculis & geniohyoideis & mylohyoideis in puella fuiſſe perfectam *Antonii de Juſſieu* conjectura eſt *v*. Vocis vero uſum, & aliquam loquelam absque lingua ſuperfuiſſe non rejecerim, cum vox ex glottide ſola naſcatur. Hinc qui ex morbo balbi *x*, aut omnino aphoni *y* ſunt, canunt tamen.

p Bartholin Cent. II. hiſt. 22. *t* Conf. Ruland Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. Gentlem. Magaz. 1743. M. Jan. & de
Blancard Jaar-Register Cent. VI n. 5. conf. *Welfch* epifagm. p. 25. *q* *Wolf* de loquela, *Lamy* lingua reſecta M. Mart. atque
l'art de parler. Phil. Transf. Linden phyſiolog. p. 573.
n. 464. *v* *Memoire de l'Acad. 1712.*
r *Heuermann* diſſ. de lingua *p. 11. 12.*
p. 25. *x* *Swenska Academ. Handling*
s d. l. n. r. t. Phil. Transf. 1745. p. 115. Eph. Nat. Cur.
n. 484. & alias pluſculas diffi- *Dec. II. ann. 10. obſ. 197.*
cultur pronunciabat puella. *y* *Satyr. fileſ. mantiff. ad II.*
Memoire de l'Acad. 1718. p. 7. n. 2.

Porro lingua late immobilis, vitium facit ab arte vix superabile. Nimis magna lingua blæfos reddit *z*, qualem amplissimum in republica virum sæpe vidi, in universum fere omnes voces minus grate, aut liquide pronunciaſſe. Addit *Ammannus a* ab ea causa (*t*) pro (*k*) pronunciari, & (*r*) omnino destrui, cum vires musculorum ad levandam celeriter linguam, & ad ciendos tremores non sufficiant. Ejusmodi homines veteres, a duabus literis vitiosis, recte *traulous* dixerunt *b*.

Lingua nimis longa (*th*) Anglorum minus exprimit, & in (*s*) mutat *c*.

Nimis adstricta, frenulo arctiori, iterum (*r* & *l*) male pronuntiat cum ad palatum antè adpellere nequeat *d*. Balbutiem inde derivant *e*.

Nimis brevis perinde dicitur ad (*th*) Anglorum inepta esse, sed ei (*d*) substituere *f*.

Antè nimis ponderosa *g*, aut nimis flaccida *h*, literam (*r*) vetat liquide eloqui, & (*l*) lædit. Hæc iterum, cum styloglossi musculi debilitate conjuncta causa fuerit, cur pueri (*r*) minus recte efferant.

Nimis libera frenoque carens *i* peccat in (*l*) ut tamen ea debilitas corrigi queat. Longissima locutionem non læsit *i**.

Sed etiam aliæ partes vitium possunt habere.

z *Arantius* obs. 24.

a *Ammann* p. 110.

b *Galen*, Aphor. 32. Sect. VI.

&c.

c *Holder* p. 76.

d *Ammann* p. 113.

e *Brouzet* éducation des enfans T. II. p. 254.

f *Holder* ibid.

g *Ammann* p. 71.

h *Idem* p. 112.

i *Idem* p. 113.

*i** *Luchtmanns* de sapore p. 77.

Uvula nimis magna, aut certe duplex, rancidam vocem facit, quam per nares *k* dicunt transire, cum verius per solum os efferatur. Idem vitium a naribus obstructis fit *l*, ut literæ nasales (*m. n. & ng.*) male efferantur.

Qui absque uvula sunt *m*, sæpe grave vocis vitium patiuntur; idem, quod etiam a naribus nimis patulis *n* oritur, nempe literas (*k. t. p.*) nares transeuntes male efferunt. Sunt etiam, qui (*l. s. r.*) & (*ch*) ea ex causa non recte pronuntiarunt *o*. Non omnes literas reddebat, cui nulla a nativitate uvula fuerat *p*. Quibus divisa erat uvula, iis vox obscura fuit *q*; quasi per nares ederetur *r*. Hæc vitia potius ad veli palatini morbos retulerim, quam ad uvulam proprii nominis *r**.

Palati defectus *s* in labio leporino, aut certe ossium maxillæ absentia, ut hiatus *t* ab oris lacunare in nares continuetur, ingratam, fuscamque vocem facit. Labiales inde literas corrumpi (*o. u. oe. ii. b. m. p. f. v.*) *Ammannus* *v* monet, & literas quidem (*b. m. p. f.*) in quibusdam

k Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. p. 490. conf. *Ammann* p. 114.

l *Ammann*. p. 110.

m *Ammann* p. 113. A resecta uvula vox ingrata & mala *Paré administr.* p. 47. L. V. c. 14. *Rau* apud *Boetticher de loquela*, & *Morgagn.* Ep. IX. n. 9. Non multum patiebantur, quibus uvulæ pars resecta fuerat. *Idem* ibid. Quibus tota ablata erat, iis vox clangosa erat & incondita. Similia habet *Vander-*

monde Journ. T. XII. p. 161.

n *Ammann* p. 109.

o Eph. Nat. Cur. l. c.

p *Wedel de morb. infant.*

q *Storck Kinderkrankheiten* p. 157.

r Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. p. 512. *Vandermonde* ibid. *Paré.*

*r** Conf. p. 432.

s Obscura inde loquela Eph. Nat. Cur. Nov. vol. I. obs. 103.

t *Ammann* p. 109.

v p. 115.

idiomatibus Americanis desiderari adnotat *x*, quod labia iis gentibus solenne sit perforare, & ex iis suspensos anulos gerere *y*. A palato male formato (*r*) maligne *z* efferri consentit.

Ex nimis cavo palato, quo lingua pertingere nequiret, loquelæ vitium *a*.

Traulos esse, quibus meatus in palato & juxta dentes ampliores sint, per quos pituita destillet, subtilis est conjectura *Sanctorii b*.

Chinensibus lego, familiare esse, ut dentes superiores *c* ante inferiores promineant, inde fieri, ut (*r*) pronuntiare nequeant, eaque litera ab eorum lingua absit: uti & Mexicana lingua & vicinarum novæ Angliæ gentium *d* ea litera destituitur: sed horum quidem populorum peculiare vitium ignoro.

Ex dentium defectu senes (*s*) male pronunciant *e*, idemque vitium oritur, siue dentes nimis rari, siue nimis densi *f* fuerint. Ante dentes subnatos infantes plusculas literas pronuntiare nesciunt *g*.

A labio inferiori nimis exili literæ (*f*) pronuntiatio in puero sublata est *h*.

Mutitatem omitto, quæ a nervorum in universum vitio, a casu ab alto *i*, ab adlisa spina

x p. 56.

y *Wafer* descript. of the Isthmus &c.

z *Holder* p. 76.

a *Vylborn* edit. chir. *Heister* p. 798.

b *Meth. Vitand. Error.* p. 181. 182.

c *Apud du Halde.*

d *Wallis* p. 21.

e *Ammann* p. 39.

f p. 114.

g *Ammann* p. 39.

h *Idem* p. 74. 115.

i *Schelhammer* p. 33. *Panacæolus II.* obs. 30. *Cornar. hist. rar. c.* 15.

dorsi *h*, a cranii vulnere *l*, collive *l*^{*}, a titillatione nimia *m*, a morbo acuto *n*, a fulguris o contactu successit. Ex hysterico morbo aphonias non raro vidi, cum eo morbo sublata, & alia exempla lego *p*. Neque a nerveo genere recedit infantilis morbi exemplum, in quo vermibus expulsis loquelæ usum æger recuperavit *q*. Aliis id vitium ab obstructa membrana pituitaria accidit *r*.

Uti a nervorum functione impedita horum hominum loquela sublata fuit, ita videtur summa contentio virium *s* animi & corporis aliquando, novo forte torrente materiei motricis in obstructos nervos impulso, loquelam restituisse, ut de Croësi filio notum exemplum est, & aliorum *t*, qui subito, quasi rupto vinculo, loquendi facultatem receperunt. Etiam Battus Cyrenaicus balbus fuisse dicitur, & Maximilianus I. Cæsar, atque istum quidem nono anno vocem legitimam recuperasse *v* lego, & alia adfinia exempla video.

-
- k* Galen. loc. adfect. L. I. c. 6. locutus Andry orthopedie T. II. p. 281. & alius ap. Brouzet T. II. p. 247. Muta ex terrore vocalis Desnoues lettr. p. 198. Ex] terrore quatuor annorum mutitas sublata Phil. Transf. n. 486.
- l* Blanc. l. c. T. I. Cent. IV. n. 28.
- l*^{*} Schelhammer ars med. T. II. p. 17.
- m* Hildan Nutzen der Anat. p. 15.
- n* Freye Urtheile XXI. 1750.
- o* Wolf Wirkungen der Natur n. 329.
- p* Salmuth L. III. obs. 28. Mutitas a suppressis mensibus, sublata iis restitutis. In hypochondriaco mutitas 14. annorum quasi ex nodo adscendente Hooke exp. 58.
- q* Alexander Benedictus L. V. c. 15.
- r* Hildan Cent. VI. obs. 14. Phil. Transf. n. 486.
- s* Ex nixu vehementer subito locutus Blancaard Jaar - Register T. I. Cent. II. n. 21. de homine quadragenario. Ante mortem vocem recuperaverit puella 21 annorum Act. Mur. Balth. 1700. p. 38. A terrore loquela homini reddita, cui lingua resecta fuerat. Tulpus L. I. c. 41.
- v* Omnino mutum fuisse, sponteque vocis usum recepisse Mercurialis morb. pueror. L. II. p. 61. De alio puero, cui nono anno vocis facultas rediit Eph. Nat. Cur. Cent. X. obs. 45.

Sed confirmatis musculis factum fuisse potuit, forte & clauso palato.

§. XI. *Modus, quo vitia loquelæ peculiariter corriguntur.*

Ut alias in arte medica, ita hoc in exemplo, dimidium curationis absolutum est, quando causam mali cognovimus. Pleraque vitia loquelæ sunt ejusmodi, ut a perito viro reparari queant. Qui (*d & t*) pro (*k*) pronuntiant, iis *Ammannus* lingua digitis depressa *x*, ne ad dentes adlideret, exprimendæ legitimæ vocis facultatem restituit, neque eo auxilio egent, si animæ imperio linguam ulterius, & quantum sufficit, deprimere didicerint. Quæ puella pro omnibus literis idem (*t*) efferebat. intra tres menses omnes literas efferre apta fuit, doctore semper *Ammanno y*. Qui ob linguam nimis laxam vagamque (*l*) male pronuntiant, emendant vitium, quando linguam antrorsum & sursum producere didicerunt *z*. Balbuties ex adstricto linguæ freno, hoc inciso levatur *a*. Loquelam per linguæ vulnera vitiata proprio instrumento restituere docent *Pareus b* & *M. G. Pirmann c*. Qui (*f*) non pronuntiabat, didicit labium superius ad dentes inferiores adducere, ita nova, sibi que propria, ratione sonum (*f*) didicit repræ-

x *Ammann* p. III. in nobili Dano.

y p. 107.

z *Ammann* p. 113.

a *Idem* ibid.

b *Chirurg.* L. XXII. c. 5.

c *Chirurgischer Lorberkranz* p. 245. 246.

sentare *d.* Alium excitavimus, qui amissa lingua vicaria ope labiorum literas protulit.

Quibus dentes nimis densi sunt, ii spatio inter caninos & incisores parato *f* levantur. Jenensis professor, ut emendatius hebraicas literas pronunciaret, dentes lima sibi radi curabat *g.* Quibus nimis rari sunt, ii juvantur dentibus ex ebore effectis *h.*

Palati mollis amissi jacturam tabulæ eburneæ *i.* aut aureæ, cum spongia hactenus reparant. Uvulæ nimis grandis particula utiliter amputatur *k.*

§. XII. *Ut muti loqui discant.*

Aliquanto magis admirabile artificium est, quo homines a prima nativitate muti, sola docentis magistri industria, nullis organis mutatis, discunt loqui, & inæstimabile privilegium recuperant, ut hominum societati interesse, aliorum percipere sensa, & sua cum aliis communicare queant. Hujusmodi homines sunt ejusmodi, qui nunquam auditus facultate usi, non potuerunt aliorum hominum voces aut percipere, aut imitari. Omnis enim, etiam avium, vox *l* ab imitatione multum pendet & lusciniæ, si absque parente cum alia avicula canora educata fuerit, ejus vocem suam facit, neque porro lusciniæ canta-

d. Ammann p. 72. 115.

f. Ammann p. 114.

g. C. Hofmann instit. p. 184.

h. Ammann p. 114.

i. Hildan Cent. II. obs. 22, Schultet l. c.

k. Ammann p. 114.

l. Lusciniæ a parentibus discunt, neque bene canunt, si absque patre & matre educatæ fuerint Aëdologie p. 10.

tum canit. Ejusmodi homines non pauci nascuntur, fecitque eorum miseria, ut dudum magna cum industria in arte invenienda laboratum sit, qua possit tantum vitium emendari, cum superari nequeat. In universum tota ars in eo est, ut furdus homo defixis in loquentis hominis labia, linguam, laryngem, oculis, etiam digitis ad laryngem admotis, discat similes loquentium motus suo loquelæ instrumento imitari. Passim, & dudum de ejusmodi furdis hominibus legimus, qui oculis audiverint *m*, quorum multi etiam repetere auditas voces, & confabulari *n* didicerunt.

Ars ipsa, qua magister furdum hominem docet animi sensa vocibus exprimere, in Hispania sub finem XVI. Seculi nata est, eamque *Petrus Pontius* o Monachus Benedictinus primus, quantum invenio, exercuit.

Deinde *Johannes Paulus Bonet* librum nunquam mihi visum edidit *Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos*, Madriti 1620. excusum, quo hujus artis præcepta traduntur,

- m* Rudolph Agricola de invent. L. IX. cap. ult. Zwinger Physiol. Med. c. 25. Salom. Alberti de surditate p. 20. I. Ant. van der Linden physiol. p. 552. tria exempla. Plot natural hist. of Staffordshire p. 288. Phil. Transf. n. 312. Schott physic. curios. L. III. c. 33. Tulpius c. 19. L. IV. & Job. v. Mekren c. 19. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obs. 35. Pet. Borellus Cent. IV. obs. 23. Cl. Nic. le Cat des sens p. 295. Hist. de l'Acad. 1737. obs. 6. Puella Genevensis apud Derham physico-theol. p. 115. n Tulpius l. c. Eph. Nat. Cur. l. c. Hist. de l'Acad. l. c. Burnet apud Derham l. c. Confuse tamen utcunque Phil. Transf. o Vallesius de sacra philosophia p. 78. Ejus viri inventa Emanueli Ramirez de Carrion male adtributa fuisse, ostendit Daniel Morhof polyhist. L. II. c. 3. p. m. 341.

aliumque paulo post *Emanuel Ramires de Carrion* *maravillas* nempe *de Naturaleza en que se contienen dos mil secretos de cosas naturales* anno 1629. Post eos *Franciscus Mercurius v. Helmont*, longævus homo, organorum vocis in literarum formatione motus hebræos characteres imitatos esse persuasus, suis iconibus eos ipsos motus expressit, musicumque furdum & literas pronunciare docuit, & hebraice loqui *p*.

Celebris inde Mathematicus *Johannes Wallis* vitia quidem loquelæ correxit, situsque partium necessarios definivit. *Alexandrum* præterea *Popham* furdum loqui docuit *q*, & duobus denique furdis *r*, etiam intra duos menses *s*, adeo expedite fari dedit, ut alter Polonicas etiam literas pronunciaret *t*. Denique de formatione literarum libellum scripsit *v*, qui sive ex vitio linguæ Anglicæ, sive aliam ob causam, minus certe liquidus mihi videtur *x*. Eundem virum *Monconis* cum in Anglia esset, vidit docuisse loqui furdum, & in alio docendo occupari *y*.

Guilielmus Holder, in hac quidem arte peritior, egregio libello elementorum vocis generationem exposuit, ipsoque anno 1659. furdum loqui docuit *z*. *Georgii Sibscote* (*Sibscota Morhof*) *deaf and dumb mans discourse or concerning thos who are born deaf and dumb* Lond. 1670. editum, non vidi.

p *Alphabet natur.* Suizbach. jus IV. editionem lego Oxon. 1657. 12. p. 5. 1674. 8.
q *Phil. Trans.* n. 345. *x* Vide pronuntiationes *u. y.*
r In præf. & *Phil. Trans.* ch. th.
n. 61. ad annum 1662. *y* *Itin.* II. P. II. p. 96. 97.
s *Phil. Trans.* n. 61. *z* Præfat. ad L. *Elements of*
t In Epist. ad *Ammannum.* *speech.*
v *Grammatica Anglicana cu-*

In Silesia hujus artis peritus homo vixisse dicitur *a*, qui balbutientem quidem, non mutum, juvenem omnes literas pronuntiare docuerit.

Omnium vero, qui furdos docuerunt loqui, famam suis meritis superavit *b* *J. Conradus Ammann* Scaphusinus, qui in Belgio, inque pago, ni fallor, a Leida non remoto vixit, diemque obiit. Adeo enim liquide & expedite furdīs mutisque hominibus loquendi facultatem reddidit, ut puerum pinguis fatis ingenii intra unum mensem loqui, legere & scribere docuerit *c*: deinde intra duos menses puellam Haarlemensem *d*; alias enim in minus aptis discipulis intra annum penso defungebatur *e*, ut in duobus tantum discipulis, & quidem ex proprio puerorum vitio, ars frustra fuerit *f*.

Idem totam artem ita perspicue tradidit *g*, ut eam, ex solo lecto libello, *Raphelius* didicerit *h*. Ex ejusdem viri disciplina etiam exiit *Cl. Zieglerus*, qui non dudum Rintelii medicinam docebat, & olim artem magistri in furdīs exercuit. Leges etiam loquendi *Ammannianas* nuperrimus auctor repetit *i*.

a *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. I. obs. 35.

b Etiam *F. M. Helmontio* judice, *Ammann* in præf.

c p. 98.

d In *Dedicat.* Etiam latine & gallice loqui didicit. Testes etiam hujus curationis habemus *Jac. Benignum Winslow*, qui recte loquentem ipse audivit apud *Andry Orthopedie* T. II. p. 297. & apud *Verdier abrégé*

d' anat. T. II. p. 324. De eadem virgine lege *Phil. Transf.* n. 286.

e p. 46. Testis alter curationum *Ammanniarum* est *M. E. Ettmüller de tormentis & pænis sustinendis.*

f p. 80.

g *Surdus loquens* 1700. de 1702. sæpius recus.

h Præf. sui libri.

i *Berard* p. 49. seqq.

Paulo post *Ammannum* k *Guilielmus Kerger* Med. Lic. regulas aliquas ad Germanicam linguam adaptatas dedit, & in docendis surdis mutisque operam navavit l.

Eliam Schulze similia *Ammannianis* promittentem citat *Raphelius*.

Idem *Georgius Raphael* V. D. M. egregium libellum m de ea arte dedit, in propria filia felix magister, idemque ad propriam experientiam artis leges tradidit, hætenus diversas ab *Ammanno*, quod iste sonos puros pronuntiare docuerit. *Raphelius* continuo syllabas, & consonantibus literis cum vocalibus conjunctis compositas, maluerit efferri. De accentibus, & vocum significationibus multa utiliter monuit.

Nuper ex simili arte *J. Fridericum Supf* n laudari lego, & *Jacobum Rodriguez Pereira* o, ut caste & correcte loquerentur discipuli, lente tamen p & ex imo quasi pectore, proprio alphabeto usus, cujus literæ sunt manuum motus q. Nihil vero accurati de ejus quidem hominis peculiaribus artibus novi, neque de Cl. *Ernault* artificio q*.

Nuper legimus esse *Edinburgi* Cl. *Braidwood*, qui scholam pro docendis surdis & mutis aperuerat, ut virginem etiam mathemata docuerit q**.

k Anno 1704.

l *Eph. Nat. Cur.* Cent. II, p. 183.

Append.

m *Die Kunst Taube und* Febr.

Stumme reden zu lehren Luneburg 1718.

n *Satur. Siles. mantiss. VIII.*

n. 1.

o *Buffon histor. natur.* T. III.

p. 350. *Hist. de l'Acad.* 1749.

p. 183.

p *Journal des Savans* 1750.

Febr.

q *Idem* ibid.

q* Apud *Toussaint obs. de phys.* 1757. Sept.

q** *Johnston* rel.

Deinde Cl. *Arnold* V. D. M. prope Gieffam his ipsis anis patritium puerum Bernensem loqui docuit ad *Ammanni* fere morem , ingeniosis artibus adjutus.

Cl. *Lassus* & Abbas *Epée* *q**** potius symbola aliqua & inventionem docent , etsi *Lassus* in principio etiam loqui docuit , quod institutum ob ingrate vitiosos accentus deferuit.

§. XIII. De ea arte aliqua.

Primum furdos unice his artibus docere licet , si enim non furdi quidem , sed muti tamen fuerint *r* , in iis hominibus organa loquelæ ipsa vitiata esse oportet , ea vero , quando ad motus suos inepta sunt , nulla speculatio loquentis hominis ad suos motus reddendos expedierit.

Deinde octennibus *s* non minores ars requirit , ut aliqua cum patientia , & ad observandum constantia , dictamina præceptoris percipiant. Porro *Ammannus* digitis discipulum primo tremorem laryngis jubebat percipere , dum ipse loquebatur , & eum tremorem in proprio gutture imitari *t*. Ita vocem edere doctus vocales incipit pronunciare , dum coram speculo ejusmodi labiorum orisque motus fingit , quales in loquente magistro *v* vidit , manumque gutturi præceptoris admota ,

*q**** *Instit. des sourds & furds* fuerint *Plinius* L. X. muets. Paris 1776. 12. c. 69.

r *Dominicus Panarolus Pentecost.* IX. obs. 17. Homines *s* p. 81.
non sunt muti , nisi simul *t* p. 83.
v p. 84.

admota, naribus ab eo sibi compressis, integram, & plenam vocem reddere discit *x*. Una dum pronuntiat scribit *y* idem eas vocales, ut menti fixæ maneant, paucas simul, quotidie tamen aliquas. Inde semivocales *z* paulatim efferre docetur, tum alias literas, vitando semper, ne una nomina suorum consonantium adjungat *a*. Tunc literas, quas recte didicit, rapide sibi subjungendo syllabas *b* componit. Inde rerum nomina linguamque menti imprimit *c*. Pulcherimæ artium elementa tradentem lector æquus excusabit. Aliquanto facilius fit, quod hi pueri muti & furdi ingenio soleant valere.

§. XIV. *Alia ratio docendorum surdorum.*

Aliud artificium, neque hujus loci est, quo muti non adeo organis loquelæ rectius uti docentur, sed potius auditus instrumentum aliud, ex naturæ tamen observatione natum, ipsis suppeditatur. Nempe tremores sonori, quos iners auris non percipit, ossibus capitis imprimuntur, ut ad nervum audientem absque tympani ambagibus veniant. Potest corpus sonorum cranio ægri imponi *d*, potest utilius, bacillus in os loquentis, interque auditurî dentes dari. Ita aer de loquentis hominis

x p. 87.

y p. 86.

z p. 88.

a p. 89.

b p. 97.

c p. 103. 104.

d *Gautier* in suis *obs. phys.*

glottide exeuns bacillum vibrare cogit, eosque tremores furdus percipit *e*. Surdus utique accurate ex digito admoto citharæ sonum distinguit, & si manum tenet loquentis, vocem & syllabas ex tremore distinguit *f*. Alius furdus cornu ore recepto percipiebat sermones *g*, eodemque dentibus prehenso instrumenti sonum a furdis sentiri docuit *J. Baptista Porta h*, quod artificium nuper in Germania repetitum fuit. Denique virgo furda oculis audiebat, quæ super brachium scribebantur frontemve, aut dorsum, ut etiam celeriter scribentem intelligeret *i*, ita omnino omnes soni, calvaria ossibus utcunque impressi, exaudiuntur, etiam quando tympanum & reliqua auditus organa officio suo desierunt fungi.

e Jorissen diss. de nova methodo surdos reddendi audientes Hall. 1757. Baumer de surd. a Nativ. Cur. Comm. Lit. Nor. 1743. hebd. 12. Minime vero successit Lasso aut Arnoldo. Sonum audiebant, litteras non distinguebant.


f Kaatw de perspir. n. 1100. Ipse expertus audiebat vir Cl. ut etiam errores loquentium distingueret Impet. fac. n. 372.

g Welsch Episagm. obl. 24.

h Mag. natur. L. XX, c. 1. Monro de nerv. p. 376.

i Journal de Med. 1757. Juin.

FINIS LIB. IX. & TOMI VII.





I N D E X

T O M I . S E P T I M I .

L I B E R O C T A V U S .

S E C T I O I V .

R E S P I R A T I O N I S P H Æ N O M E N A .

- | | | |
|----|--|--------------|
| 2. | Inspiratio | pag. 1 seqq. |
| | prima ejus initia in nascente animale | 2 |
| 3. | Causæ inspirationis | 3 |
| | Non a sanguine in arteriam pulmonalem pulso | ibid. |
| | neque a vi pulmoni innata | 4 |
| | Cur nonnunquam aperto pulmone respiratio aliquamdiu fuerit superstes | ibid. |
| | A vulnere casu clauso | 5 |
| | ab expiratione pro inspiratione habita | 6 |
| 4. | Circulus Cartesii nullus est | 8 seqq. |
| | explicantur experimenta quibus itur confirmatum | 10 |
| 5. | Cur in pulmonem aer subeat | ibid. |
| | Ob raritatem aeris in pulmone reliqui | 11 |
| | In aperto adeo pectore pulmo non dilatatur | ibid. |
| | aut alioquin admissio atmosphæræ pondere | 12 |
| 6. | Vires quæ pectus dilatant | ibid. |
| | Præcipuum est diaphragma | ibid. |
| | Experimentis confirmatur | 13 |
| | Plus facit quam costæ ad pectus dilatandum | 15 |
| | & quantum | ibid. |
| | Calculi <i>Francisci Boissier</i> | ibid. seqq. |
| | aliorum | 17 seqq. |

7. Quando pectus per diaphragma dilatatum fuit , subit
aer pag. 19
Imitatrix naturæ machina 20
8. Ut pulmo a diaphragmate mutetur *ibid.*
Descendit pulmo 21
& cor *ibid.*
9. Musculorum intercostalium partes in inspiratione
facienda *ibid.*
Costæ elewantur leniter in viro sano , quieto 22
in aliis validius *ibid. seqq.*
hinc etiam absque diaphragmate aliqua respiratio
supereft 23
Resectis musculis intercostalibus perit pars respira-
tionis 24
& læsa spinali medulla 25
mutatio pectoris ab iis musculis 26
10. Aliæ vires auxiliares , quæ pectus dilatant *ibid.*
Musculi nempe , qui claviculas 27
scapulas *ibid.*
superiores costas levant *ibid.*
Non oportet eos musculos ab instrumento respirationis
removeve 28
Inspiratio tardior expiratione *ibid.*
11. Ut pulmo ab inspiratione mutatur 29
Multo fit amplior *ibid.*
extenduntur rami bronchorum & arteriarum 30
& ad angulos majores secedunt 31
& sanguis in arterias facilius irruit *ibid.*
neque ab aere admissio impeditur 32
& sanguis quasi in spatium inane in pulmonem
irrupit 33
& pulmo sanguini meabilis fit , quando inflatur aut
inspirat 34
12. Experimentum *Hookii* 35
Animal moribundum inflato pulmone refocillatur *ibid.*
Non est *Hookii* *ibid.*
Qui alii instituerint 36
Experimenta in submersis 38 *seqq.*
Potest in animalibus suffocatis ufui esse 42

Causa quare vitam refocillet	<i>pag.</i> 42
alii modi, quibus vita submersis redditur	43
Nullæ sunt foraminis ovalis aperti partes	45
13. Quare diuturna inspiratio ferri nequeat	<i>ibid.</i>
Sanguis in pulmones congeritur	<i>ibid. seqq.</i>
14. Causa quare congeratur & stagnet	48
hypotheses variæ	49
An a calore retenti aeris	50
15. Nondum videtur vera causa dicta esse	53
16. An ab aere in pulmonibus vitiato	55
hinc male dilatante pulmonem	57
17. Quare necesse sit inspirationi finem facere	59
An a tractione musculorum expirationem facientium molesta	<i>ibid.</i>
An a compressa vena sine pari	<i>ibid.</i>
aut nervo phrenico	60
aut intercepto sanguinis ad cerebrum com meatu	61
vix potest admitti	<i>ibid.</i>
18. Causa verior	62
Incommodi sensus quod anima percipit	63
Respiratio a voluntate dirigitur	<i>ibid.</i>
Porro hæc sententia confirmatur	64
In somno anima musculos aliquos pergit voluntarie regere	65
19. Quamdiu absque respiratione vivi queat	68 <i>seqq.</i>
Diutius animalia languida supersunt	<i>ibid.</i>
sana, & calida subito fere pereunt	69
etiam sub aquis	71
Quare aliquando diutius supervivere videantur	72
ob levitatem & natationem	73
Ne amphibia quidem diu aere carere possunt	74
Strangulati ex apoplexia pereunt	75
tamen etiam larynge fracto	<i>ibid.</i>
Non ita pereunt animalia, per quorum pulmones pars minor sanguinis transit	76
20. Causæ expirationis	<i>ibid.</i>
I. Musculi abdominis	77 <i>seqq.</i>
Eorum robur insigne est	79
Eorum actio	<i>ibid.</i>

21. II. Natura elastica costarum pag. 80
22. III. Contractilis vis arteriæ asperæ & bronchiorum 81
 tum mere mechanica 82
 tum musculosa 83
23. IV. Musculi auxiliares respirationis 84
 Aliæ causæ minus certæ 85
24. Effectus expirationis in pulmone 86
 Aer de pulmone exit 87
 nunquam totus ibid.
 nam pulmo qui semel aerem admisit , porro ibid.
 nunquam sub aqua mergitur ibid.
 Ab eo adeo signo dignoscitur , num infans post partum 88
 continuo extinctus respiraverit ibid.
 Experimentum fallere potest ob aerem inflatum ibid.
 ob putredinem , quæ pulmonem natare cogit 89
 ob scirrhus , qui subsidere 90
 aliosve morbos , quorum idem effectus est ibid.
 aut quod debilis fetus aerem non hauserit 91
 Ut aer in vacuo spatio expansus pulmonem mutet 92
25. Expirationis effectus in sanguinea vasa 93
 pulmo evacuatur per venas 94
 & sanguis venosus resistit adventuro arterioso 95
26. Hinc pereunt animalia quando aer subtrahitur 96
 calida celeriter 97
 lentius frigida 98
 Convalescunt aere reddito 100
27. Sanguis per venas de pulmone regurgitat 101
28. Quare oportet inspirare ibid.
 causa quare redeunte vere animalia ad respirationem 102
 redeant 102
29. Tempus unius respirationis 103
 varie computatur 104
 est fere unius respirationis ad quatuor pulsus ibid.
 Sed cum varietate aliqua in variis vitæ conditionibus 105
 Num in morbis una respirationes incitentur & pulsus ib.
 Quantum sanguinis in una respiratione transmittatur 108
30. Suspirium quid sit 109
 Ejus effectus 110
31. Oscitatio ut a suspirio differat ibid.

Unde oriatur	pag. 111
ejus effectus	112
32. Suctio ut fiat	114
33. Anhelitus	115 <i>seqq.</i>
ejus causæ & fines	116
34. Nixus	<i>ibid.</i>
Quibus viribus perficiatur	<i>ibid.</i>
ejus effectus	117
cur robur præstet homini	119 <i>seqq.</i>
35. Tussis	121
quibus organis cieatur	<i>ibid.</i>
quo stimulo	122
& effectu	123
A voluntate regitur	<i>ibid.</i>
36. Sternutationis phænomena	124
causæ in naribus	125
alio loco positæ	<i>ibid.</i>
Ejus effectus	126
An a sympathia nervorum cieatur	127
37. Risus phænomena	129
causa in anima	130
in corpore	<i>ibid.</i>
effectus boni	132
malique	133
38. Fletus Phænomena	134
causæ	135
39. Singultus Causæ	136
quomodo ad diaphragma communicetur	137
Non est a voluntate	140
40. Vomitus	141
aliquid de respiratione habet	<i>ibid.</i>

S E C T I O V.

U T I L I T A S R E S P I R A T I O N I S.

I. Problema Harveyanum	142
Non oportet confundere diversos modos quibus respiratio ad vitam necessaria requiritur	<i>ibid.</i>

- jam dictum est , quare ad sanguinem per pulmonem
transmittendum requiratur *pag.* 143
- Alio modo necessaria est respiratio fetui nuper in
lucem edito *ibid.*
- Non tamen adeo subito perit , quando aere arcetur *ib.*
- Sed ab aucta copia sanguinis, qui in pulmonem venit 145
2. Sed causa cur aerem captet 146
- rejiciuntur aliquæ opiniones 147
- ob cibum quem vult captare 148
3. Cur omnia animalia aere egeant 150
- An aliqua sint aeris non indiga 151
- Ampliatur 152
4. An aer de atmosphæra ad vitam alendam in sanguinem
recipiatur 153 *seqq.*
- Adfirmantium aliqua nomina *ibid.*
5. Argumenta , quibus ostenditur aeri atmosphærico
viam ad sanguinem patere 154
- Infectis aer ad omnes partes corporis venit *ibid.*
- Experimenta , quibus persuadent etiam in calidis
animalibus similia fieri 155
- Aer reperitur in animalium sanguine 156
- & cadaveris venis *ibid.*
6. Et in tela cellulosa 157
7. In spatio inani sanguis se de humoribus animalibus
expedit 159
- de omnibus omnino animalis partibus firmis 160
- & fluidis 161
- & ipso sanguine 162
8. Alia argumenta. Plus aeris esse in sanguine , qui de
pulmone nuper redit 164
- & in sanguine animalis respirantis *ibid.*
- Sanguinem rarefieri a calore 165
- in capsulis articulationum aerem strepere *ibid.*
- aer tamen meabilis est 166
9. Via qua aer ad sanguinem veniat *ibid.*
- per pulmonem *ibid.*
- cutem 168
- chylum *ibid.*
- nares *ibid.*

- | | |
|--|----------|
| 10. Utilitas recepti aeris | pag. 168 |
| Elatere suo sanguinem agit | ibid. |
| 11. Vis vitalis aeri tribuitur | 170 |
| spiritus inde generari | 171 |
| 12. Ex aere salinum aliquid recipi | ibid. |
| 13. Nitrumve aereum | 172 |
| Non quidem plenum nitrum | 173 |
| Sed acidus vapor | 174 |
| 14. Aliæ conjecturæ | 175 |
| 15. Non videtur aer elasticus ad sanguinem venire <i>ibi d. seq.</i> | |
| Argumenta quibus negatur | 176 |
| Sanguis a frigore non densatur | 177 |
| Viæ in pulmone aeri elastico non patent | ibid. |
| Unde bullæ sint, & aer a putredine evolutus | 178 |
| Ipsa phænomena denti aeris pro nobis sunt | 179 |
| A colore sanguinis | 180 |
| exstant tamen non contemnenda experimenta, quæ
suadent, ad ruborem sanguinis aerem facere | 181 |
| Aer in calore humano elaterem amittit | 182 |
| Nitrum non nascitur a frigore | 183 |
| neque præcipua frigoris causa est | 184 |
| 16. Num aer sanguinem refrigeret | ibid. |
| Vetusta est hypothesis | ibid. |
| confirmata potissimum ab <i>Helvetio</i> | 186 |
| & <i>Hambergero</i> | ibid. |
| Densari in pulmone sanguinem | ibid. |
| & refrigerari | 187 |
| 17. Sanguis equidem aliquantum ab aere refrigeratur | 189 |
| Non tamen is est finis naturæ pulmonem facientis | ibid. |
| Nam omnino sanguis non frigidior ex pulmone prodit,
quam advenit | 190 |
| Viviturque in aere quam sanguis calidiori | 191 |
| 18. Num sanguis addensetur in pulmone | 192 |
| num id demonstret fieri minor diameter venarum
pulmonearum | ibid. |
| Non ea causa est, cur dextræ cordis cavæ majores sint | 193 |
| sunt majores quia ipsis plus resistitur | 194 |
| Id demonstrant experimenta morboſa | 195 |
| Sed etiam in fetu, ante respirationem majores sunt | 197 |

19. Quæ sit vera pulmonis utilitas	pag. 198
Inhalat aliquid de aere	199
& aerem dissolutum	200
20. Exhalatio pulmonalis	201
Insignis copia halitus per pulmonem diffatur	<i>ibid.</i>
Aqua est	202
mista cum sale & oleo	<i>ibid.</i>
Particulæ putrescentes	203
alcalinæ	<i>ibid.</i>
Phlogiston	203
21. Vis quam pulmo in movendo sanguine exercet	204
Inspiratio sanguinis in arteriam fluxum accelerat	205
Exspiratio reditum per venas	<i>ibid.</i>
Quid inde in sanguine mutando sequatur	206
Num celerius per pulmonem sanguis fluat	207
Non videtur	<i>ibid.</i>
Neque pulmo multa habet præcipua	208
22. Sanguis num in pulmone addensetur	211
Perinde nempe ut aliis in arteriis	212
23. Respirationis potestas in abdominis sanguinem	213 <i>seq.</i>
Venosum sanguinem partim ad cor premit	<i>ibid.</i>
partim versus venarum origines	<i>ibid.</i>
ut celerius proximo tempusculo redeat	<i>ibid.</i>
atque adeo stagnationi sanguinis resistit in hepate	215
liene	<i>ibid.</i>
premit ductum chyloferum	216
ventriculum	<i>ibid.</i>
vesiculam fellis	<i>ibid.</i>
& urinæ	<i>ibid.</i>
rectum intestinum	<i>ibid.</i>
uterum	217
olfactum adjuvat	<i>ibid.</i>
Pulmo est pro natatoria vesica	218
Præcipuus respirationis effectus est vox	<i>ibid.</i>
24. Hypotheses aliquæ	219
Cl. la Caze de diaphragmate conjecturæ	<i>ibid.</i>



LIB. IX. VOX ET LOQUELA.

U	
1. L arynx in universum	pag. 221
quibus in animalibus reperiatur	<i>ibid.</i>
figura in homine	222
2. Partes. Cartilago anularis	223
ejus situs	<i>ibid.</i>
figura	<i>ibid.</i>
nexus	224
3. Cartilago scutiformis	225
figura	<i>ibid.</i>
cornua	226
4. Cartilagine arytaenoideae	227
Duae sunt	<i>ibid.</i>
Figura	228
Appendix	229
Glottis non vera	<i>ibid.</i>
5. Epiglottis	<i>ibid.</i>
non est propria laryngis pars	230
Descriptio	<i>ibid.</i>
petiolus	<i>ibid.</i>
mobilis est	231
6. Ligamenta thyreoarytaenoidea superiora	232
inferiora	233
Glottis vera	234
claudi potest	<i>ibid.</i>
7. Laryngis ventriculi	235
a Morgagno restituti	236
8. Alia ligamenta laryngis	<i>ibid.</i>
Hyothyreoideum laterale	237
medium	<i>ibid.</i>
alia anteriora	<i>ibid.</i>
Hyoepiglottideum	<i>ibid.</i>
Glossopiglottideum	238
Cricothyreoidea anteriora	<i>ibid.</i>

alia lateralialia	pag. 238
Thyreoarytaenoidea	239
Arytaenoideum	ibid.
9. Larynx totus mobilis est	240
num possit cartilago scutiformis antrorsum produci	ib.
Qui crediderint	ibid.
Non videtur	241
10. Musculi laryngis communes	243 seqq.
sternothyreoideus	ibid.
ejus officium	244
11. Hyothyreoideus	ibid.
Ejus munus	245
12. Stylopharyngaeus ut ad laryngem pertineat	246
Ejus vis	247
Thyreopalatini ad laryngem movendum efficacia	248
13. Musculi proprii laryngis	ibid.
Cricothyreoidei	ibid.
14. Cricoarytaenoidei postici	249
Laterales	250
15. Thyreoarytaenoidei	251
fasciculus ab iis ad epiglottidem	252
ejus actio	ibid.
16. Arytaenoidei transversi	253
Obliqui	254
Fibrae ad epiglottidem	ibid.
17. Musculi laryngis rariores	255
Glossoepiglottideus	ibid.
Hyoepiglottideus	256
Cricoeplottideus	ibid.
Thyreoeplottideus minor	ibid.
18. Cutis laryngis	257
folliculi simplices	258
19. Glandulae epiglottideae	259
20. Glandulae arytaenoideae	260
Descriptor <i>Morgagnus</i>	ibid.
aliae	261
21. Glandula thyreoidea in universum	ibid.
unica est	262
situs & figura	ibid.

I N D E X.

397.

Lobi		pag. 263
22. Fabrica interior		265
Acini		266
cellulæ		ibid.
Utilitas		267
obscura est		ibid.
Ductus excretorii		ibid.
non innotuerunt		269
aliæ conjecturæ		270
23. Levator musculus hujus		271
Ejus varietates glandulæ		ibid.
24. Arteriæ laryngis	272	seqq.
Arteria thyreoidea superior		ibid.
25. Inferior		274
26. Laryngis venæ thyreoideæ inferiores		276
mediae		277
Superiores		ibid.
27. Nervi laryngis	ibid.	seqq.
Superior laryngeus ab octavo pare		278
Conjunctiones cum trunco intercostali		279
28. Nervus inferior laryngis, Recurrens.	ibid.	seqq.
Origo		280
progressus		ibid.
rami in laryngem dati		281
29. Phaenomena hujus nervi	282	seqq.
Interceptus vocem aufert		283
cordis motui non nocet		ibid.
Etiam nervus octavi paris ligatus vocem subprimit	284	

S E C T I O I I .

L O Q U E L Æ O R G A N A .

I. Os hyoides		285
Basis		286
cornua majora		ibid.
minora		287
Ligamenta		ibid.

2. Musculi	pag. 288 <i>seqq.</i>
sternohyoidei	<i>ibid.</i>
fabrica	289
actio	<i>ibid.</i>
3. Coracohyoidei	290
Origo verior	<i>ibid.</i>
tendo medius	291
Infertio & vis	292
4. Stylohyoidei. Majores	292 <i>seqq.</i>
Origo	<i>ibid.</i>
Sinus quo biventrem transmittit	<i>ibid.</i>
infertio	293
usus	<i>ibid.</i>
Stylohyoideus alter & minor	294
5. Biventre	<i>ibid.</i>
Venter primus	<i>ibid.</i>
conjunctio cum osse hyoide	295
Venter secundus	<i>ibid.</i>
officia varia	296
6. Mylohyoideus	297
Origo musculi	<i>ibid.</i>
finis	298
officium	<i>ibid.</i>
7. Geniohyoidei	299
8. Lingua in universum	300
9. Genioglossi musculi	302
Origo	<i>ibid.</i>
fines tres. Lingualis	303
pharyngaeus	<i>ibid.</i>
hyoideus	<i>ibid.</i>
officia varia	304
10. Styloglossi	305
Origo	<i>ibid.</i>
pars a maxilla accessoria	<i>ibid.</i>
strata fibrarum tria, quatuorve	<i>ibid.</i>
officium	306
11. Linguales musculi	<i>ibid.</i>
12. Hyoglossi	307
Pars ejus quae basioglossus	<i>ibid.</i>

quae ceratoglossus	pag. 308
Tertia particula	ibid.
Officium	309
13. Chondroglossi	ibid.
descriptio	ibid.
utilitas	310
An myloglossi in homine dentur	ibid.
14. Fibrae linguae propriae	ibid.
a <i>Malpighio</i> descriptae	ibid.
& <i>Stenonio</i>	311
In homine obscurae sunt	ibid.
omnino tamen efficaces	ibid.
15. Fauces	312
16. Os	313
Ut varie ea vox sumatur	ibid.
Buccarum cavitas	ibid.
& retro dentes alia	314
17. Uvula	ibid.
num ad vocem faciat	ibid.
non valde credibile	315
18. Nares	316
septum bipartiens	ibid.
meatus praecipuus	ibid.
recessus accessorii	ibid.
imus	317
medius	ibid.
supremus	ibid.
sinus pituitarii	ibid.

S E C T I O I I I .

V O X .

1. Vox quid sit	319
Organum glottis est	ibid.
Descriptio laryngis avium	320
2. Oritur a tremore organorum suorum	323
Quare ea ex cartilagine Natura fabricata est	ibid.

3. Ligamenta glottidis tremunt dum vox profertur 324
 A numero tremorum tonorum diversitas est 325
 sola glottis ad vocem edendam sufficit 226
4. Quomodo cuique animalia sua propria vox edatur *ib.*
 ea fabrica laryngi propria *ibid.*
 Id ostendunt experimenta Cl. virorum 327
 Unde vocis acutae & gravis discrimina *ibid.*
 A tremorum in ligamentis glottidis vario numero 328
 ab elevatione aut descensu laryngis *ibid.*
 Vires quae laryngem levant 329
 aut deprimunt 330
6. Porro cur tremores ii numero sunt diversi *ibid.*
 An a diversa longitudine instrumenti vocis *ibid.*
7. Num ab arctata glottide toni acutiores nascantur 331
 Quid hic docuerit *Dodartius* 332
 Argumenta quibus sententiam stabilit *ibid.*
 sexuum & animalium exempla *ibid.*
 & instrumentorum musicorum 333
 Tonique certo ab arctiori vocis exitu mutati *ibid.*
 Quanta hic varietas esse possit 334
8. Alia sententia. A ligamentis glottidis 335
 magis tensis acutior, laxatis gravior vox succedit *ibid.*
 Non praetervidit penitus *Dodartius* *ibid.*
 Quae *Ferrenius* addiderit *ibid.*
 A sola tensione ligamentorum tonos variari 336
 neque quidquam ab arctitudine glottidis pendere *ibid.*
 sed unice ab aucta tensione altiores tonos nasci 337
 & diminuta humiliores *ibid.*
 etiam instrumento musico hanc sententiam confir-
 mari 338
 Quid mutaverit Cl. *Rungius* *ibid.*
9. Contra novam sententiam objectiones Cl. *Bertini* 339
 Ligamenta tendi non posse 340
 in avibus manifesto *ibid.*
 in glottide immobili tonos posse repraesentari *ibid.*
 varios *ibid.*
 & a sola angustia instrumenti sonori tonos variari *ibid.*
 sexuum contraria exempla 341
 Nulla causa est quae ligamenta tendat *ibid.*
10. Quid

10. Quid ad eas objectiones respondeat Cl. *Montagnat* 342
 Pro *Ferrenii* sententia *ibid.*
 Argumenta a morbis 343
 Infectis *ibid.*
11. Instrumentum vocis auxiliare 344
 videtur postulari a magna sonorum varietate *ibid.*
 Nullum instrumentum organum vocis humanæ
 imitatur *ibid.*
 Posse in linguæ cum palato rima vocem variari 345
12. Robur vocis a multo aere *ibid.*
 per arctiorem glottidem expulso 346
 & tremores partium elasticarum 347
 etiam laryngis 348
 resonitum in ventriculis laryngis *ibid.*
 ore 349
 narium cavea *ibid.*
 Cogitationes *Dodarti* *ibid.*
13. Alia vocis organa. Lingua 350
 labia. *ibid.*
 alia labia 351
14. Communes vocis adfectiones *ibid.*
 nulla piscibus *ibid.*
 Cur acuti soni fatigent 352
 Nocent etiam pulmoni *ibid.*
 & cerebro 353
 Gravior tonus omnino proferri nequit *ibid.*
 Egent cantores irroratione *ibid.*
15. Propria cuique animali vox est 354
 etiam homini *ibid.*
16. Vocis diversitas ab animi adfectu 355
17. De cantu aliqua 356
 ut a voce differat *ibid.*
 Quid ad gratum cantum requiratur 357
 Unde vox fusca *ibid.*
 & musices effectus in excitandis animi adfectibus 358

SECTION IV.

L O Q U E L A.

1. Quid sit loqui	pag. 359
Literæ quid	ibid.
2. Vocales	360
funt octo	ibid.
3. Ut generentur in ore	361
A	ibid.
Æ	362
E	ibid.
I	ibid.
O	363
Oc	ibid.
Ui	ibid.
U	ibid.
Vocales furdæ	ibid.
Scheva	364
reliquæ furdæ	ibid.
4. Literæ consonantes	365
aliis in linguis aliæ	ibid.
ab adlifu linguæ ad partes oris generantur	366
Classes consonantium literarum	ibid.
5. Surdæ H.	ibid.
Ch.	367
Sibilantes S.	ibid.
Sch.	ibid.
S blæsum	368
Effantes F	ibid.
V	ibid.
W	ibid.
6. Explosivæ	ibid.
B	ibid.
P	366
D	ibid.
T	ibid.
K	ibid.
G	ibid.

7. Nafales	pag. 370
M	ibid.
N	ibid.
Ain	ibid.
8. Liquidæ	371
L	ibid.
R	ibid.
Compositæ	372
Quibus viribus L proferatur	ibid.
9. Vitia loquelæ & vocis	ibid.
An absque lingua loqui detur	373
Non valde videtur	ibid.
Balbuties a lingua nimis grandi	374
Nimis adstrictæ vitium	ibid.
& brevis strictæque	ibid.
& longæ	ibid.
Vitia uvulæ adrosæ aut resectæ	375
& deficientis palati mollis	ibid.
A palato osseo vitia	376
Et a dentium defectu	ibid.
labiorumque	ibid.
A nervorum culpa	377
His novo motu subnato vocis usus restituitur	ibid.
11. Ut corrigantur locutionis vitia	378
Ut literæ aliquæ	ibid.
12. Ut muti loqui discant	379
Perceptis motibus organi loquelæ hominis loquentis	380
Qui primi fuerint artifices	ibid.
Merita <i>Petri Pontii</i>	ibid.
<i>Johannis Wallis</i>	381
<i>Guilielmi Holder</i>	ibid.
<i>J. Georgii Ammann</i>	382
<i>Georgii Raphel</i>	383
13. Uti muti loqui discant	384
14. Alia ratio, qua potius aurium officium per alia organa suppletur	385



